



31700/E

voll







Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library



**KWEEKSCHOOL**  
**DER**  
**ONTLEEDKUNDE.**

KWEEKSCHOL

DER

ONTLEEDKUNDE

K W E E K S C H O O L  
D E R  
O N T L E E D K U N D E .

Z Y N D E  
V E R Z A M E L I N G E N  
E N  
W A A R N E E M I N G E N .


U Y T D E B E S T E E N N I E U W S T E S C H R Y .  
V E R S G E T R O K K E N .

Ten dienste der geene, die zig in deeze Wee-  
tenfchappen willen oeffenen.

E E R S T E D E E L .



T E A M S T E R D A M ,  
By D A V I D W E E G E ,  
M D C C L X X I I .



JOHN H. BROWN

ON THE HISTORY



AND THE

WARRIORS

THE HISTORY OF THE

WARRIORS

THE HISTORY OF THE



THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE





# K W E E K S C H O O L

## DER

# ONTLEEDKUNDE.

VERZAMELING I.

---

FREDERIK HOFMAN \*

ONTLEED-, NATUUR- EN HEELKUN-  
DIGE BESCHOUWING VAN HET  
MENSCHELYK LICHAAM.

I. HOOFDSTUK.

VAN DE OPPERHUIT.

*Ontleed- en Natuurkundige beschouwing  
van dezelve.*

§. I. **H**ET eerste bekleedsel van ons Lic-  
haam is de *opperhuit*, 't welk de Grie- *Cuticula.*  
ken *Epidermis* noemen : het is een  
vlies wat zyn weeffel aangaat, vast, doorschy-  
nend, van alle gevoel ontbloot, aan de huid  
door

\* Zie FRIDER. HOFFMANNI Oper. Omn. Supplem.  
*secund.* Part. 3. pag. 1.



door verscheide zenuwdraadjes zeer vast hangende, en tot verscheide nuttigheeden geschikt.

*Aanmerking.*

*Cutis:* DAT de opperhuit een sterk vast vlies is, blykt daar uit, dat een vloeistof in blaazen van de opperhuit bevat zo ligt niet wegwaassemt of uitgestort wordt, doch dat die blaas geopend moet worden, zal het wegvloeijen en ledig geraaken. Vervolgens dat het zeer vast aan de vezelen van de *huit* zit, kan men daaruit afleiden, om dat de opperhuit van dezelve niet dan door 't geweld van vuur, of door de uitstorting van een menigte water uit de vaatjes van de *huit*, of ook door een langduurige dompeling van het deel in warm water, of door een *blaartrekkerd middel* van buiten aan dezelve geplaaft, kan afgescheiden worden. De afscheiding van de *Cuticula* door het deel in warm water te houden, heeft *Nuck* voorgesteld.

*Vesicatorium.*

§. II. DE opperhuit is een deel van het Lichaam, besonderlyk van maakfel, en in de Baarmoeder reets gevormd, en niet, gelyk het gemeen gevoelen is, voortgekomen van de dampen en uitwaasseringen uit het lichaam door de buiten koude verdikt, en door de drukking van de Dampkring samengegroeid.

*Aanmerking.*

HET gemeene gevoelen is dit, dat het fynste

ste gedeelte van het voedsaame sap , 't welk uit de mondjes der huidvaten gestort wordt, van het grover uitwaassemt , en dat zyn deelen naderhant samenloopen en byéén groeijen, op dezelve wyze als wy zien gebeuren by het maaken van *extracten* , wanneer 'er een dun vliesje voortkomt; doch het is liever, op dat ik met de Ouden spreek, *zaadachtig*, tot de vorming en het weezen van 't Menschelyken Lichaam behoorende , en 't geen de mensch geenfints ontbeeren kan. <sup>*Spermatica.*</sup>

§. III. DE Opperhuit heeft zyn oorsprong gedeeltelyk van de zeer dunne uitbreiding van de uitwerpbuisjes van de huid en de zenuw- en peesachtige vezeltjes, die die kleine schubbetjes of plaatjes, onder malkanderen samenhangende, uitmaaken.

*Aanmerking.*

DIT is het gevoelen van *Ruyfch* en *Leeuwenboek*, waarvan de laatste zelfs verzekert, dat de huid samengesteld is uit zeer kleine schubbetjes, gelyk die der Visschen. Over deeze zaak kunnen nagezien worden *Transaët. Angelic. pag. 542.*; en *Leeuwenboek* heeft aangetekend door het Microscoop, dat de beddingen van deeze *schubbetjes* onderling op den anderen leggen, en nam waar, dat uit de tusschenruimte van de schubbetjes, en niet uit gaatjes, de zweet-droppels uitkomen. Andere houden staande, dat de Opperhuit uit op malkander



*Cepæ.* leggende vliesjes bestaat, om dat het dus dikker gemaakt is, en even als *Euijen* verdeeld kan worden.

*Pili.* §. IV. DE Opperhuit is met menigvuldige pooren voorzien, waarin de zweetvaatjes van de huid eindigen, en geeft ook een ondersteuning aan de *haairen*.

*Aanmerking.*

*Spirabile & In-spirabile.* OM dat het gantsche lichaam, volgens het gezag van *Hippocrates*, *uitwaassend* en *opflorpend* is, 't welk ook door de ondervinding zeker en gestaafd is, zo is 'er ook geen twyfel, en de zaak zelve leert het, dat een vochtige stof door de opperhuit gaat, welkers pooren zichtbaar zyn, en een grondsteun aan de haairen geeven, welke zy bekwaamlyk ontfangen en vast in hun plaatsfen houden, waarom, zo by geval de opperhuit weggevreeten is, de haairen, van hun steun en draaden ontbloot, uitvallen, en gemakkelyk uitgetrokken kunnen worden.

*Volæ.* §. V. IN de *palmen* der handen, inzonderheit van Arbeidslieden, en in de voetzoolen, is de opperhuit harder, doch zachter en dunner in 't aangezicht, en om die reden schynen hier de *baair-bloedvaatjes* (a) gemakkelyker door, *Vasa capillaria.* daar

(a) Haairvaatjes; *Vasa capillaria*, worden genoemd, die om haar teerheid naar dunne hoofdhaairen gelyken; en nog veel fynder vaten dan het dunste haair zyn 'er in 't lichaam.

daar in tegendeel de opperhuit om zyn hardheid in de palmen van de hand en de voet-zoolen ligtelyk *eelt* krygt, en dat om de ge-*Callus.* maakte drukking der pooren, terwyl het voed-saame sap niet meerder tusschen de vezeltjes ingebracht wordt, maar door de drukking vast-kleeft en samengroeit.

§. VI. DE Opperhuit is tot verscheide ge-bruiken geschikt. Vooreerst is zy een dekfel op de uiteindens der vaten, die in de huid open zyn; vervolgens verschaft zy een ge-lykheid aan de huid, en brengt veel tot de schoonheid toe; eindelyk matigt zy de ge-waarwoording van het *Gevoel*, en belet, dat *Tactus.* de onderleggende zenuw-tepeltjes, welke de werktuigen van het gevoel zyn, van de buiten zynde voorwerpen niet beledigd worden.

*Aanmerking.*

DE Opperhuit sluit de monden van de uit-werpbuisjes van de huid, en matigt dus de door-waasseming en de groote uitgang van vochtigheid en waassem. Want dit vlies ontbreken-de zou de uitstorting der vochten al te groot zyn, gelyk wy zien, dat 'er geduurig vocht uit de huid komt, zo de opperhuit door bran-ding weggenomen is.

§. VII. OM welke reden, als de huid al te hard is, en eelt krygt, de uitdamping belet wordt, waarom het nodig is dikwyls met de voeten in  
een



*Friktion-  
es.*

een warm bad te zitten, op dat de al te ver-  
eelde huid gemakkelyk verzagt mag worden.  
Op deeze plaats moet ik de gemeene dwaaling  
der Chirurgy's berispen, dewyl zy door op-  
gelegde plaisters, welke de stoffe verdikt laa-  
ten, de uitwaasseming moeilyker maaken, waar-  
door het komt, dat de pynen scherper worden,  
en andere beledigingen van de huid bezwaarly-  
ker samengroeijen. De *vryvingen*, om dat zy  
de pooren van de huid en opperhuid openen,  
bevorderen uitneemend veel de uitwaasseming,  
en zyn by de oude Geneeskundige in groot ge-  
bruik en waarde geweest, en wel daarom, om  
dat zy niet alleen de uitwaasseming voortzet-  
ten, maar ook de drift der vochten van andere  
ver afgelegen deelen afleiden.

§. VIII. HOE zuiverder, zachter en glad-  
der de opperhuid in 't aangezicht is, hoe het  
aangezicht zich schooner vertoont, waarom  
de opperhuid de zitplaats der schoonheid is.

*Aanmerking.*

*Cosma-  
tica.*

HET *Blanketsel*, 't welk geschikt is om de  
schoonheid te bezorgen, heeft naauwlyks an-  
der gebruik, als dat het de vuiligheeden rei-  
nigt en de Oppersluit zacht en glad maakt.

*Lini-  
mentum.*

Wonderlyk dienen hiertoe de *Axungia humana*  
*cum spermate ceti*, *cera alba*, & *addito oleo Tartari*  
*per deliquium ac balsamo de Copaiva* tot een *smeer-*  
*middel* gebragt; ook regenwater in de maand  
Maart

Maart vergaderd, en door langduurige beder-  
ving gezuiverd.

*Ziek- en Heelkundige Beschouwing van  
de Opperhuit.*

§. IX. Tot de tegennatuurlyken staat be-  
hoort de al te groote hardheid van de huid en  
*eeltachtigheid* in de voetzoolen; welke ligtelyk *Callosi-*  
verwekt wordt, en zyn oorsprong neemt uit *tas.*  
de zoute en flymachtige deeltjes, die van de  
voeding van de huid overgebleeven, en daar  
bewaart en samengedrukt zyn.

*Aanmerking.*

GEDUURIG waassenen 'er dampen uit de  
opperhuit, welke in de tusschenwydtens der  
pooren flymachtige en vette vuiligheeden ach-  
terlaaten, welke voornaamentlyk door het  
zweet ontbonden en door zeep afgewasschen  
kunnen worden. De voetstappen der vuilig-  
heeden, van de uitwaasseming overgelaaten,  
zyn inzonderheit te zien in de hembden,  
waarom men uit de koleur en vuiligheid van  
't onderlinnen de staat, hoedaanigheid en hoe-  
veelheid der *uitwaasseming* het best afneemen *Transpi-*  
kan. Wanneer dierhalven de *transpiratie* belet *ratio.*  
wordt, en deeze zoute en flymachtige *vuilig-* *Sordes.*  
*heeden* onder de opperhuit verzameld worden,  
vertoon en zich daar verscheiden blaaren en  
puisten.



*Causticum.*

§. X. DE opperhuit wordt in blaaren opgetild door *vesicatoria*, welke door een fyn fcherp *brandend* zout werken, ook komen hier van 't vuur blaaren; om dat de vaatjes, de opperhuit met de huid famenbindende door het ontbinden en losmaaken een grooter uitstorting van weyvochten voortbrengt, welke door de opperhuit zo fchielyk niet kunnen uitdampen.

*Aanmerking.*

*Atonia.*

*Sensatio.*

*Sphacelus.*

*Plethorici.*

DE opperhuit wordt niet alleen door de beweging en krampachtige toetrekking in blaaren opgeheeven, maar ook gebeurt zulks door de *flapheid*, of door de al te groote losheid der vezelen, en het verlooren gaan van *gewaardwording*; gelyk zulks gefchiedt in de ledematen, die door *heetvuur* aangetast zyn; dus ontstaan ook in doode Lyken groote blaaren op de leden, inzonderheit in *bloedryke*, en die uit een innerlyke verrotting of door een fchielyk ingenomen vergift het leeven verlooren hebben.

§. XI. ONDER de ziekten van de opperhuit, die ook de huid zelve aandoen, is de *jeukte* de voornaamfte, die niet alleen in Kinderen, maar ook in volwaffchen Menfchen uit een ongeregelde levenswys, of ook in de vrouwelyke fexe uit de ophouding der Maandftonden zo groot wordt, dat de nagels byna niet voldoende zyn, zo dat, hoe meer de opperhuit door krabben gekweft wordt, de jeukte zo  
veel



veel te meerder groeit; de jeukte heeft anders geen oorzaak als een zeer fcherp *lympba*, waarvan door de vaatjes van de huid een groote uitstorting gefchiedt, zo dat het byna als 't waare geheel ontveld en als een druipende zweer fchynt.

§. XII. DE opperhuit groeit in de kwetfingen van de huid zo fchielyk en gemakkelyk niet weder, vooral, zo hier een al te groote vochtigheid de overhand heeft.

*Aanmerking.*

HIER uit blykt gemakkelyk de reden, waarom in de ontvellingen, welke van *fchurftheid*, *Scabies* jeukte en *fcheurbuikige vlakken* ontstaan, zelfs in *Exanthemata* Kinderen, die nog zuigen, de opdroogmidde-*scorbatica* len, als *ceruffa*, *lapis calaminaris*, geplukt *lin-*nen, zo groot nut verfchaffen ter herftelling van de verlooren opperhuit.

§. XIII. NIET zeltzaam zo wel na *fcherpe* als *Acuti* na *langduurige* ziekten valt de geheele opper-*Chronici* huid met de hoofdhaairen af, en een nieuw groeit 'er weder aan, om geen andere reden, als om dat de huid uit gebrek van haar voedfaam fap famenrimpeld en dor wordt; doch na de herftelling het *voedfaam fap* weer in grooter *Succus nutritius* meenigte toevloeiende, wordt de opperhuit, die nu als dood en dor is, afgefcheiden, en een nieuwe komt 'er te voorfchyn.

*Aanmerking.*

*Testæ.* HIER uit nu kan gemakkelyk reden gegeven worden, waarom de Herten hun hoorns, de Slangen en Serpenten hun huid, en de Kreeften hun *schaalen* en korsten in de Lentetyd afleggen. Want in de Winter het genoegsaame voedsaame sap ontbreekende verdorren de uiteindens; naderhant om het overvloedige voedsel, en de aanwas van het bloed en van het aanvloeijende *succus nutritius*, worden deeze dorre en als 't ware doode deelen met eenig geweld van de leevendige afgescheiden.

§. XIV. HIER komt een vraag voor, of de geschonden opperhuit door konst zo van de huid, inzonderheit in 't aangezicht, afgescheiden kan worden, dat 'er naderhant een schooner en fyner in de plaats komt? Onder het blanketfel van de Italiaansche Vrouwen is gemeenlyk dit het voornaamste, dat zy zorg draagen, dat de opperhuit door zekere konstbewerkingen van het aangezicht afgetrokken wordt, op dat 'er naderhant een tederder en blanker in de plaats kome. En dat dit zelve reets ten tyde van *Tibullus* in de mode geweest is, mag men besluiten uit de regels, die *Eleg. I. vers. 8.* gevonden worden:

*Tollere dum cura est albos a stirpe capillos*

*Et faciem demta pelle referre novam.*

Doch de ondervinding beantwoordt dit gevoelen



len niet. Want wy zien, dat na het afvallen van de opperhuit in ziekten, het zy zulks in 't aangezicht of op andere deelen geschiedt, het aangezicht niet schooner wordt. Want de bedurven koleur en staat van 't aangezicht hangt zo zeer niet af van de opperhuit, als wel van de onderleggende huid, en van haar ongeschonden maakfel en het *waterachtig vocht*, *Succus lymphaticus.* dat door dezelve omloopt.

§. XV. DE vraag is hier ook, of men in de *Kinderpokjes* de vlakken, gaten en holligheeden *Variolæ.* van de opperhuit door eenige konst beletten kan? De zaak moet dus beslist worden. Indien de pokachtige stof verder voortkruipt, en de vezelen en *onderhuitvaatjes* beledigt, en de *exulceratien* dieper zyn, dan kunnen de kuilen zo *Vasa subcutanea.* gemakkelyk in 't geheel niet belet worden, 't welk meest plaats heeft in lichaamen, die vol ongetemperde en zoute vochten zyn; doch byaldien de zweertjes oppervlakkig zyn, en de *cuticula* in grooter blaaren optillen, dan wordt door een van pas zynde opening, of door *betting* van Thee of Tabac op het aangezicht *Fotus.* gebruikt door het verzagten van de *scherpheid*, *Acrimonia.* belet, dat de pokachtige stof niet verder voortkruipt.

## II. HOOFDSTUK.

## VAN DE HUIT.

*Ontleed- en Natuurkundige beschouwing  
van dezelve.*

§. XVI. **D**E Huit is een vlies van zyn foort, dat is bijzonder samengeweeven uit zenuw- en peesachtige vezelen, door de uiteindens der vaten doorweeven en tot verscheide gebruiken geschikt.

*Aanmerking.*

*Elastica.* DE Huit wordt een vlies genaamd, om dat zy wit is, uitgerekte kan worden, en andere deelen dekt of beschermt; doch zy is een bijzonder vlies, om dat ze uitwerp-kanaaltjes heeft, om dat zy uit zenuw- en peesachtige samengesteld, en met kenbaare pooren voorzien, en met een nadrukkelyk gevoel begaafd is, ook bezet zynde met klieren en hairen, die in de pooren vast zitten; doch by uitnemendheid heeft zy dit van alle 't zonderlings, dat zy zeer *veerachtig* is, dat is, dat zy op een wonderlyke wyze uitgerekte kan worden, en de uitspannende kragt weggenomen zynde wederom samenrimpelt. De veerkracht van de huid wordt beweezen door de staat van waterzuchtige Menschen en zwangere Vrouwen.

§. XVII.



§. XVII. DE *Huit* kan zeer wel in twee schil-*Cutis*.  
len verdeeld worden, waarvan de buitenste  
samengesteld is uit meerder rekbaare, gevoe-  
liger en fyner vezelen; doch de binnenste uit  
dikker, pooreuser vezelen, en uit de onder-  
leggende peezen der Spieren.

*Aanmerking.*

SOMMIGE Ontleedkundige vergelyken de  
Huit by de schil van een Citroen of Orange-  
Appel, waarin het buitenste gedeelte van een  
veel fyner, vaster en rekbaarder weeffel is,  
doch het binnenste van een ruuwer, grover  
en dikker. Eenige noemen het bovenste ge-  
deelte van de huid het *zaadachtige*, doch zeg-*Sperma-*  
gen, dat het binnenste van het bloed en 't *tica*.  
voedsaame sap afhangt, waarvan zy tot reden  
willen bybrengen, dat de gewonde zenuwach-  
tige vezelen van de buitenste huid nooit weer  
recht samengroeijen, maar in een onaanzien-  
lyk lidteken overgaan.

§. XVIII. OVER de huid legt een zeer fyn  
vlies, 't welk gemeenlyk genaamd wordt het  
wonderbaare *net van Malpighius*. Dit is samen-*Rete*  
gesteld uit piramiedswyze zenuwachtige tepelt-*Malpi-*  
jes van een nadrukkelyk gevoel, en van *Mal-*  
*pighius* (b) beschreeven in zyn Boek *de Tactus*  
*Orga-*

(b) Ik geloof, dat deeze beschryving van het Malpi-  
ghiaanse net niet voldoende is, en dat men na het schry-  
ven van dit Werkje de aart en omstandigheid van dit  
vlies

*Organo*, en ook bevonden het eigentlyke werktuig van 't gevoel te zyn.

*Aanmerking.*

DIT net van *Malpighius* hangt zeer vast aan de opperhuid en wordt klaar gezien, de opperhuid in de palmen van de hand en op de voetzoolen afgetrokken zynde, inzonderheit aan de toppen der vingeren; en deeze *tepeltjes*, waaruit het bestaat, zyn niets anders dan de uiteindens der zenuwen; en gelyk in de tong dusdanige *tepeltjes*, als de uiteindens der zenuwen zynde, het eigentlyke werktuig van de smaak uitmaaken, dus zyn zy ook in de huid het werktuig van 't gevoel. Zy zyn van een piramiedswyze gedaante, en krygen in de tong een rond-  
*Papillulae.* achtige of *fungeuse* gedaante. Doch op het geheele lichaam wordt dit *Malpighiaanse* net zo klaar niet gezien als in de handen en toppen der vingers, om dat daar het gevoel zyn zitplaats heeft.

§. XIX. DE huid zit zeer vast aan het vet, waarvan het ook nauwkeurig, doch niet zonder moeite, door het Ontleed-mes afgescheiden moet worden; en door het vet gaan bloedvaten, zo wel *slagaderlyke* als *aderlyke*, ook pees-  
*Arteriosa.* en zenuwachtige draadjcs naar de huid.  
*Venosa.*

*Aan-*

vlies beter heeft leeren kennen, gelyk zulks blykt uit het Werk by den Drukker deezes uitgegeeven, onder den naam van *Physiologia of Natuurkundige Ontleding*, pag. 419. waarna toe wy den Lezer zenden.



*Aanmerking.*

DE aderlyke bloedvaten, welke door de snyding geopend worden, zyn boven op het vet gelegen, en die worden wyd en dik genoeg in de handen en voeten gezien; dog de slagaderlyke vaten leggen dieper verborgen onder de Spieren en 't vet, en zenden niet dan zeer dunne voortbrengfels uit, die niet gezien of gevat, veel min met een werktuig aangegrepen kunnen worden. Doch dat de peezen der *Spieren* met eenige draaden, door tusschenkomst *Musculi* van het vet, naar de Huit zelve gevoerd worden, ziet men duidelyk in de peezen der Spieren van de *onderbuik*, die zich innerlyk vermen- *Abdomen.* gen met het vet en de Huit.

§. XX. ONDER de Huit hebben de heden- daagsche ontleedkundige, waarvan *Nicolaas Steno* de voornaamste is, eenige *geersten-klieren* ge- *Glandulae milia-* steld, die de stof van 't zweet afscheiden zou- *res.* den, en dezelve zo wel door de groote als kleine uitwerpbuisjes, welke zy pooren noemen, naar de oppervlakte van de Huit voeren. Doch deeze klieren kunnen niet heel ligt gevonden worden, schoon iemand met het naauwkeurigste vergrootglas voorzien was. Echter ont- kennen wy niet, dat 'er onder de *oxels*, en in *Axillæ.* de *liezen* klieren van een grooter gedaante ge- *Inguina.* legen zyn, die gemakkelyk door het gevoel ontdekt kunnen worden, en tot een bijzonder gebruik geschikt zyn.



*Aanmerking.**Hypothesis.*

HIER uit is buiten twyfel die *vooronderstelling*, of dit gevoelen voortgekomen, dat 'er menigvuldige onderhuitse zweet-klieren waren, om dat het als een grondregel is gehouden, dat de afscheidingen der vochten in het gantsche lichaam niet anders geschieden als door klieren; doch dat dit leerstuk niet algemeen is, kan de

*Testes.*

afscheiding van het mannelyke zaad tot een voorbeeld strekken, welke in de *ballen* verricht wordt, die niet klier- maar geheel vatachtig zyn (c): eindelyk wordt de afscheiding van het voedend sap, 't welk de vaste deelen van het lichaam vermeerdert en herstelt, nergens bevonden door tusschenkomst der klieren te geschieden; doch eerder kan de afscheiding in de pypachtige zelfstandigheid der deelen het allerbeste geschieden, zo maar de vochten, die afgescheiden moeten worden, overeen komen met de middellynen der affchey-vaten; en op dezelve wyze gelooven wy ook dat in de Huit de afscheiding van de damp en stof, die het zweet uitmaakt, volbragt wordt.

§. XXI. DE Huit wordt gevoed door een *Lymphaticus.* dauwachtig *waterig* vocht, 't welk uit de buisjes

(c) Over deeze afscheiding der vochten door de klieren, verdient het te vooren aangehaalde werkje van de *Physiologie* nagezien te worden, alwaar men duidelyk aantoot, dat zelfs in de Lever, Milt, Nieren enz. de vochten zonder tusschenkomst van Klieren afgescheiden worden.

jes en pooren der Slagadertjes uitwaassemt en aan de draaden van de Huit geplaatst wordt, en naar dat dit vocht in kleur en maakfel verschilt, is ook het maakfel en de kleur van de Huit verschillende.

*Aanmerking.*

DE reden van dit bygebragte wordt zeer duidelyk door de ondervinding zelve bevestigt. Want in een ziekelyken staat, en inzonderheit in langduurige ziekten, alwaar een besmetting der ingewanden, die tot zuivering van het bloed dienen, plaats heeft, wordt de kleur van de Huit op een wonderlyke wyze bedorven. Dus wordt in de *Geluw* om de verhinderde afschei- *Icterus*. ding of uitwerping van de Gal, en om haar wederkeering naar de *massa* van het bloed en van de *lympa*, de Huit geel. In de *Ongedaantheid* en *Cache-* Waterzucht, alwaar de ingewanden van de *xia*. onderbuik van gelyken een groote besmetting hebben, waarvan de Lever, Milt noch Alvleesch klier niet bevryd zyn, neemt de gantsche Huit een blaauwe en loode kleur aan; en daarom kunnen de ervaarene in de kunst uit de verandering van de natuurlyke kleur van de Huit, de gebreken der innerlyke deelen en ingewanden het best kennen, gelyk zy ook gewoon zyn. In een natuurlyke staat is 'er volgens het verschil van den leeftyd, temperamenten, leevenswys en den tyd van 't jaar geen kleine verandering ten opzichte van de



koleur in de Huit, dewyl zy des somers geelder en roodachtiger, en 's winters witter gelykt, en die van een *phlegmatic* temperament zyn hebben de Huit blanker, die van een bloedryk rooder en bloozender, die van een *melancholische* bruiner, en die van een galachtig, geeler.

§. XXII. DEWYL de koleur van de Huit van de hoedanigheid en *crasis* van het voedende waternvocht afhangt, is de reden ligt te bevatten, dat dezelve nooit door eenige hulpmiddelen van buiten veranderd kan worden, ten zy de geheele *massa* der vochten, wat hun aart en maakfel aangaat, verbeterd zy, of in eene tegen natuurlyke staat de oorzaaken, die de ziekte en bedorven koleur aanbrengen, weggenomen worden.

§. XXIII. EEN groot verschil in de Huit is 'er ten aanzien van haar dikte, invoegen zy op het hoofd het dikste is, vervolgens in de hals en ter zyde middelmatig dik, hard in de nek, rug en voetzoolen, zachter en dunner in 't aangezicht, en het allerfynst op 't hoofd van de manelyke roede. Vervolgens zit zy zeer vast aan de ooren, 't voorhoofd, de lippen en aan de toonen, van gelyken aan de handen en derzelver palmen. In kinderen en vrouwen en *phlegmatique* voorwerpen is de Huit zachter en spongieuwer, in jongelingen inzonderheit van een galachtig temperament meer gespannen en gevoeliger, ook tederder; in oude en *melancholici* en in de winter is zy hard, vast en gespannen.

§. XXIV.

§. XXIV. HET verschillend weeffel van de Huit levert de oorzaak op, waarom de pynen, van wat foort ook, zachter zyn in flapper, zwakker en spongieufer lichaamsgestellen, gelyk als die van kinderen en vrouwen, als in een jeudig en galachtig lichaam, alwaar de pynen om de teerheid en grooter spanning zeer scherp gewoon zyn te weezen, zodanig, dat zy niet zelden het leeven in gevaar brengen, indien wy geen middel ter verzachting van de natuur bezorgen. Hieruit kan de reden ook opge- maakt worden, waarom de brandingen en ver- zweeringen in de kinderziekte veel gevaarly- ker zyn, wanneer iemand in een reets gevorderde jeugd is, dan als hy nog een klein kind is en een weeker gestel van Huit heeft. Eindelyk kan men daar door ook reden geeven, waarom de lyders aan het *voetewvel* veel scherper pynen gevoelen, *Podagra*, als zy nog jong en in hunne mannelyke jaaren zyn, dan wanneer zy reets in een hoogen ou- derdom gevorderd zyn.

§. XXV. DE geheele Huit om haar vezelach- tig maakfel heeft een zonderlinge toon en veer- kragt, welke daarin bestaat, dat zy zeer uit- gerekt kan worden, naamentlyk van een in- nerlyke oorzaak, en deeze ophoudende weder- famenkrimpen en tot zyn vorige staat hersteld worden.

*Aanmerking.*

DAT de Huit zo wonderlyk verwyd wordt,



*Hydropi-* bemerken wy in zwangere vrouwen, *watersuch-*  
*ci.* *tige*, en daar een groote menigte ingewanden  
*Gangræ-* in 't *Scrotum* gezakt is. In 't *koutvuur* en in an-  
*na.* dere gezwellen is ook een groote uitspanning  
 van de Huit; duidelyk trekt zy zich samen in  
 oude lieden en in die, welke door de teering  
 uitgeteerd worden.

§. XXVI. DE geheele Huit heeft een bezon-  
 dere foort van beweeging, die *tonus* genaamd  
 wordt, wanneer wy ontdekken, dat zy van  
 verfcheide oorzaaken als te veel gerimpeld en  
 samengetrokken of ook verflapt wordt.

*Aanmerking.*

*Spasmi*  
*prima-*  
*rum via-*  
*rum.*

Dus neemen wy waar, dat de Huit van de  
 koude lucht, van de Noorde winden, ook  
 door een fchrik en in eene tegen natuurlyke  
 staat van de pyn en *kramp*trekkingen der eerste we-  
 gen kennelyk samengerimpeld en haar pooren  
 samengetrokken worden, en dus is de uitgang  
 van het uitwaaffemende vocht en 't zweet belet;  
 in voegen dat zy tot een harder en ruuwer  
 staat geraakt, en als 't ware tot eenige bergjes  
 opryft, in welk geval men 't gemeenlyk *ganzen*  
*Huit* noemt. In tegendeel wordt van een zach-  
 te en warme lucht, en indien het herfst of len-  
 te is, of in de nacht lucht, of zo'er zuidelyke  
 en wefte winden regeeren, de Huit zeer ver-  
 flapt, verwyderd, opgezwollen, de pooren  
 worden geopend, het zweet vloeit in grooter  
 menigte uit, en de Huit wordt zacht, dun en  
 fpon-

spongicus, en dit valt meest voor na het ophouden der koortsen of na de *opfchorting* van andere *Intermissio*.  
krampachtige aandoeningen.

§. XXVII. DE toon van de Huit en haar bezondere *gevoeligheid* hangt ten grootsten deele *Sensibilitas*.  
af van den invloed van een fyner bloed door de Slagadertjes en van het zenuwkap door de zenuwen, naardien 'er zeer fyne takjes uit veele zenuw-paaren naar de Huit gaan en verftrooid worden.

*Aanmerking.*

OVER de verftrooiing der zenuwen uit het vyfde paar, het tuffchenribbige, het *zwerwen-Vagum*.  
*de*, het tweede hals-paar, het zesde rug-paar en de onderfte der lendenen en de *crurales* verdient onder andere *Vieuſſens* in zyn *Neurologia* geleezen te worden. Gelyk nu alle beweeging der vaste deelen in 't gantsche lichaam, al de fterkte en veerkragt, ook de tegenftand biedende, als mede alle de vrywillige beweegingen der deelen van den behoorlyken invloed van 't bloed en zenuw-zap afhangt, in voegen dat de invloeiing door het binden van een flagaderlyk of zenuw-vat, of ook door beide de vaten af te fnyden, verhinderd zynde, deeze alle terftond ophouden, dus is 'er geen twyfel aan, of het gevoel, de toon en de beweeging van de Huit hangt ook van deeze oorzaaken af.

§. XXVIII. DE *gewaarwording* van de Huit, *Sensatio*.  
kan niet zonder beweeging begreepen worden,  
ge-



gelyk zy geheel bezonder in die geene ontdekt wordt, by wien zy door een wond gekwetst is geweest, zo dat zy een *lidteken* gemaakt heeft; *Cicatrix.* invöegen dat deeze zeer vaardig de veranderingen van 't weer gevoelen, en dezelve gemakkelijk voorspellen kunnen; om dat die veranderingen de *dampkring* door de winden *Atmos-* veranderd zynde, die het wêer aanbrengen, *phæra.* een bezondere soort van beweeging, naamentlyk een spanning, nyping en prikkeling in dezelve uitwerken.

§. XXIX. OM de verschillende gevoelbaarheid van de Huit geschiedt het, dat de gekwetste, of die geen, welke een pyn of ontsteeking in dezelve geleden hebben, niet even goed allerhande soort van plaatsmiddelen verdraagen kunnen, zo dat het geen den een helpt, den ander dikwyls beschaadigt.

*Aanmerking.*

DIT gezegde wordt wel het meest door de ondervinding der Heelkunstenaars bevestigd, die zeer wel weten, dat alle menschen, en ook niet alle kwetfuuren, dezelve zalven, smeersels, of vette en vochtige pappen verdraagen kunnen, maar ook somtyds beledigd worden van *spiritueuse* smeersels en heete zalven. Den Geneeskundigen is het ook niet onbekend, dat eenige met pynen aan de gewrichten geplaagd, of met ontsteeking van eenig deel *Topica.* dikwyls zeer moeilyk van *plaatsmiddelen* aangedaan



daan worden, zo dat niet zonder gevaar en terug dryving van de kwaade stof aan de kwy-nende deelen zalven, pappen of *Spirituosa* gebruikt worden. Derhalven is 'er veel aan gelegen, de natuur en gesteldheid der zieke, of liever de gevoeligheid van de Huit in het gebruiken van *externa*, te kennen. Dit is men byna gewoon altyd bestendig te vinden, dat die teerder en gevoeliger vezelen hebben, gelyk de *cholericici*, minder de *spirituosa* en alle heete scherpe dingen verdraagen kunnen, welke beter met die overeenkomen, welker vezelen slapper en zachter zyn, gelyk de *phlegmatici* & *frigidi*; als aan welke alle olieachtige, vette, mitsgaders koude en vochtige zaaken nadeelig zyn.

§. XXX. DE huid is niet alleen doorweeven met zeer dunne takjes van zenuwen, die de gewaarwording van het gevoel uitmaaken, en haar sterkte, beweeging, veerkracht en tooneeuen, maar ook door zeer veele en zeer kleine takjes van Slag-aderen en Aderen, welke voortspuiten uit de *Intercostales*, *lumbares*, *Epigastricae*, *Crurales*, *Carotides* & *Jugulares externae*, waardoor niet alleen het voedende sap, maar ook inzonderheit die zoute dunner stof, welke door de waassem en het zweet uitdampst, aangevoerd wordt.

*Aanmerking.*

DE geheele huid heeft door- en uitwaasselingen, en is voorzien met ontelbaare grootere

en kleindere uitwerp- buisjes of ook pooren, door welke, van de hitte geopend zynde, niet alleen een zekere damp uitvliegt, die door de koude verdikt zichtbaar wordt, maar ook een zoutachtige vochtige stof 'er loopt by droppels uit, die by het zweeten gezien wordt.

§. XXXI. De uitwerp-buisjes, die de stof tot het zweet aanvoeren, zyn de vervolgen der slagadertjes of der vaatjes, die het bloed aanvoeren, invoegen dat deeze flechts met een kleiner en naauwer gemaakte middellyn in de uitwerp-vaatjes eindigen.

*Aanmerking.*

HET is eene dwaaling der Ontleedkundigen, dat de doorwaasseming en afscheiding van het zweet alleen door klieren geschieden, welke geensints te zien zyn; doch het is eerder met de reden overeen te brengen, dat de aanvoerende bloedvaten zelfs, waardoor wy de slagaderen verstaan, ten laatsten uitloopen in ontelbaare opene buisjes, die in de huid ingevoegd zyn, waardoor de stof, die uit het lichaam gedreeven moet worden, uitgaat.

§. XXXII. Derhalven is het gebruik van de huid niets anders, als dat zy voor eerst is het werktuig van 't gevoel, vervolgens de algemeene zeef en *doorsiepering* van 't gantsche lichaam, door welkers behulp al dat uittewerpene vocht, 't welk overvloedig, onbekwaam en de leevende

*Emuncto-  
rium.*

dige



dige vóchten nadeelig is, uitgedreeven wordt, met één woord, dat zy het bygevoegde werktuig is der zo heilzaame doorwaassening, zonder welke het leeven en de gezondheid niet in stand kunnen blyven.

*Ziekte- en Geneeskundige Beschouwing  
van de Huit.*

§. XXXIII. DE ziekten, die een vaste plaats in de huid hebben, zyn de volgende. Voor eerst te veel zweeten, zo dat zonder hette of warmte van buiten het zweet uitbreekt en drupswyze neerloopt, en dit geschiedt meest van de al te verslapté en verzwakte toon van de huid en haar uitwerp-buisjes.

*Aanmerking.*

DIT gebeurt zeer veel in uitteerende en langsaame koortsen, als ook na de *verheffingen* van *Paroxys-*  
*intermitteerende* koortsen breekt het zweet over-*mi.*  
vloedig uit, en ten laatsten komt 'er by die, welke door een langduurige ziekte aangetast zyn en aan een flappe maag en kwaade vertee-  
ring der spyzen kwynen, inzonderheit op die tyd, als de verstrooiing van den Chyl geschiedt, overvloedig het zweet uit, dewelke echter niet voortkomt uit de kragt van de natuur, dat is, de omloop van 't bloed en de toon en sterkte der vaste deelen vermeerderd zynde, maar eerder, op dat ik met het gemeen

Serum.

spreeke, uit zwakheid van de natuur, dat is uit de vermindering van de toon der deelen vooral van de huid zelve, om dat deeze deelen te veel verflapt zynde het bloed en de vochten hier blyven hangen, en niet wel voortgaan, en dus scheidt de *Wey* van 't bloed en vloeit door de pypjes van de huid; waaruit de reden blykt, waarom het allen zwakken en kwynenden zo gemeenzaam is overvloedig te zweeten; als ook waarom *refrigerantia acida*, *nitrosa* & *adstringentia* meer na- dan voordeel doen, doch de *roborantia*, *stomachica* en de gematigde *balsamica* in dit zweeten te stuiten een zeer goed middel verschaffen, te weeten om die reden, dat zy toon en kragt aan de vaste deelen geeven en de omloop der vloeistoffen herstellen. Ook zyn in dit zweeten nadeelig alle de *opiata* en *anodyna*, om dat zy de *atonia* vermeederen, dewyl anders de zelve, alwaar het zweet door een al te sterke toetrekking opgeslooten is, gelyk als in zwaare pynen en de koorts, door het slap maaken der pooren en pypjes het zweet verwekken, van welke zaak men leezen kan de uitmuntende *dissertatie* eertyds geschreeven van *Ettmuller*, Professor te Leipzig, *de virtute opii diaphoretica*.

Rigor.

Horror.

§. XXXIV. Ten tweeden hebben ook *Styfheid* en *Yzing* met een verkoeling van de huid, inzonderheit van de buitenste deelen, een vaste plaats in de huid zelve, en in haar vezelachtige, zenuwige en peesachtige al te togetrokkenene



kene deelen, en in de samengedrukte bloedvaten.

*Aanmerking.*

DEEZE toevallen zyn zeer gemeen in het aankomen van *intermitteerende* koortfen, in alle zwaare pynen en krampachtige ongemakken, van welke foort zyn de *Pathemata*, welke *Hypochondriaci* en *Hystericae* overkomen, by welke de uiteindens koud zyn, samengetrokken worden, en een ftyfheid over het geheele lichaam komt, wat de uiterlyke deelen aangaat. Eenig onderscheid echter is 'er tuffchen de *Horror* en *Rigor*. Want in een *Rigor* zyn de buitenfte deelen alleen droog, hard en fcherp; doch in een *Horror* beeven zy en worden gefchud, 't welk echter altoos met een gewaardwording van koude gefchiedt. Deeze toevallen van de huid zyn niets anders dan een foort van een al te famengetrokken toon van de huid, of om klaarder te fpreken, een *kramptrekking* *Spasmus*. van de huid, waardoor haar vezelen fterk famengetrokken, en de onderhuitsche vaatjes en uitwerpbuisjes gedrukt worden, waarom het bloed niet behoorlyk naar en in den omtrek van 't lichaam vloeit, en om dezelve oorzaak is onder deeze toevallen de *doorwaaffeming* zeer ver- *Transpiration.* minderd, het bloed en de andere vochten worden naar binnen gedreeven, en 'er komen dikwyls op ver afgelegene plaatfen vergaarderin- gen van bloed en vochten, die vol gevaar zyn.

§. XXXV. TEN derden komt 'er een toeflui-



*Lini-  
menta.*

ting van de pooren in de huid, en daar van daan een hinder in de uitwaassening of van oorzaaken, die buiten zyn, als koude, *besmeerselen*, en *Cataplasmata*, die *adstringeerende* zyn, en van buiten op het vel gelegd worden, of van eene gemoeds aandoening, als schrik, of van oorzaaken van binnen, als kramptrekkingen en pynen. Want in zwaare pyn en kramptrekking van de binnen deelen worden de onderhuitsche buisjes samengetrokken, en de uitwaassening belet; het welk ook geschiedt door *Emetica*. *Braakmiddelen*, en scherpe *purgantia*.

§. XXXVI. TEN vierden krygen onder de ongemakken van de huid, de gezwellen ook de voornaamste plaats, waarby een groot verschil is, namentlyk naar dat de oorzaaken verscheiden, of ook naar dat de deelen in de huid aangedaan zyn.

*Verruca.* §. XXXVII. Voor eerst zyn derhalven de *wrat-  
ten* te overweegen, welke of met een dunne *Penfiles.* steel en *hangende* zyn, of met een breede platte *Sessiles.* basis op de huid *zitten*. Beide deeze foorten komen voort van het *voedend vocht*, dat uit de *Lympha nutritia.* gescheurde vezeltjes en hairvaatjes, die in de huid eindigen, gestort is, en het vezelachtige weeffel van de huid opzet. De eerste zyn met geen diepe wortel voorzien, en kunnen door binding gemakkelyk weggenomen worden; doch de laatste, in oppervlakte breeder zynde, worden ligter uitgesneden door een cirkelsneedde, met geen zeer scherp mes gemaakt, of ook door een

een *brandmiddel*, 't geen in een gat van een pleis- *Cauterium.*  
ter gevoegd wordt.

§. XXXVIII. DE *weeren*, *lykdoorns*, of *Exter-Calli.*  
*oogen* komen van de verdikking van het voedend *Clavi.*  
vocht, en van de samendrukking van de on- *Helos.*  
derhuitse pooren. Dezelve zyn gewoon op de  
huit, inzonderheit der voeten, voort te ko-  
men, en zyn niet zonder gevaar, zo 'er een  
de peezen wat diep beledigd heeft, om dat in  
besmette lichaamen, en die door ouderdom uit-  
geteerd zyn, ligtelyk een *Inflammatie* komt, en  
in een *Sphacelus* overgaat.

§. XXXIX. BLAASACHTIGE gezwellen zyn,  
wanneer de *Opperbuit* in blaasjes opgetild wordt, *Cuticula.*  
die met eenig vocht gevuld zyn, en onder dee-  
ze zyn de zweetblaasjes, welke ligtelyk van  
een scherp ingehouden zweet voortkomen in  
de zomertyd, als men zich aan koude bloot  
stelt. De *Ring-worm* komt insgelyks van een *Impetigo.*  
wegvreetend vocht, dat onder de *Opperbuit*  
gestort is, en in *zemelachtige schilfers* veran- *Crustæ*  
dert. *Witte lazari* of *Morphæa*, by de Hoogduit- *furfura-*  
fers *Meisser Ausschlag* wordt geheeten, wanneer *ceæ.*  
de vlakken scherper en grooter zyn, en de *Alphus.*  
*Epidermis* zelfs wegvreeten en hard maaken.  
Hier toe moet ook gebragt worden de *Dauwworm*, *Herpes.*  
welke *miliaris* of *exedens* (wegvreetende) is; de  
eerste brengt de *Opperbuit* tot puisten, die  
met jeukte verzeld zyn, en naar *geersten-zaad* *Semen*  
gelyken, deeze kruipt ook verder voort: doch *mili.*  
de laatste vreet om het scherp en waterachtig  
vocht



vocht de huid weg, en dringt dieper in. Hier  
*Zona.* hoort ook toe de *roode Omloop*, welke niets  
 anders dan een foort van *Dauwworm* is, en e-  
 ven als een riem om het middenste gedeelte  
 van den onderbuik omgaat, waarvan men een  
 voorbeeld leezen kan by *Tulp*, en *Joh. Langius*  
 in zyn *Epistol. Medicinal.* De ergste kwaal van  
*Lepa A-* deeze is de *lazery der Arabieren*, welke van de  
*rabum.* Grieken, *Olyphants-ziekte* geheeten wordt, alwaar  
*Elephan-* de Huit van het geheele lichaam met lelyke  
*tiasis.* vlakken vol zweeren, die in schubben overgaan  
 met pyn en jeukte, zwelt, hard wordt, en een  
 onoogzienlyke gedaante krygt. Veel zachter  
*Scabies.* is de *Schurfdheid* zelve, wanneer de Huit in  
 meer of min vochtige puisten oploopt, die  
 voortgebragt zyn van een stilstaande scher-  
 pe wey, en inzonderheid aan de uiteindens,  
 aan handen en voeten naamentlyk, moeilykheid  
 veroorzaaken. Waarvandaan 'er vochtig schurfd  
 is, als 'er veel vocht uitgestort wordt, of droog,  
 't welk met grooter jeukte en moeilykheid ver-  
 zeld gaat, en gemeenzaamer is aan oude lieden,  
 en menschen, die van een droog *temperament* zyn.

§. XL. DOCH van een grooter gevaar en een  
*Carbun-* scherper gezwel is de *Pestkool* of *Negenoo*, welke  
*culus.* met een zeer scherpe pyn en ontsteeking verzeld  
*Anthrax.* zynde, dieper in de Huit indringt; deeze is of van  
 een goeden aart, die tot *Ulceratie* overgaat; of  
 kwaadaartig, welke ligt in een *Sphacelus* veran-  
 dert, en is gewoon een algemeen toeval te zyn  
 by die geene, welke met *Pestziekte* besmet zyn,

§. XLI. Hier

§. XLI. HIER behooren vervolgens ook toe de *Kinderpokken*, welke niets anders zyn dan *Variolæ*. *exulceratien* van een stilstaand wey van 't bloed tusschen de huid en Opperhuid; dezelve zyn of dieper, en dus ook met grooter *inflammatie* en menigvuldiger, of onderscheiden en meerder oppervlakkig, weinig hette en gevaar hebbende; sommige laten lidtekens na, andere weer niet.

§. XLII. DE *Mazelen* zyn roode vlakken van *Morbilli*. eene geringe grootte, in eene scherpe koorts, door eene *Critique beweging* tusschen de derde *Motus* en vierde dag naar den omtrek van 't Lichaam *criticus*. voortgedreeven, welke zonder *suppuratie* eenige dagen daarna verdwynen.

§. XLIII. DE *Purpur-ziekte* bestaat in vlakken *Purpura*. even als geerstenzaad, op het aanraaken ruw, of van eene roodachtige, of witte kleur, welke laatste met dunne waterige blaasjes zichtbaar zyn, van gelyken ook door eene koorts uitgezet, ontstaan van eene verrotte en bedorvene *lymphe*, waar by een groote jeukte is, welke vlakken ook na eenige dagen verdwynen. Doch zo het een *langduurige kwaal* is, *Malum* duurt zy dikwyls eenige maanden, en keert *chronicum*. somtyds ook weder.

§. XLIV. ONDER de min kwaadaardige vlakken moet men ook de *geele Lever-vlakken* brengen, of die bruin uit den blauwen zyn en het aangezicht zeer mismaaken, zynde inzonder *Maculae hepaticæ* heit in de zomer te zien, en op dien tyd ook *flavescentes*.



*Excre-  
menta.* wederkeerende, van kwaade galachtige deeltjes, die eigentlyk *uitwerpselen* zyn, uit het bloed hier gebragt.

*Maculae  
scorbu-  
ticae.* §. XLV. DE *Scorbutike Vlakken* zyn bruin, en hebben meest al hun plaats op de Dyen en schenkels, somtyds ook op de armen, doch zyn veel grooter, en komen voort van een bedorven verflaagen bloed in de onderhuitse buisjes om hun *Slymachtigheid* stilstaande.

*Viscositas.  
Lentiginos.  
Lens.* §. XLVI. DE *Zomersproeten* zyn vlakken ter grootte van een *lints*, mismaakende inzonderheit het aanzicht, somtyds ook de voeten, nog veel erger dan de lever-vlakken, en die in galachtige onzuivere lichaamen dikwyls voortkomen van de zonnestraalen, die op het aanzicht nedervallen.

*Furunculus.* §. XLVII. ONDER de gebreken van de Huit moet men ook brengen de gezwellen der klieren, en onder dit de *Bloedvin*, welke een *geïnflammeerd* gezwel is van een onderhuitsche klier, nogthans in een naauwer omtrek begreepen, met roodheid en hette, van een slymachtig onzuiver bloed, daar stilstaande, voortgebragt, in eene *exulceratie* overgaande, inzonderheit zo men ze met *Emollientia* behandelt.

*Paronichium.* §. XLVIII. DE *Vyt* is een gezwel aan de uiteindens der vingeren, of toonen, doch inzonderheit aan de handen, verzeld met ontsteking, voortkomende van eenige droppels bloed, tusschen het *Beensclies* uitgestort: zy wordt ook

*Perio-  
stium.*

in 't

in 't latyn *Paronychia* geheeten: is onverdraagelyk pynlyk, en zo men ze in tyds niet te hulpe kooft, komt 'er *Gangræna* by.

§. XLIX. HIER toe behoort ook het ontftiekend gezwel der *klieren onder de Okfelen*, in een *Glandu-  
exulceratie* uitloopende, dat niet zonder groote *le oxillarum.* pyn en hette, en niet zonder koorts voortvalt, om het bloed, dat in de vaten van de okfel-klieren uitgeflost is.

§. L. DE gezwollen van de lies-klieren, die met of zonder *exulceratie* of *inflammatie* zyn. De eerfte worden *Bubones* genaamd, en gaan dikwyls in *absces* over; doch de laafte zyn menigvuldig by de geen, die een *eryfipelas* aan de voeten hebben: meefte tyd zyn deze klieren drie dagen zwellende en pynlyk, na dat zy beleidigd zyn, doch worden met 'er tyd zonder *absces* verdreeven.

§. LI. HIER toe zyn ook te brengen de gezwollen der onderhuitfe klieren, die de grootte van een erwte hebben, en hier en daar op de armen en voeten verftrooid zyn, en door 't gevoel onderfcheiden worden. Zy zyn zeer gemeen by de fchurfdheid, inzonderheit die van eenen kwaaden aart is, en zyn met pyn en ontfteeking vergezeld; en de fchurfdheid gaat niet ligt in 't geheel over, ten zy deeze gezwollen eerft weggenomen zyn.

§. LII. DE gezwollen der klieren aan den hals ook zonder ontfteeking en pyn, van een ftil-



staande slymachtige *lympba* ontstaan, zyn zeer gemeen aan kinderen, en die met *kwaadzeer* en *Tinea.* *schurfsheid* des hoofds, als ook met scherpe druipingen der oogen behebt zyn; welke ziekten door deeze gezwollen aangevoed worden, en niet ligtelyk verdwynen, ten zy ze eerst verdreeven zyn.

*Coryza.* §. LIII. IN de zwaarhoofdigheid en de *exulceratien* van de keel, en in de gezwollen onder de kin, worden dusdanige gezwollen gezien, die *Fomenta.* zonder *suppuratie* zyn, en voor warme *stoofmiddelen*, en verzagende *cataplasmata* wyken.

§. LIV. VAN veel meer gevaar zyn de gezwollen der *kwyklieren*, die grooter zyn, leggende achter de ooren, en *Parotides* genaamd worden, om dat zy met *inflammatie*, een zeer heftige pyn, en roodheid ontstaan, en niet zelden tot *suppuratie*, inzonderheit in kinderen, overgaan, en gewoon zyn niet zonder koorts te zyn, en zelfs voor een gevaarlyk toeval der koortsen gehouden moeten worden.

§. LV. IN de klieren van den hals komen gezwollen van veel meerder grootte van een slymachtig *lympba*, dat hier zich ophoudt, welke *Strumæ* geheeten worden, en die, zo zy tot een aanzienlyke grootte komen, *krop-zweeren* genoemd worden.

§. LVI. DAAR is ook een soort van zonderling gezwel, dat op het hoofd plaats heeft, en tusschen de Huit in 't *Panvies* verzameld wordt *Pericranium.*

van

van het uitgestortte voedsaame sap , daar by één gehoopt, het welk men *blind-gezwel* gewoon *Talpa*. is te heeten.

§. LVII. IN het aangezicht zelve zyn kenlyke *werten* , 't welk bultjes zyn weinig *Vari.* grooter dan Hennipzaad, welke een smeerachtige en bloédige stof in zich bevatten; in dien dusdanige puisten grooter zyn , en ook in eene grootere menigte op één maal en tegelyk het aangezicht aantasten , geeven zy een groot vermoeden, dat hier een *veneriaale* besmetting plaats heeft , inzonderheit van een *Gonorrhæa*, die door *adstringentia* kwaalyk geneezen is. In het aangezicht zelve moet men ook aanmerken de *Rooze - drup* , die *Gutta* een bult- en puistachtig gezwel van 't aange-*rosacea.* zicht is, verzeld met hette en een drupping van een scherpe *fschor*, welk ongemak meestentys des zomers komt, en niet ligt overgaat , wanneer het eens zyne vaste plaats genomen heeft.

§. LVIII. VAN den zelven aart is'er een gezwel, doch meerder met zweeren verzeld, 't welk alleen de Huit van 't hoofd en 't bekeeneel van buitenen beslaat, zeer gemeen zynde by kinderen, en dat men gewoon is te noemen *Tinea capitis* of *Crusta lactea*; voortkomende van een chylachtig , verslaagen voedzaam vocht, dat scherp en bedurven is.



## I. HOOFDSTUK.

## VAN HET HAIR.

*Pili.*

§. LIX. **H**ET *Hair* moet ook tot de Huit, en dus tot de bekleedfelen van het lichaam gebragt worden; om dat het hair op alle plaatfen groeit, uitgezonderd op de voetzoolen en in de palmen der handen. Op het hoofd is het 't allerlangft, vervolgens aan de baart, nog korter onder de oksfelen en op de liezen, het allerkortft op 't overig lichaam.

*Lanugo.*

§. LX. WANNEER het hair voor 't *Microscop* gehouden wordt, is het doorfchynend, en op verfcheide wyzen onderfcheiden, doch niet hol, of met eenig merg opgevuld, gelyk het gevoelen van anderen is: het heeft geen volkomen vlakke oppervlakte, doch is met verfcheide uitftekken voorzien, en als 't ware met een *wolligheid* bezet. Het groeit gelyk een plant, en ieder hair heeft zyn eigen *bulbus*, daar het in vast hangt, beneden in het vet is het vast met de uiteindens der Zenuwen en vliezen. Om de pyn, die 'er ontftaat, wanneer de wortel van een hair uitgetrokken wordt, is de *bulbus* buiten twyfel met holligheeden en vaatjes voorzien, gelyk wy de veders, die in de vogels in plaats van hair zyn, aan het onderfte gedeelte hol en met een vocht gevuld zien.

§. LXI. HET

§. LXI. HET wordt gevoed niet met een zoutachtige uitwerp-stoffe, maar uit een overvloedig voedzaam sap, het welk om dat het menigvuldiger is in vochtige onderwerpen en in vrouwen en kinderen, zo groeit het hair by deeze ook gemakkelyker en in grooter menigte; doch in oude lieden, in drooge en uitgemagerde lichaamen, en na dat de vochten door eene langdurige koorts vervloogen zyn, groeijen zy niet meer uit gebrek van voedsel, maar vallen eerder uit.

§. LXII. NAAR het verschil van 't voedend vocht, ja ook met betrekking op de klimaatën verschillen de hairen veel, en hebben eene andere koleur. Want in koude landen zyn zy witter en geeler, in gematigde bruin, in warme zwart; by oude lieden veranderen zy in grys. Wat hun maakfel aangaat, zy zyn in drooge harder en meerder gekruld, gelyk wy in de volkeren van *Æthiopiën* zien; in vochtige, gelyk vrouwen en kinderen, zyn zy zachter: voor 't overige dient over het nauwkeurig maakfel van 't hair na gezien te worden *Bidloo in Anatomia: Act. Erud. Suppl. Tom. II. sect. 9. pag. 436.*

§. LXIII. SOMMIGE hairen worden met ons gebooren, hoedanige die van 't hoofd, de oogleden en wenkbrauwen zyn: andere komen maar op zekere tyden voort, gelyk die van de baard en schaamdeelen. Het nut der hairen is, dat zy het lichaam tot verziëring zyn, het  
zel.



zelve eene zekere befcherming tegen de koude geeven, en ook aan de onderhuitsche pooren of zweet-pypjes een vaste fteun verfchaffen. Daarenboven bevryden zy het lichaam van het overtollig en onnut voedendfap; waarvan voorbeelden bekend zyn, dat na het affnyden der hairen de hoofdpynen en druipingen der oogen op gehouden zyn, vermits zy na hunne affnyding gewoon zyn fterker aan te groeijen.

*Ziektekundige Befchouwing.*

§. LXIV. ONDER de ziekten der hairen munt inzonderheit uit een gantsch byzonder ongemak, en wel eene *landziekte* in Polen en boven-Silefiën, welke daarom den naam van *Poolfche vlecht* draagt, en niets anders is als eene groote menigte hairen om malkander gewonden, door behulp van eene lymachtige ftoffe, zo dat zy grooter dan een vuift en dikwyls veel meer zyn.

*Aanmerking.*

DIT gezwel ontftaat op het hoofd, fomtyds ook, echter zeer zeltfaam, by de fchaamdeelen. Eer deeze uitwas gefchiedt, worden de menfchen met verfcheidene en zeer zwaare aandoeningen gekweld; eenige hebben zwaare hoofdpyn, andere worden *uitzinnig*, andere *jichtachtig*, eenige zyn gekweld met toevallen gelyk die van de Venus-ziekte; welke ongemak-

makken terstond ophouden, zo dra deeze uitwas op het hoofd gebeurt; meesten tyd is deeze ziekte erflyk, en komt, eens geneezen zynde, dikmaal weder. Die eene hairvlecht hebben zyn gezond van gesteldheid, als zy dezelve maar niet affnyden of met de kam te ontwarren zoeken, anders komen 'er zwaare toevallen, somtyds de dood zelfs. Zy komt voor het grootste gedeelte voort door het gebruiken van zeer geestachtige en voedsaame spyzen, en de oorzaak van deeze aandoening is eene al te groote slapheid der klieren onder de Huit van 't hoofd, en eene verwyding der buizen, die de wortels der hairen uitmaaken; waardoor het zeer lymachtig *water*, 't welk in *Lympha*. de hairen voortgedreeven wordt en uit de pooren druipt, eene onderlinge samenkleeving onder malkander maakt.

§. LXV. Tot de ziekzens der Hoofdharen behoort ook hunne *uitvalling*, dewelke gemeen- *Deflu-*  
lyk na langduurige zwaare ziekzens, koortsen, *vium*.  
inzonderheit na de *Teering* en *Longs-teering* be- *Tabes*.  
gint, en ontstaat of uit een gebrek aan voed- *Phthisis*.  
sel, of dat de pooren van de Huit al te zeer verflapt en de klieren te veel uitgedroogd en dor zyn. De oude lieden worden ook menigvuldig met dit ongemak aangedaan.

*Aanmerking.*

DAT dit ongemak voortkomt van de slapheid en *atonia* van de Huit op het hoofd, kan

ONTLEEDK. *Verz. I. Verv. III.*

L

dit



*Linimentum* - dit tot een bewys ftrekken, om dat de *fineer-*  
*ta.* *selen*, die de toon der Huit verfterken, by uit-  
 ſtek dit gebrek tegengaan, gelyk het *decoctum*  
*conorum pini ex cerevisia*, als ook de *Effentia Ben-*  
*zoini*, met het even gezegde 'er bygevoegd.  
 Doch zo het uit eene al te groote dorheid is,  
 hoedanig het by oude lieden gebeurt, dan  
 wordt het geneezen door een ſmeerfel, klaar  
 gemaakt uit de *Radix Althea*, *sperma ceti*, *oleum*  
*amygdalarum dulcium* & *Effentia styracis*.

§. LXVI. HET derde foort van ziekten,  
*Fiffura.* dat aan de hairen eigen zy, is hunne *fplyting*,  
 wanneer zy in verſcheidene draaden van één  
 gaan, die inzonderheit aan hunne uiteindens  
 te zien zyn. Dit ongemak komt voort van  
 een onzuiver zout voedsel, waarom het de  
*Scorbutici* dikwyls aantaft.

*Calvities.* §. LXVII. DE *Kaalheit* is ook een ongemak  
 aan den ouderdom zeer gemeen, voortkomen-  
 de van de al te naawe en ſamengedrukte poo-  
 ren en klieren van de Huit. Op dat derhalven  
 de hairen weer groeijen zouden, zo de ouder-  
 dom nog niet te hoog is, zyn de bovengemel-  
 de *linimenta* van noden, die de pooren van de  
 Huit openen en het voedend vocht naar het  
 bovenſt van de Huit trekken.

IV. HOOFDSTUK.

VAN DE NAGELN.

§. LXVIII. **D**E nagelen schynen uit de Zenuwachtige verlengde tepeltjes, welke op de Huit staan en in haaren net-achtigen rok vast zitten, samengegroeid te zyn, gelyk *Malpighius de org. Taët. pag. 23.* breeder uitlegt.

*Aanmerking.*

BYZONDERE vaten, die tot de nagelen behooren, heeft *Job van Meekeren Obs. Chirurg. cap. 66.* gevonden, en eene *scharlaken roode bed-* *Stratus*  
*ding* onder dezelve te gelyk met eene klierach- *cocci-*  
tige zelfstandigheid ontdekt. Dat de nagelen *neus.*  
uit eene zeer gevoelige Zenuw-peesachtige zelfstandigheid voortgroeijen, blykt daaruit, dat wanneer zy een weinig laager afgesneeden worden, en wel in de lengte, 'er een zeer zwaare pyn uit voortkomt. (d.)

*Ziektekundige Beschouwing.*

§. LXIX. DE voornaamste ziekte, die aan de

(d) MALPIGHIUS heeft misgetast omtrent de natuur der nagelen, dewyl zy niets anders zyn dan een verhard *Epidermis*, en van dezelve natuur. Het geen JOB VAN MEEKEREN gemeend heeft te zien, is denkelyk niets anders geweest dan het *Rete Malpighianum* of de bovenste oppervlakte van de Huit zelve. Zie de *Physiolog. pag. 429.*



de nagelen gebeurt, is wanneer zy *exulce-reeren*, 't welk fomtyds van eene belediging van buiten gefchiedt, doch met zeer groote pyn, en in onreine lichaamen niet zonder ge-vaar.

*Aanmerking.*

IN de kwetfingen der nagelen moet men zich inzonderheit van alle vettigheid wachten, ook van olien, welke men nooit aan Zenuw-pees-achtige deelen zonder belediging brengen kan. Doch veel voordeel zal men krygen uit een of twee druppels *Balfem de Copaiva* of *Balfamus Peruvianus*, of *oleum Therebinthinæ*, het zelve met enkel wafch bedekkende, en dat niet alleen om de pynen te verzachten, maar ook om de famengroeijing te bevorderen.

## V. H O O F D S T U K.

### V A N H E T V E T.

§. LXX. ONDER de Huit legt terftond de Vet-rok, welke niets anders is als een doorschynend vlies, famengefteld uit zeer kleine buisjes, zakjes, en celletjes, welke eene vet-achtige zelfftandigheid inhouden, over het vlies der Spieren gelegd zynde.

*Aanmerking.*

DAT 'er byzondere vet-buisjes zyn, heeft  
Mat-

*Malpighius* gesteld, welke zeer duidelyk in het *Darmnet* van kikvorschen gezien worden; doch <sup>*Omentum.*</sup> deeze buisjes zyn eerder de zydelyke takken der *Slagadertjes*, uit welke de vette zelfstandigheid van den Chyl en 't wey gevoerd wordt naar de lobbetjes en celletjes in het vlies, 't welk de *basis* van 't bevatte vet is.

§. LXXI. DE celletjes of zakjes, die het vet in zich hebben zyn *trosgewyze* onder malkan- <sup>*Racema-*</sup> der samengebonden, en worden zichtbaar in li- <sup>*tim.*</sup> chaamen door magerheid uitgeteerd, of komen te voorschyn, wanneer het vet in kookend water gesmolten is.

*Aanmerking.*

HET is wel waardig ter deezer plaatse aan te tekenen, dat niet alleen in lichaamen, door magerheid uitgeteerd, maar somtyds ook in *Melancholici* geen het minste overblyffel van vet in 't lichaam gevonden wordt. Dus hebbe ik drie *Melancholici* ontleed, en wel de eerste, die zich zelve in eene melancholische ylhoofdigheid verhangen hadt; deeze schoon sterk van lichaam was geheel en al van *vet* ontbloot. De <sup>*Pinguedo.*</sup> ander was een student, welke hier aan de kinderpokken stierf, zynde van eene melancholische gesteldheid: na de ontleeding vond ik niet het minste vet by hem. De derde persoon was eene vrouw, die uit melancholie *Rottenkruid* <sup>*Arsenicum.*</sup> ingenomen hadt: zy was, geopend zyn- de, van binnen geheel zonder vet. Egter



moet ik dit ook zeggen, dat niet altoos allen, die aan eene *tabes* of *Phthisis* sterven, van vet beroofd zyn, maar dat het zelve fomtyds in eene vry groote menigte by hun ontleeding gevonden wordt.

§. LXXII. DIE eene brandende koorts hebben, wordt het vet dikwyls zeer schielyk verteerd, het welk ook in eene *uitteerende* koorts gebeurt.

*Aanmerking.*

HET vet smelt door eene al te groote hette, wordt in de aderlyke vaten ontfangen, en waasemt voor een gedeelte door het zweet weg, een gedeelte wordt men met de pis kwyt, waarom de *Hæstici* hun water zonder eenig geluid afslaan, gelyk met de olien geschiedt, en de pis, die koortfige ontlast hebben, heeft een zeker vlies van verscheidene koleuren boven op dryven, welke zich ook hechten aan de zyden van het *urinaal*.

§. LXXIII. GEMEENLYK wordt 'er eene groote menigte vet gevonden omtrent de Nieren, 't *Omentum*, *Mesenterium*, 't Hart, de *Mammæ*. *Borsten* en omtrent de klieren, en wel in die buitenste vliezen, die deeze deelen gewoon zyn te omringen. Doch op het voorhoofd, *oogleden*, lippen, op de *penis*, *Scrotum* en de *Palpebræ*. ooren wordt geen vet gevonden.

*Aanmerking.*

HET vet, dat binnen het lichaam gevonden wordt,

wordt , is gemeenlyk *smeer* geheeten , en *Axun-* van een weinig samengepakter en dikker<sup>gia.</sup> maakfel. Doch het vet, dat men buiten het lichaam tusschen de tusschenwydtens der Spieren vindt, is van een dunner en meer zwavelachtigen aart, waarom het ook geeler koleur heeft dan het *smeer*. Doch de uiterste leden ontbeeren het vet, om dat het daar van geen gebruik is, en de koude, die deeze deelen meerder aanraakt, schynt ook deszelfs uitvloeiing uit de pooren der Slagadertjes te beletten.

§. LXXIV. OMTRENT den Navel, Billen, Dyen houdt zich gemeenlyk eene groote menigte vet op, om dat de Spieren daar zeer groot zyn, welker tusschenruimtens meestal door het vet opgevuld worden, op dat het lichaam overal glad en gelyk gemaakt wordt.

*Aanmerking.*

HET overvloedige vet op de billen brengt veel toe tot een gemakkelyk zitten.

§. LXXV. HET vet verschilt ook in menigte naar het temperament, de sexe en de gesteldheid van 't lichaam.

*Aanmerking.*

Dus die een flapper en spongieufer vleesch hebben, voeden veel meer vet dan die vander drooger inhoud zyn. Daarna brengen de *Bloedryke Sanguini-* en de *sanguineo-Phlegmatici*, als ook de *sanguineo-*<sup>nei.</sup> *melancholici* eene grooter menigte vet voort en hou-



houden dit by hen, dan de *Cholerici* en *Melancholici*. De vrouwen hebben ook veel meer vet dan de mannen, want de aankleefing van 't vet vereifcht eenen traager voortgang van bloed, en eene gematigde hette, welke in bloedryke vrouwen, en die van eene sponsachtige gefteldheid zyn, waargenomen worden.

§. LXXVI. DE ftoffe van 't vet is geen bloed, maar eerder de vette en boterachtige zelfftandigheid van den Chyl zelfs.

*Aanmerking.*

Wanneer wy willen hebben, dat dieren, by voorbeeld verken, kapoenen enz. fchielyk vet worden, dan moet men dezelve op plaatfen fluiten, daar zy zich niet kunnen bewegen; vervolgens hen te eeten geeven voedsel, het welk eene menigte vet verfchaft, dusdanige zyn meel, of koorn, gerft, rogge, tarw, boonen, gemaalen erweten wel beflaagen, gelijk ook melk. Tot vetmefting der dieren brengt ook veel toe het drinken van warmwater, en op deeze wyze wordt niet alleen de vette en olieachtige zelfftandigheid beter uit het voedsel getrokken, maar ook worden de *openingen*, waarnaar toe het voedend fap gebragt moet worden, in het gantsche lichaam beter geopend en uitgebreid, waarom het eene konftgreep is, indien iemand fchielyk beeft wil vet maaken, dat hy ze opfluit en hen met warm water dikwyls en op verfcheidene maalen beft voedsel geeft.

Al-

*Alpinus in Medicina Ægypt.* verhaalt de wyze, hoe de Egyptifche Vrouwen vet worden, en zegt dat het deeze is; namentlyk zy gebruiken menigvuldig de baden, altoos Spyzen van eene gemakkelyke kooking, en drinken tusfchen beiden warm water.

§. LXXVII. HET gebruik van 't vet is, dat het verftrekt tot voedsel van 't lichaam, waarom vette menfchen langer de honger kunnen tegenftaan dan magere; te weeten, gefmolten vet en olie met een waterachtig vocht wel onder een gemengd, maakt een *Melkdrank*, van *Emulfiō*, welker natuur de Chyl zelfs is.

*Aanmerking.*

DIT leerftuk heeft zyn gebruik in de Prakteyk: de geene, die eene fcherpe en brandende koorts hebben, moeten niet veel voedsel gebruiken, indien zy dik en vet zyn, en kunnen lang zonder voedsel het leeven en hunne krachten uithouden. Doch zo zy mager en door eene overgroote hitte aangetaft zyn, dan moet men hen fchielyker een bekwaam voedsel laaten gebruiken, op dat zy het geweld der ziekte kunnen uitftaan en hunne krachten behouden.

§. LXXVIII. HET vet tempert ook de zoute fcherpheid en het fcherpe vocht, waarom wy *Acrimonia* zelden *ſcorbutike* lichaamen vet zien; en al de ziek tens, die uit het Zout voortkomen, zyn altoos van een erger natuur en uitwerkfel in



magere dan in vette lichaamen, en die vol vochten zyn.

*Aanmerking.*

DAT de Zouten met allerhande foorten van angels en punten voorzien zyn, waarmede zy de vaste deelen afknaagen en fchaaven, is dui- delyk en beweezen: en deeze fcherptens en fte- kels der Zouten worden niet beter verftompt, en van hunne befchaadigende kracht beroofd, als wanneer zy met vettigheeden en oliën ver- mengd worden, dewelke als 't ware met hun flymerig en takachtig bekleedfel deeze ftekels omvatten, op dat zy al hun vermoogen misfen. Dus is het zeer bekend, dat de vergiftigde kracht der *Caustica* niet zekerder en beter kan overwonnen worden, dan door het menigvul- dig gebruik van vettigheeden. Waaruit blykt, dat de buitenspoorige zoute hoedanigheeden zo nadeelig niet zyn aan vette als aan magere, en die van alle vet beroofd zyn. Waarom wy ook zien, dat deeze meerder dan de vette onder- hevig zyn aan *rheumatismi*, *catarrhi* en pynen, ook aan ongeregelde buikloopen.

§. LXXIX. HET vet befchermt ook de ze- nuwachtige en gevoelige deeltjes van het li- chaam voor de koude, waarom wy zien, dat de magere meerder van de koude beledigd wor- den dan de vette.

*Aan-*

*Aanmerking.*

DE koude is de menschelyke natuur, of om beter te spreken, de leevendige bewegingen van het bloed, zeer tegenstrydig, om dat zy de vloeibaarheid, zonder welke de omloop, die het leeven in stand houdt, niet ongeschonden blyven kan, aan de vloeistoffen beneemt, en dezelve doet verdikken: vervolgens om dat zy de openingen der kanaalen verstoppt, dik maakt, toetrekt, en de zenuwachtige deelen door een vyandige kramp samen trekt. Tegen dit schaadelyk uitwerksel van de koude beschermt het vet de vochten en zenuwachtige deelen, waarom magere lieden, zo zy zich voor de ongemakken der koude willen wachten, zich wel dicht en warm behooren te kleeden. Inzonderheit is het in de koude goed zyne voeten, buik en de plaats van de maag wel warm te houden,

§. LXXX. HET vet doet ook veel tot de schoonheid van het aangezicht en de hals, dewyl het de tusfchenruimten der Spieren opvult; waarom het zelve weggeteerd zynde het vel samenkrult, en 'er rimpels komen, gelyk by oude lieden gebeurt.

§. LXXXI. HET vet brengt ook veel toe tot de buigzaamheid der deelen, die anders ligt droog en ftyf zouden worden.



*Aanmerking.*

HET vet verzacht en maakt glibberig de harde, beenige, kraakbeenachtige en vliezige deelen, en maakt ze daar door bekwaamer om hunne bewegingen te volbrengen; waarom by alle gewrichten een vet slymachting vocht is, druipende uit de dus genaamde slymklie-ren, van *Clopton Havers* een Engelsman, het eerst ontdekt.

*Ziektekundige Beschouwing.*

§. LXXXII. VOOREERST krygt men ongemak van het vet, wanneer het overtollig is; want de al te groote vetheid maakt het lichaam niet alleen lelyk en dikwyls aan een wanschepfel gelyk, maar neemt ook de bekwaamheid weg om alle de bewegingen van het lichaam te volvoeren, en inzonderheit die, welke tot de vaardigheid van 't lichaam en kracht der beweging behooren.

§. LXXXIII. TEN tweeden veroorzaakt het ten uitersten eene benauwdheid en moeilykheid in de ademhaaling, waarom de vette ligt benauwd van borst worden, en zo zy het lichaam sterk beweegen, of de trappen opklimmen, wordt hun al de adem benomen, om dat namentlyk het vet de toon der Spieren beneemt, welke niet naar behooren kunnen verwyderd worden.

§. LXXXIV. TEN derden volgens de onder-  
vin-

vinding van *Hippocrates Sect. II. Aph. 44.* ster-  
ven de vette fchielyker, worden moeilyker van  
eene ziekte hersteld, en zyn meerder daaraan  
onderworpen als de magere, vermits hier de  
doorwaasfeming moeilyker is.

*Aanmerking.*

Zy vervallen ligtelyk tot *Apofthemata*, tot  
*benauwde borst*, steen in de Nieren, flaaperig-*Aftma.*  
heid, waterzucht, zuchtige gezwellen der bee-  
nen; en vette Vrouwen worden onvruchtbaar,  
krygen ongemakken aan de Baarmoeder, om  
dat 'er omtrent de trompet van *Falloppius* al te  
groot een menigte vet is. Hier van is de re-  
den ligt te begrypen, om dat het vet al de va-  
ten drukt, inzonderheit de kleine, waar door  
de vrye omloop van het bloed en vochten ver-  
hinderd wordt, en de doorwaasfeming moei-  
lyker voortgaat, waarvan bederf in het bloed  
en vochten, eene zeer vruchtbaare stoffe voor  
*Morbi chronici*, voortkomen. Veel moeilyker  
ook, gelyk de ondervinding overvloedig ge-  
tuigt, worden vette menschen oud, gedeelte-  
lyk om dat 'er eene grooter menigte van uit-*Sordes*  
*werp-vuiligbeeden* in hunne lichaamen is, gedeel-*excre-*  
telyk om dat de omloop van het bloed, door *mentitiæ.*  
welkers hulp de ziekten gezuiverd en over-  
wonnen moeten worden, in die lichaamen  
zeer belemmerd en moeilyk geschiedt. Heel  
anders gaat het in magere lieden toe, die ge-  
meenlyk wyder vaten dan de vette hebben,



welke kleiner vaten, doch meerder in getal hebben.

§. LXXXV. EENE al te groote vetheid maakt by de Vrouwen eene mindere ontlasting der maandelyksche Zuiveringen, en zo zy zoogen- de zyn, wordt 'er minder melk afgescheiden.

*Aanmerking.*

DIT geschiedt voornaamelyk om de klein- heid der vaten en der affchei-buisjes; ook hou- den de Maandstonden, het geen aanmerkelyk is, eerder in vette dan in magerè op.

§. LXXXVI. AL te groote vetheid maakt de Vrouwen inzonderheit onvruchtbaar, om dee- ze reden, dat de *zaadachtige waassem* niet door de *Tubæ Falloppianæ*, volgens het algemeen ge- voelen, naar het *vrouwelyk Eijernest*, zo deeze *deelen met vet bezet zyn, gaan kan.* Vervol- gens om dat ook in vette Vrouwen de vaten veel kleiner dan gewoonlyk zyn, waarom 'er geen volstaande menigte bloeds om het Ey te bevruchten, en de Vrucht te voeden, aange- voerd wordt, kan 'er noodwendig geene be- vruchting gebeuren. Ten laatsten komt hier nog by, dat de al te vette en dikke Vrouwen minder bekwaam zyn tot de mannelyke omhel- zing en het ontfangen van het zaad.

§. LXXXVII. TEN laatsten zyn vette men- schen zeer geschikt om *polypi* en *abscesen* te kry- gen.

*Aan-*

*Aanmerking.*

I E D E R kan ligt de reden hier van begrypen, zo hy aanmerkt, dat 'er in dusdanige lichaamen een zeer traage en verhinderde omloop is, zo om de kleinheid der vaten, als om de traager beweegings-kracht der vaste deelen; waarom door dikke vochten, waarby nog andere oorzaaken komen en mede samenloopen, welke het bloed en wey schielyk doen stremmen, gelyk van dit soort zyn koud drinken, als ook het inzwelgen van geestachtige dranken, of ook het misbruik van alle zuuren, ligt *polypeuse* samengroeiingen van het bloed in de grooter vaten verwekt, of door het ten eenemaal stilstaan van 't bloed, en de vochten in de kleinder vaatjes *Apostemata* voortgebracht worden; het welk de ondervinding zelve bevestigt, waar door wy dagelyks leeren, dat de geen, die vol humeuren en vet zyn, het meest aan deeze kwaalen onderhevig zyn.

VI. H O O F D S T U K.

VAN DE SPIEREN VAN DEN ONDER-  
BUIK.

§. LXXXVIII. **N**A dat wy in den mensch het vet weggenomen hebben, komt 'er een vlies te voorschyn, het welk onmiddelyk op de Spieren legt, waaraan het vet zeer vast vereenigd is, van welke het ook met  
veel



veel omzigtigheid moet afgescheiden worden. Verkeert wordt dit vlies voor den vleezigen rok en het derde bekleedfel van het lichaam gehouden, het welk niet in den mensch, doch wel in Beesten, gevonden wordt, en een vleezige rok is, leggende tusfchen de huid en het vet, door welkers behulp zy de huid bewegen om de vliegen weg te jaagen: deeze rok wordt in 't geheel by den mensch niet gevonden, ten zy misfchien in 't aangezicht.

§. LXXXIX. DIT vlies van den mensch, dat alle Spieren in het algemeen bekleedt, is vry fterk en hard, inzonderheit het geen over de *Musculi recti.* rechte Spieren loopt, en wordt zelfs voor het grootste gedeelte gemaakt uit de peezen van de Spieren van den onderbuik; en dit vlies is dubbel, het welk voornamelyk in waterzuchtige en in *Tumores Oedematosi.* zuchtige gezwollen gezien wordt, alwaar tusfchen de verdubbeling van dit vlies dikwyls eene groote menigte gestold wey gevonden is, het welk uit de gebrokene *Vasa lymphatica* gestort is.

*Aanmerking.*

Ik ben van gevoelen, dat alle vliezen, die in het menschelyk lichaam zyn, nooit enkele *Lamellæ.* blaadjes zyn, maar uit verscheidene blaadjes famengesteld, tusfchen welker tusfchenruimte ook de vaten zelfs, zo bloed- als watervaten loopen, en daarom is het minder twyfelachtig, dat het vlies der Spieren uit eene dubbele *lamella* famengesteld is.

§. XC. VYF paar Spieren noemen de Ontleedkundigen aan den onderbuik op. Voor eerst het *rechte paar Spieren*, om dat hunne vezelen langs *Par recta* het midden van den onderbuik van het Borst-<sup>*torum*</sup> been af naar de samenvoeging der schaambe-<sup>*musculo-*</sup> deren loopen, en met het *zwaardwyze kraakbeen* <sup>*Cartilago ensiformis.*</sup> vereenigd worden, ook met de twee onderste kraakbeenderen van het *Sternum*, naar de ribben gaande. De rechte Spieren hebben vier of vyf onderscheidingen, welke met de pees van de op- of nederklimmende Spier zeer naauw vereenigd zyn; buiten twyfel ten dien einde, op dat de samendrukking en uitzetting van de overige Spieren op den onderbuik met vereenigde krachten om de ingewanden te perffen op dezelve tyd geschieden zou.

§. XCI. HET tweede paar wordt het *schuins* <sup>*Par mus-*</sup> *nederklimmende* geheeten om den loop der veze-<sup>*culorum*</sup> len, welke schuins van de ribben naar het schaam-<sup>*oblique*</sup> been nedergaat. Het komt voort van de vyf-<sup>*descen-*</sup> de, zesde, zevende en agtste ribbe, en wordt vereenigd met de *voorste groote Zaag-spier*; waar-<sup>*Serratus*</sup> van dezelve ook moeilyk los te maaken zyn. Ver-<sup>*anticus*</sup> volgens legt deeze Spier van de negende, tien-<sup>*major.*</sup> de, elfde en twaalfde ribbe tusfchen de uitsteekfels van de *serratus inferior posticus*, en ontfangt in deeze vereeniging een zenuw uit een tusfchenribbige tak, en ook zyn vaten, name-lyk Slag-aderen en Aderen, uit de *intercostales*, en eindelyk op den buitenften rand van het schaambeen eene breede pees, die van on-



deren de rechte Spier bedekt, waarover zy naar de *linea alba* loopt.

*Parmusculorum oblique adscendentium.* §. XCII. HET derde paar is het *schuins opklimmende*, 't welk onder het nederklimmende gelegen is: deeze Spier ontspruit met een vleezig beginfel van den rand van het *os Ilei* en van het ligament tusfchen het fchaambeen en de *spina ossis sacri*; zyn pees zit aan de agtste, negende, tiende, elfde en twaalfde valsche ribbe vast, waarom hy in de uitademing den borst naauwer maakt. Hy loopt in de *linea alba* uit met een lange pees, welke in twee blaaden verdeeld wordt, in onderfte en bovenfte namelyk: het bovenfte blad loopt over de rechte Spier heen, en het onderfte onder dezelve; waarom de rechte Spieren als in eene fcheede van deeze peezen verborgen zyn.

*Parmusculorum Pyramidalium.* §. XCIII. HET vierde paar wordt het *pyramiedswyze* geheeten, het welk men zeer ligt vinden kan, als men maar doorsnydt en wegneemt de pees van de *schuins nederklimmende* Spier, over de rechte Spier gelegen, onder welke hy onmiddelyk legt; zy loopen met peesachtige vezeltjes uit in de *linea alba*, voortkomende van het midden gedeelte van het Schaambeen onder desfelfs rand, hebbende de lengte van een kleine vinger.

*Parmusculorum Transversalium.* §. XCIV. HET vyfde paar wordt het *dwarfsche* genaamd: deeze ontspruiten van den onderften rand van het *os Ileum*, en worden vastgehecht aan de dwarsche uitstekken der lendenwer-

wervelen , daar zy ook vereenigen onder de valsche ribben met het *Diaphragma* , waarom het *Diaphragma* van dezelve los gemaakt moet worden.

§. XCV. DEEZE spieren behooren niet alleen tot den onderbuik, maar ook tot de lendenen; want de *Nieren* leggen terstond onder *Renes* dezelve.

*Aanmerking.*

Om dat de *Nieren* met hunne kanaalen, die men *ureteres* noemt , terstond en onmiddelyk hunne legging hebben onder de *musculi transvers*, zo is 'er niets gevaarlyker dan hier te moeten snyden en eene *operatie* te doen, indien iemand hier gekwetst is, om dat, gelyk de ondervinding getuigt, de *Nieren* of de *Ureteres* ligt beledigd worden.

§. XCVI. VOOR 't overige worden de Spieren van den onderbuik terstond en zeer naauw vereenigd met het *Peritonæum*, waarvandaan hunne peezen naar de *linea alba* gaan, zo dat zy zeer moeilyk van dezelve kunnen afgescheiden worden.

§. XCVII. DE witte streep is langs het midden *Linea* van 't *abdomen* tot de samenvoeging der schaam-<sup>*alba*</sup> beenderen uitgestrekt, en uit de peezen van dezze Spieren samengesteld, in welkers midden de *Navel* is.

*Umbilicus.*

*Aanmerking.*

Om de zenuw-peesachtige zelfstandigheid is



de *linea alba* van een zeer fyn gevoel, waarom men hier vooral niet fnyden mag, noch fteeken met de *Paracentesis*, of ook eenige andere Heelkundige *operatie* verrichten; inzonderheit is die plaats, alwaar de navel is, gevoelig, waarom de geneesmiddelen, die zeer werkfaam van natuur zyn, gelyk *purgantia* (α), *diuretica*, & *sedativa* of *anodyna* op de navel gelegd, zeer wel ftoelgang verwekken, de pis afdryven en de pynen van het gedarmte verzachten kunnen, om dat, gelyk uit de Ontleedkunde bekend is, 'er eene groote en onderlinge medegevoeligheid der zenuwachtige deelen is.

§. XCVIII. DE fpieren van den Onderbuik ontleenen hunne Slag-aderen en Aderen gedeeltelyk van de *Intercostales*, *mammariæ*, gedeeltelyk van de *lumbares* & *epigastricæ*; doch hunne zenuwen, die vry groot zyn, krygen zy van de *dorsales* en *lumbares*.

§. XCIX. BOVEN alles is aanmerkelyk omtrent de Spieren van den onderbuik, en wel omtrent de dwarfche, de op- en neder-klimmende, een gat, in hun onderft gedeelte, dat de gedaante van een ring heeft voor de door-

(α) Gelyk de *Emplastrum faponatum* van BARBETTE voor kinderen, het welk op den buik gelegd in hardlyvigen ftoelgang verwekt: doch in volwasfene kan tot een voorbeeld ftrekken de *Oleum Ricini Americani*, gelyk ook de *Pinguedo ceti*: want deeze kunnen in de grootfte hardlyvigheid ftoelgang verwekken, zo zy maar alleen op de navel gelegd worden.

doortogt van de *processus peritonæi* en de zaadvaten in mannen, doch in vrouwen voor de ronde banden van de Baarmoeder.

*Aanmerking.*

DE voorziende natuur heeft zeer wysfelyk de doorbooring van deeze peezen door de gezegde vaten, dus geschikt, dat zy niet recht uitloopt, maar in eene schuinsche leiding is, waardoor het uitzakken van het gedarmte des te beter belet is.

§. C. HET gebruik van deeze Spieren is de ingewanden in den Onderbuik te bevatten, zyne holligheid in te dringen en te verwyden, en by gevolg ook de ingewanden, die 'er hun plaats in hebben; vervolgens ook door de beweging van verwyding en indrukking de voortgang der spyzen in het gedarmte en van de drek te bevorderen; dan ook de ontlasting van de drek en de pis; als mede ten tyde van de verlosfing de vrucht en de nageboorte voort te dryven, en iets tot de buiging van 't Lichaam by te brengen; eindelyk de Ademhaaling te helpen en de braaking gemakkelyk te maaken.

§. CI. TWEEDERLEY is de beweeging, die de Spieren van den Onderbuik hebben, de een is onvrywillig, de andere vrywillig. De eerste geschiedt door middel van de Ademhaaling; om dat deeze ook buiten onze willekeur geschiedt; en om dat de Spieren aan het *Diaphragma* en de ribben vast zyn; gebeurt het,



dat zy in de werking van de Ademhaaling altyd bewoogen worden ; de laatste geschiedt , om dat de Ademhaaling ook eene vrywillige beweging is , vermits naar ons welgevallen de ribben opgetild en neergedrukt kunnen worden , by gevolg ook de Onderbuik uitgezet en famengeperft.

*Aanmerking.*

DE beweging van deeze Spieren hangt zo te famen , en valt zo gelyk in met de Ademhaaling , dat , zo in de inademing de borst uitgezet wordt , de buik dan famengeperft is ; en indien in de uitademing de borst naauwer wordt , de buik meerder ruimte heeft. Derhalven kan het lichaam naar welgevallen zwaarder of ligter worden ; het laatste geschiedt in de inademing , het eerfte is de uitademing , waarom het lichaam in de inademing op het water dryft , doch in de uitademing zinkt.

§. CII. DAT de beweging der Spieren van den onderbuik aan het gezag van de wil onderworpen is , blykt uit de kwytwording van de drek uit den aars , van de pis uit de blaas , van de vrucht uit de baarmoeder , en van de winden uit het gedarmte ; vermits wy dezelve naar ons welgevallen door de inhaaling van lucht in de borst en de famenpersing van den onderbuik vermeederen of verminderen kunnen. En om dat het eene werking is , die buiten de wil van den menfch geschiedt , wordt deeze beweging  
van

van den buik en Spieren ook in de slaap verricht , waaruit voortkomt , dat door middel van dit de *motus peristalticus* van de maag en het gedarmte, de ingang van de chyl in de aderen, en de voortgang door de melk-vaten, van gelyken door den borstbuis, als ook de omloop van het bloed door de *vena porta* en by gevolg door de lever, geholpen en bevorderd wordt. Waaruit de reden ook blykt, waarom over dag, als wy waaken en het lichaam beweegen om de scherper ademhaaling, de ontlasting van de verteerde stoffen en de omloop van het bloed door de ingewanden van den onderbuik vaardiger en sneller geschiedt, doch traager en langzaammer in de rust en wanneer wy slaapen.

### *Ziektekundige Beschouwing.*

§. CIII. DE ziekten, die haar verblyf, en om dus te spreken haare vaste plaats in de Spieren van den onderbuik hebben, zyn voornamelyk *abscesfen*, en *apostemata*, welke gemeenlyk voortkomen van eene buiten zynde oorzaak, gelyk als na eene vooraf gegaane heftige kneuzing , val , of steek ; en zeltzaamer van een oorzaak van binnen om de *stasis* der vochten in de vaten van deeze Spieren.

### *Aanmerking.*

MEN moet ter deezer plaatse aanmerken , dat de *abscesfen* onder de Navel van grooter gevaar



*Regio  
hypoga-  
strica.*

*Regio  
epiga-  
strica.*

*Calculi.*

*Tumor  
oedema-  
tosus.*

zyn, dan die 'er boven zyn, gedeeltelyk om dat de bloedvaten daar fyner en minder in getal zyn, gedeeltelyk om dat in de *plaats van den onderbuik* het *peritonæum* veel dunner is, en veel lighter door een *apostema* scheuren kan, wanneer de etter in het hol van den onderbuik komt: doch in den *bovenbuik* is het *peritonæum* veel dikker, en de *linea alba* breeder, en daar kan zo eene groote opzameling van bloed niet komen om de naauwere vaten. Daar na moet men dit nog onthouden, dat in dusdanige *abscessen* ligt *sinus* en *fistuleuse* kanaalen gemaakt worden om de etterachtige stoffe, die daar gemakkelyk stilstaat en door de pooren dringt, en de vliczen of kraakbeenig of *scirrheus* maakt. Ten laatsten moeten wy aantekenen, dat in dergelyke *abscessen* ligt *steen*en of zandachtige samengroeifels voortkomen. Zie *Miscell. Natur. Cur. Dec. II. Ann. 3. Observ. 183* & *Ann. 5. Observ. 107*.

§. CIV. HET tweede ongemak van deeze Spieren is een *zuchtachtig* gezwel, het welk dikwyls zeer groot zynde de Spieren van den onderbuik beslaat, inzonderheit in waterzuchtigen, als 'er door 't barsten van de *vasa lymphatica* vocht tusfchen haare tusfchenwydtens buiten de vaten zich ophoudt.

#### *Aanmerking.*

IN waterzuchtige gebeurt de uitstorting van de *lympba* op verscheidene plaatsen; want zy gebeurt of alleen tusfchen de Spieren van den on-

onderbuik en de verdubbeling van het *peritonæum*, het welk zo veel gevaar niet in heeft, of het is in het hol van den onderbuik zelve, 't welk niet zonder groot gevaar is. In het eerste geval, alles gelyk zynde, heeft de *Paracentesis* plaats; doch dezelve moet nooit te werk gesteld worden, wanneer 'er een groote verzameling van water in het hol van den onderbuik is, om dat hier ligt het koudvuur door het invallen van de lucht in de ingewanden komen zou.

§. CV. TEN derden komen uit de verwyding of scheuring der peezen van de spieren in den onderbuik omtrent het Schaambeene *darm- en zak-* *Herniæ intestina-*  
*breuken*, dikwyls zeer groot van gedaante zynde. *les vel*  
*scrotales*

*Aanmerking.*

INDIEN de zak- of darm-breuken nog niet oud zyn, en 'er maar een klein gedeelte van 't *intestinum ileum* in 't *scrotum* nedergezakt is, dan is 'er slechts eene verflapping van de *procesfus peritonæi*; doch als 'er, 't welk somtyds gebeurt, eene groote menigte darmen, en menigmaal wel, tot verwondering, de helft van dezelve in het *scrotum* uitgezakt is, zo dat het gezwel de grootte van een menschenhoofd heeft, dan is 'er eene scheuring van de peezen van den onderbuik geschiedt, en het kwaad is ongeneeslyk.

§. CVI. TEN vierden ontspruit 'er eene *lies-* *Hernia*  
*breuk*, die zeer gemeenzaamen en by vrouwen en *inguina-*  
mannen is, van eene beginnende verflapping of *lis.*



verwyding van de *processus abdominis*; doch in vrouwen, om dat de *ligamenta uteri rotunda*, eveneens als by de mannen de zaadvaten, door de ring gaan, welken de peezen der spieren samenstellen, en door *Nuck diverticulum* geheeten wordt, komt 'er door deeze verwyding, dat een gedeelte van het *intestinum Ilei* naar de liezen zakt, menigmaal met een groot en verhaaft gevaar van 't leeven voor de vrouwen, die zulks overkomt.

§. CVII. TEN vyfden krygen de spieren van den onderbuik *sphacelus*, het welk in waterzuchtige gebeurt, na dat de *paracentesis* geschied is, of door eene barsting van zelve in de navel, of door een lang beslooten geweeft zynde etter in *apostemata*, wanneer het door het vertoeven in eene zeer stinkende bederflyke stoffe verandert, welke langfamerhant, de plaats, daar zy zich ophoudt, door haar bederf besmet.

*Heelkundige waarneemingen omtrent de Spieren van den Onderbuik.*

§. CVIII. DE *Paracentesis* moet nooit te werk gesteld worden onder of boven de navel; veel minder op de navel zelve, om ontleedkundige redenen; om dat hier een samenloop van peezen op de *linea alba* is; doch men moet dezelve eerder doen ter zyde van de navel, ten minste ter afstand van twee vingeren breed.

§. CIX. INDIEN in een Heelkundig geval  
een

een sneede geschieden moet in de spieren van den onderbuik, dan moet men wel letten op den loop der vezelen; en dat inzonderheit in de rechte spieren, welker vezelen in een rechte lyn loopen van het borstbeen tot het schaambeen; zo derhalven eenige kwetsing hier eene sneede vereischt, moet men dezelve nooit dwars doen.

*Aanmerking.*

DEEZE wet moet men in 't algemeen als vast en bestendig aanneemen, dat men de vezelen der spieren nooit dwars moet doorsnyden, maar altoos op hunnen loop letten, om dat zy dan zeer moeilyk samengroeijen, en tot geene volkomene geneezing komen willen.

§. CX. Vermits het *Peritonæum* onder de Navel zeer teer is, en ligt scheuren kan, daarom moeten de *abscessen*, daar voortkomende, schie-lyker geopend worden dan die, welke 'er boven zyn, op dat door een al te lang uitstel dezelve van binnen niet doorbreeken, en de etter, in het hol van den onderbuik komende, daar geene andere edeler deelen aansteekt en bederft.

VII. H O O F D S T U K.

VAN DEN PENSZAK, NAVEL, EN  
DARMNET.

§. CXI. **D**E *Penszak* is een vlies, het welk *Perito-*  
voort onder de spieren van den *naum.*  
On-



Onderbuik legt, zeer dun, en van binnen zacht en glibberig, doch van buiten ongelyker; het bevat de ingewanden van den geheelen Onderbuik.

*Aanmerking.*

DE spieren, inzonderheit de *transversi*, zyn van binnen vast aan den Penszak, en kunnen 'er zonder denzelven te kwetsen zeer bezwaarlyk afgescheiden worden: van boven is het *Péritonæum* vereenigd met het *Diaphragma*, waar van het ook niet zonder moeite kan afgescheiden worden.

§. CXII. DIT vlies is dubbel, 't geen duidelyk in waterzuchtigen gezien wordt, in welken het somtyds tot twee, somtyds tot drie *lamellæ* gemakkelyk kan afgescheiden worden. Dit wordt men ook duidelyk in de rug gewaar, naardien de Nieren, Pisvoerders, Pisblaas, Zaadvaten, ook de grootere bloedvaten, en de *arteriæ & venæ umbilicales* onder de verdubbeling van dit vlies loopen en verborgen leggen.

*Aanmerking.*

DE Bloedvaten niet alleen, maar ook de waternvaten loopen door de verdubbeling van dit vlies, waarom dezelve geborsten zynde 'er *hydatides*, *apostemata*, of waterachtige gezwollen voortkomen.

§. CXIII. DE Penszak wordt zeer naauw vereenigd met de tweede en derde wervel van de lende-  
de-

denen, zo dat hy zonder kwetsing 'er nauwlyks afgescheiden kan worden. Dit vlies maakt ook den eersten rok van 't *Diaphragma* uit, in dat gedeelte, 't welk naar 't *abdomen* is, doch van onderen bekleedt 't het *os sacrum* en *pubis*.

§. CXIV. HET is aanmerkens waardig, dat 'er in 't midden van den onderbuik door het *peritonæum* een streep loopt, de witte streep ge- *Linea* naamd, die door den famenloop der peezen, *alba*. welke in de spieren van den onderbuik zyn, gemaakt wordt: welke streep onder de navel met veel vet bedekt en smaller is, dan boven dezelfde alwaar zy veel breeder en dikker is.

§. CXV. DE wonderbaarlyke uitzetting van het vlies van den Penszak verdient geene mindere aanmerking; waarvan waterzuchtige, zwangere, en die darm- of zak-breuken hebben, tot voorbeelden kunnen strekken.

*Aanmerking.*

DE verwyding of rekking van den Penszak wordt voornamelyk gezien in *herniæ scrotales*, zo zy zeer groot zyn. Want somtyds is 'er meer dan de helft van het gedarmte buiten het *abdomen* in 't *scrotum* gezakt, zonder de minste bersing van het *Peritonæum*, en alleen maar met eene groote rekking van het zelve. In *herniæ umbilicales* ook, die somtyds vry groot zyn, is het *Peritonæum* niet gescheurd, maar wonderlyk uitgerekt, als wordende het gedarmte, buiten



ten den omtrek van den onderbuik gefchooten, in het zelve verborgen.

§. CXVI. HET *Peritonæum* fcheurt niet ligt, doch wordt eerder weggevreeten in de *apostemata* van de Spieren van den Onderbuik, inzonderheit zo dezelve onder den Navel zyn, alwaar dit vlies zeer teer is.

§. CXVII. OM dat het *Peritonæum* een verdubbeld vlies is, gebeurt het fomtyds, dat tusfchen het zelve eene groote menigte wey door het barften der water-vaten verzameld en uitgestort wordt, in welk geval de *Paracentesis* buiten gevaar is, welke anders, zo 'er zich wey in het hol van den onderbuik ophoudt, zeer gevaarlyk is.

*Aanmerking.*

HIER over verdient *Nuck* nagezien te worden in zyne *Obs. Chir.* en in zyne *Adenographia*, alwaar hy eenige wel geflaagde *Paracenteses* opnoemt. Dusdanig eene verzameling van wey kan 'er ook gefchieden, fchoon de ingewanden in hun geheel en ongeschonden zyn, namelyk wanneer de maandftonden te lang opgestopt zyn, of ook wanneer men in de hette van de koorts te veel gedronken heeft.

§. CXVIII. SOMTYDS verzamelen 'er ook weyachtige stoffen tusfchen de verdubbeling van het *Peritonæum*, 't welk op de rugge is, ook onder het *Mefenterium*, en dat waardoor de *ureteres* en zaadvaten gevoerd worden, alwaar dikwyls

wyls *hydatides* of blaasjes vol water by *cachectici* gezien worden, welke indien gebrooken worden, veroorzaaken zy menigmaal een onverwacht en doodelyk gezwel.

*Aanmerking.*

By tyden ontstaat 'er by een *cachecticus* schie-lyk eene waterzucht, en die menigmaal doodely is, zo dat in eenen korten tyd de buik ver- wonderlyk zwelt, 'er weinig *urina* geloosd wordt, welke dik en roodachtig schynt, wanneer de mensch binnen eenige weeken sterft, welke schie-lyke waterzucht geenen anderen oorsprong heeft dan van de berfing der *hydatides*, welke dikwyls omtrent de ingewanden van den onder- buik, inzonderheit de lever, als ook onder het *peritonæum* op den rug groot en menigvuldig ge- vonden worden. Eene dergelyke proefneeming hebben wy voor eenige jaaren aangemerkt in het lyk van een' Hoogleeraar in de rechten, welke schie-lyk door eene *hydrops* gestorven was, en by welkers ontleeding men groote geborste- ne *hydatides* in de rug en 't *Mesenterium* zag, zyn- de de ingewanden zo zeer niet bedorven, en buiten twyfel zou men in dergelyk geval eenige hulp van de *paracentesis* kunnen bekomen.

§. CXIX. DE *navel* is in het midden van den *Umbili-* onderbuik geplaatst, en is niet anders, dan een <sup>*cus*</sup> omgedraaid gedeelte van den Navelstreng, sa- mengesteld uit eene Ader, en twee Slagaderen, <sup>*Arteriae*</sup> de *Navel-slagaderen* genaamd, omkleed worden <sup>*umbili-*</sup> <sup>*decales*</sup>



de door een gemeen dik, doch zacht, vlies, 't welk aan het *Amnion* vervolgd is.

*Aanmerking.*

DE ouden meenden, dat de Navel ook bestondt uit eene byzondere doorloopende buis, die met de blaas van de *Embryo* gemeenschap heeft, en *urachus* geheeten wordt; doch dusdanig een kanaal wordt 'er niet gevonden, dewyl het eerder een vliesachtige band is, waardoor de Navel-vaten samengebonden worden.

*Secundina.*

§. CXX. DE Navel is by het kind in 's moeders buik van zeer groot gebruik. Want het voert het chylachtig bloed van de Moeder uit de *Nageboorte* door de *vena* naar het kind, en wel vooreerst in deszelfs lever, welk bloed naderhand weer door de *Arteriæ umbilicales* naar de *Secundina* te rug gevoerd wordt; en dus wordt door middel van deeze streng gemeenschap gehouden tusschen den omloop van het moederlyk bloed met de vrucht, en van de vrucht met de Moeder. Doch wanneer het kind ter waereld komt, en door zyn eigen voedsel leven moet, dan houdt het gebruik en de werking van deeze streng geheel en al op, waarom zy ook digte by het lichaam van 't kind gebonden zynde afgesneeden wordt, waarvandaan dat geene, 't welk in de lever van de Slag-aderen en Aderen overblyft, dezelve tot een band verstrekt.

§. CXXI. DE Navel-slag-aderen zyn tweederley,

ley , en komen uit de *Arteriæ Iliacæ* van de rechter en linker zyde. In een ongebooren kind zyn zy vry wyd en ruim, naderhant vallen zy samen en worden toegetrokken , het welk ook aan de *vena umbilicalis* gebeurt, die naar de *hepar* gaande langfamerhant en met 'er tyd haare holligheid verliest en toegroeit.

*Aanmerking.*

HIER moet eene gemeene dwaaling aangemerkt worden, namelyk dat de *Arteriæ umbilicales*, als ook de *Urachus* in volwasfene een steun aan de blaas geeven, naardien zy twee dwars vingeren van de blaas afstaan , tusfchen het *Peritonæum* loopen en vry klein zyn.

§. CXXII. HET is eene aardige waarneeming, dat in een gestorven *foetus*, als men door de *vena umbilicalis* met een pyp fterk blaast, het geheel vaten-geftel in het lichaam van het kind opzwelt , 't welk eene fraaije vertooning is.

§. CXXIII. DE navel met zyne aangehechte vaten is een deel van een zeer fcherp gevoel, om dat hy zeer zenuwachtig is , en met het gantsche lichaam, en vooral met zyne zenuwvliesachtige deelen vereenigd wordt, waarom zyne kwetsingen niet zonder gevaar zyn.

*Aanmerking.*

WANT 'er is eene groote medegevoeligheid en gemeenfchap der zenuwachtige deelen in het



geheele lichaam, zodanig, dat, wanneer de een wat fterker geprikkeld of bewoogen wordt, byna alle de overige tot medegevoelendheid gebragt worden, en in ver afgelegene plaatfen dikwyls zeer zwaare toevallen gebeuren, waarvan niemand de redenen, oorzaaken en wyze van voortkomen ligt begrypen zal, dan die de vereeniging, afleiding en voortbrengfels der zenuwen behoorlyk kent. Om de vereeniging en medegevoelendheid van deeze deelen gebeurt het ook, dat doordringende geneesmiddelen, op deeze plaatfen gelegd, hunne kragt en deugd aan ver afgelegene deelen mededeelen. Dus is aanmerkelyk, dat een *unguentum* uit *purgantia* famengefteld, hoedanig het *unguentum de Arthanita* is, op de navel gelegd, de ftoelgang verwekt; indien de pis in de blaas bederft, en zy niet in ftaat is om dezelve uit te dryven, dan wordt haare loozing vryer gemaakt door eenige druppels *spiritus terebinthinæ* met *gofsygium* op den navel te leggen. Om de fcherpe krimpelingen van de buik te stillen verfchaffen eenige greinen *zibethum* een heerlyk hulpmiddel.

§. CXXIV. DE navel wordt fomtyds binnenwaarts getrokken in geweldige kramptrekkingen van den Onderbuik, namelyk by *hystericæ* en *hypochondriaci*; welke intrekking komt van het *Peritonæum*, het welk aan de *linea alba* vereenigd is, waardoor de *urachus* en *arteriæ umbilicales* loopen; waarom het vlies van den penszak door eene kramptrekking binnenwaarts getrok-

trokken wordende, de overige aangehechte deelen eene gelyke beweeging moeten uitstaan.

§. CXXV. OM dat de omtrek om den Navel van wegen de pees-zenuwachtige zelfstandigheid van een teder en fyner gevoel is, zo kan men klaar begrypen, dat haare kwetsuuren en wonden gevaarlyk zyn.

*Aanmerking.*

OM deeze reden wordt de *Paracentesis* nooit van ervaarene Heelmeefters op deeze plaats of naaft rondom dezelve te werk gesteld, op dat 'er geene stuiptrekkingen of krampachtige toevallen opvolgen.

§. CXXVI. SOMETYDS is de Navel gewoon open te gaan, en eenen doortocht te krygen, en dat wel in *abscesfen* van den Onderbuik en in Waterzucht; ook in water-navel-breuken, inzonderheit by kinderen, doch dan volgt 'er meesten tyd een *Sphacelus* en de dood.

§. CXXVII. HET *Darmnet* wordt dus ge-Omentum genoemd, om dat het als een dekfel is, 't welk over de ingewanden legt, en een vlies is in eene rondachtige gedaante, by wyze van een vogelaars weitaſch uitgespannen, met eene zekere holligheid, die tusſchen beide overblyft, voorzien met verſcheidene tak-wordingen van Slagaderen en Aderen, waaruit vliesachtige zakjes met vet gevuld, voortspruiten.

§. CXXVIII. HET *Omentum* wordt in twee deelen onderscheiden, waarvan het bovenſte



*Ala superior*, 't onderfte *inferior* genaamd wordt. Het onderfte is los en hangt vry, nergens aan vast; het bovenfte is van vooren vereenigd met *Fundus*. den bodem van de Maag, met het *Duodenum*, en met het begin van 't *Jejunum*; als ook met de Milt, doch van achteren is het vast aan het *Intestinum colon*. In een volwasfen mensch weegt het meesten tyd niet zwaarder dan een half pond, ten zy hy zeer vet zy. Doch in dieren is hier een groot verschil naar maate van hunne vetheid, en het gewicht is dus ook grooter of kleiner.

§. CXXIX. HET *Omentum* heeft verscheidene bloedvaten, welke of dezelve van de Maag zyn, en *gastro-epiploica* genaamd worden, of die het byzonder heeft, welke in zyn onderfte gedeelte verftrooid zyn en den naam van *epiploica* hebben. De slagaderen komen van de *Coeliaca*, de Aderen van de *Vena porta* en van haar linker tak.

*Aanmerking.*

MEN moet weeten, dat deeze vaten van tweederley foort zyn, en geen de minste gemeenschap met elkander hebben; want de *ramus arteriosus gastricus* opgeblaazen zynde zwellen de *gastro-epiploica* wel, doch geenzins de *epiploica*, om dat deeze voortspruiten van de *arteria mesenterica*.

§. CXXX. WEINIGE takjes zenuwen gaan uit het *par vagum* of *octavum* naar het *Omentum*.

Daar-

Daarom is het zelve byna zonder gevoel, en kan in breuken en in zwaare wondingen zonder pyn weggesneeden worden.

§. CXXXI. OMTRENT de klieren van het *Omentum*, daar *Hippocrates* van gewaagt, moet men dit in acht neemen, dat 'er zeer weinige in eenen natuurlyken staat gevonden, en alleen in dat gedeelte gezien worden, 't welk met den bodem van de Maag vereenigd is. De *Miscellan. Nat. Curios. Decur. II. Ann. V. Observ. 456* maaken gewag, dat in *hydropici* het *Omentum* niet alleen *scirrheus*, maar ook vol klieren was.

§. CXXXII. WAT zyne legging aangaat, het is onwaar, dat het *Omentum* tot aan de *Uterus* uitgestrekt legt, en dat, zo het al te vet zy, het zelve den mond van de Baarmoeder drukt, en dus oorzaak van onvruchtbaarheid by vrouwen zou geeven, volgens het gevoelen van *Hippocrates*.

§. CXXXIII VEELERLEY gebruiken worden 'er aan het *Omentum* toegeschreeven. Volgens ons gevoelen is het een verblyfplaats van *Diverticula* eene al te groote menigte bloeds in *Pletorici*, 't *culum*, welk by hen al te langzaam bewoogen wordt door de ingewanden van den Onderbuik.

*Aanmerking.*

DIT is ook de reden, waarom men in *scorbutici*, in *hydropici* het *Omentum* bedurven vindt, of een zichtbaar gebrek hebbende. De Vleesch-



houwers zyn gewoon uit den ſtaat van het *Omentum* over de gezondheid van een dier te oordeelen; dus gaat het ook in den menſch toe.

§. CXXXIV. A N D E R E ſtellen vaſt, dat het *Omentum* by wyze van een *meſenterium* is, dewyl door het zelve de vaten naar de Maag, het Gedarmte en de lever, loopen; in welk gevoelen *Bartholinus* is in zyne *Hiſtor. Anat.* p. 220. Doch dit gevoelen ſtrydt ten eenemaal tegen 't geen de Ontleedkunde leert.

§. CXXXV. V E E L E zyn van gevoelen, dat het Darmnet de Maag en Ingewanden veel te gemoed komt in de *digestie*. Doch dit gevoelen gaat geheel van de waarheid af, om dat dit vlies van wegen de dunheid der vaten, die dit bloed in het gedarmte voeren, geene de minſte hette verſchaffen kan.

§. CXXXVI. D O C H het gebruik van het *Omentum* is hier ook, om door zyn vet de vliezen van het gedarmte voor ſcherpheid te bewaaren, en dezelve zacht te beſmeeren, dat zy niet ligt verdroogen, of al te ſterke toetrekkingen in de pynen ondergaan, en dus dient het door zyne glibberigheid tot de beweging van het gedarmte.

§. CXXXVII. D E ziekten, waaraan het *Omentum* onderhevig is, zyn onder andere deſelfs berſting, waarvan proeven gevonden worden in de *Miscell. Natur. Curios. Decur. II. Ann. VIII. Obſ.* 75.

§. CXXXVIII. H E T *Omentum* wordt zeer dikwyls bedurven, ſtinkend, en byna weggevree-

vreeten gevonden , inzonderheit in *hydropici*,  
*cachectici* en die aan de *teering* gestorven zyn. *Tabes.*

*Aanmerking.*

Ook verhaalt *Willis* in zyne *Patholog. Cerebri Cap. IX.*, dat hy in de meeste, die aan een *tabes* en *morbi chronici* gestorven zyn, het *Omentum* stinkend en bedurven gevonden heeft. Men zie hier over ook *Peyerus de glandulis Intestin.* De reden hier van schynt buiten twyfel deeze te zyn, dat namelyk in deeze ziekten het bloed bezwaarlyk rond loopt door de ingewanden van den buik, inzonderheit de Lever; waarom het bloed opgestopt en stil blyvende in het vlies van het *Omentum*, zeer ligt tot bederving overgaat, om dat door dit gedeelte, van beweeglyke vezelen ontbloot, zeer moeilyk, zelfs in eenen natuurlyken staat, een te rug gang geschiedt.

§. CXXXIX. Soms groeit dit vlies tot eenen grooten klomp, of verandert in vet: dusdanige voorbeelden kunnen gezien worden by *Vesalius de Fabrica Hum. Corpor. Cap. IV. Miscell. Nat. Curios. Decur. II. Ann. X. Obs. 174.* en in zulken geval geraakt de Maag ligt uit haare plaats, waardoor eene geduurige hik veroorzaakt wordt. *Singul-tus.*

§. CXL. WAT het gebruik der Heelkunde aangaat, in wonden zakt het gedeelte van 't *Omentum* ligt naar buiten, 't welk, zo 't niet weer binnen gebragt wordt, door de hette en kou-



koude gedrukt wordt, en zeer fchielyk in een doodelyk bederf van *Sphacelus* overgaat.

*Aanmerking.*

DE beste raad is, zo men het niet weder in kan brengen, het te binden en af te snyden, 't welk niet buiten alle gevaar geschieden kan: anders zo het tot *Sphacelus* overgaat, verspreidt het zich verder en bederft het gantsche *Omentum*, en al het onderlegend gedarmte, waaruit noodzaakelyk de dood moet volgen. De Wonden van het *Omentum* zyn niet doodelyk, doch zo 'er een tak van een grooter vat gekwetst is, geschiedt 'er eene uitstorting, en dusdanig eene belediging wordt van de Geneeskundige *doodlykheid* geheeten, niet door eene natuurkundige noodzaakelykheid, maar door eene zedenkundige, om dat de gelegenheid moeilyk is om hier hulp by te brengen, het welk geschiedt door eene opening van den Onderbuik, en de binding van dusdanig eene wond.

*Lethalitas.*

## VIII. HOOFDSTUK.

### VAN DE SLOKDARM EN MAAG.

*Oesophagus.* §. CXLI. DE *Slokdarm* is een vliesachtig kanaal, loopende van de keel tot in de Maag, waardoor de Spys en Drank in de Maag zelve nederdaalen. Zyn begin wordt in 't duitsch Keelgat, in 't latyn *Gula*, in 't grieksch *Pharynx* genaamd, 't welk door drie paar spieren, die tot de flokking dienen, bewoogen wordt.

Het

Het eerste paar spieren wordt genoemd de *Stylo-pharyngæi*, en komt voort van het begin van 't *os styloides* der slaapbeenderen en wordt aan de onderste zyde van de *Pharynx* ingehecht. Het tweede paar wordt de *Cephalo-Pharyngæi* genaamd, 't welk het grootste is, en voortkomt van het onderste gedeelte van het *os occipitis*, daar 't met de wervelbeenderen gelederd is: dit paar wordt in het onderste gedeelte van de *pharynx* ingeplant. Deeze spieren verwyderen het Keelgat. Het derde wordt de toe-<sup>Constrictores.</sup>trekkers of *Sphincter gulæ* geheeten, welk paar den geheelen *Oesophagus* omringt, en van het *os hyoïdes* en de *larynx* afkomt.

DE *Slok darm* wordt samengesteld uit verscheidene rokken; de buitenste vervolgt met het borstvlies, en draagt den naam van gemeene; de tweede is de spierachtige, en wordt samengesteld uit langachtige en kringswyze vezelen. De derde is de zenuwachtige, met veele vaatjes en klieren voorzien: en deeze is een vervolg van het vlies van den mond, ja van de maag zelve. De vierde rok is de korstach-<sup>Crustacea.</sup>tige, met een slymachting vocht bestreeken.

*Aanmerking.*

Na dat *Du Verney* den zenuwachtigen rok hadt afgetrokken, zag hy, tegen het licht aanziende, ontallyke klieren, van de gedaante van een *lens*, waar van yder echter met een byzonder uitwerp-vat was voorzien.



Zie *Du Hamel in Philos. Vet. & Nov. Tom. II. Part. III. pag. 316.* en men moet aanmerken, dat, gelyk de Slokdarm, de Maag en het Gedarmte slechts een kanaal, die van het begin der keele tot aan den aars toe loopt, uitmaaken, dus hier ook het zelfde maakfel en weeffel van vliezen is, als zynde samengefteld uit een klier-zenuwachtig, fpierachtig en gemeen vlies. Om dit zenuwachtig gemeen maakfel is 'er eene groote gemeenfchap van de Maag met den Slokdarm, en van deeze twee met het gedarmte; waarom het niet te verwonderen is, dat 'er braaking verwekt wordt, door de vingeren zo verre in de keel te fteeken, als mogelyk is, en dat in de *passio Iliaca* of in een *colicq*, al het geen in deeze *Intestina* bevat is, de verkeerde weg uitgedreeven wordt.

§. CXLII. DE Slokdarm heeft ook zyne vaten; zyne Slagaderen krygt hy van de *Carotides*, *Aorta*, *Intercostales* & *Cœliaca*; deeze Slagaderen, die lang over het hoofd gezien waren, befchryft *Ruyfch, Epift. VI. Tom. VII fig. 3.* De aderen komen van de *jugulares*, *azygos*, en *coronaria ventriculi*.

§. CXLIII. OVER den Slokdarm loopen aanmerkelyke takken zenuwen van het agtste paar; aan weerszyden heeft hy eenen grooten met verfcheidene takwordingen. Doch de Slokdarm zelve is in den hals door de *nervus recurrens* gebonden.

§. CXLIV.

§. CXLIV. DE Slokdarm is vereenigd aan de *Aspera* *arteria*. *Luchtader*, waar onder hy legt, zo dat over deeze en de *epiglottis* alle spyzen zo vaste als vlocibaare naar de Maag moeten nederzakken. Aan het onderste gedeelte wordt hy vereenigd met de groote Slagader, en van achteren met de wervelbeenderen van de hals en rug in de lengte.

*Aanmerking.*

HET is aanmerkens waardig, dat hy op die plaats, daar hy met de *Aspera arteria* is vereenigd, zeer naauw en vleezig is. Doch zo dra hy aan de groote Slagader is gekomen, waar onder hy legt, dan wordt hy wyder en dunner.

§. CXLV. HET begin van den Slokdarm is by wyze van een *trechter*, op dat door dezelve het voedsel te gemakkelijker zou nederdaalen. *Infundibulum*. De Slokdarm doorboort het midden-rif, niet in zyn zenuwachtig gedeelte, maar eerder in zyn vleeschachtig, en wel in het bovenste van de onderste Spier van het *Diaphragma*.

*Aanmerking.*

IN de werken der Ontleedkundigen wordt het *Diaphragma* verkeerd afgebeeld, en de doorbooring van de *Oesophagus* gesteld in zyn zenuwachtig gedeelte, 't welk echter zeer onwaar is. Zie *Bartholinus de Diaphragm. Structur. nova*, p. 19.



§. CXLVI. Daar de *Aspera arteria* aan den achter kant in linker en rechter tak verdeeld wordt, worden omtrent de wervelbeenderen van de rug twee *glandulæ conglomeratæ* gevonden, of ook wel meer, een *lympa* afscheidende, omtrent de hoogte van het vyfde wervelbeen van de borst: *Vercellonius* in *Traët. de Glandulis* noemt ze *dorsales*, welke ook derzelve nieuwe uitwerp-buizen, die in den Slokdarm eindigen, beschreeven heeft. Behalven deeze buisjes uit de *glandulæ conglomeratæ*, aan de linker opening van de Maag leggende, heeft hy ook eenige nieuwe gevonden, die hy *gastrici* noemt, waar door hy gelooft, dat een vocht uitgestort wordt tot bevordering der kooking van de Maag.

*Passive.* §. CXLVII. DE werking van den Slokdarm is niet geheel en al *lydelyk*, te weeten, dat het ingenomen voedsel 'er van zelfs door heen gaat; daar eerder door eene voortdryvende en verwyderende beweeging, hoedanig in het gedarmte en de Maag *Peristalticus* wordt geheeten, de nederzakking der spyzen naar de Maag wordt geholpen.

### *Ziektekundige Beschouwing van den Slokdarm.*

§. CXLVIII. DE binnenste Spieren van de *Pharynx* worden dikwyls aangetast door een *geinflammeerd* of roosachtig gezwel, 't geen *Cynanche* is genaamt: doch wanneer het op de buiten-

tenste spieren komt, draagt het den naam van *Paracynanche*.

*Aanmerking.*

DE ontsteeking van de *Musculi interni* heeft veel meer gevaar, dan wanneer de *externi* aangedaan zyn, en zo het van overtollig bloed komt, moet de aderlaating boven alle andere hulpmiddelen de voorkeur hebben en ten eersten te werk gesteld worden.

§. CXLIX. SOMETYDS gebeurt 'er een zeer sterk toetrekken *kramp* in de keel by de af- *Spasmus.*  
*fectus Hysterici* en *Hypochondriaci*, welk toeval gemeenlyk afhangt van de opzetting van de Maag, wanneer het agtste paar zenuwen, het welk de Maag met de keel gemeen heeft, al te zeer is gespannen.

*Aanmerking.*

DEEZE aandoening is zeer gemeen by *Hysterica*, en men moet wel toezien, dat het van onkundige Geneesheeren met de *angina* niet verward worde, om dat zy somwylen zo zwaar is, dat zy de geheele flokking schynt te beletten, doch wordt ligt verdreeven door het inneemen van *antispasmodica* uit *castoreum*, *assa foetida*, of door dezelve alleen onder de neus te houden.

§. CL. IN geduurige kwaadaardige koortsen, in Pest, *dysenteria*, ontsteeking van de Maag, komt zeer ligt *inflammatie* in den Slok-  
E 3 darm,



darm, welke gepaart gaat met een zeer fcherpen brand in de keel, met eene moeilyke flokking, en eene wederopwerping der fpyzen, terwyl de tong meeften tyd met een dik, wit, en fnotachtig flym overtrokken is.

*Excoriatio.*

§. CLI. DE *ontvelling* van den Slokdarm, van de menigvuldige kinderpokken, die hier uitgelopen zyn, veroorzaakt ook eene moeilyke flokking, een brand in de keel, en eene benaauwdheid in 't ademhaalen.

§. CLII. IN de braaking en walging wordt de *motus peristalticus* van den Slokdarm omgekeerd.

§. CLIII. SOMWYLEN doen de klieren van den Slokdarm, door een gezwel grooter geworden zynde, de keel toefluiten.

#### *Aanmerking.*

VAN deeze zaak heeft *Heifter*, in de aanmerkingen op zyn *Compend. Anatom. p. 184.* eene waarneeming. Voor veele jaaren zegt hy, heb ik eenen Man geopend, die geen fpys noch drank meer kon doorflokken, om eenige hindernis, die men niet in de keel, maar in de borst wierdt gewaar. Deeze klier vondt hy in den gemelden Man ter grootte van een hoender-ey uitgezet, waar door de Slokdarm dus wierdt gedrukt, dat 'er niets meer door kon. En *Verheyen* heeft om dezelve oorzaak hem gcheel toegegroeid gezien. Zie ook *Tulp Lib. I. Cap. IV.* De keel wordt ook dikwyls toegeslooten van bui.

buiten zynde oorzaaken, die vast in dezelve blyven zitten, hoedanig een geval van eene goude ring *Stalpart v. d. Wiel, Cent. I. Observ.* en van een stuk geld *Platerius Lib. II. p. 59.* gezien hebben. Ook heeft men waargenomen, dat een gezwel van een klier, welke om de Maag gevonden wordt, geheel en al de nederzakking der spyzen belet heeft, hoewel dit zeltzaam is, vindt men 'er nogthans eene waarneeming van by *Brunner*, waarop eene ongeeneslyke *Febris hectica* is gevolgd.

§. CLIV. WAT de Heelkundige gevallen belangt, de wonding en snyding van de keel is met zeer groot gevaar verzeld, zo het narmelyk in de hals zy, voornamelyk aan het agterste gedeelte, en zo het in de borst of omtrent het midden-rif gebeurt; want daar kunnen geene geneesmiddelen geplaatst worden, en het voedsel stort in het hol van de borst. Eene langwerpige sneede van de keel in de hals is dan zo gevaarlyk niet als een, die dwarsch is.

§. CLV. HET gebeurt ook somtyds, dat een doorgeslikte brok spys, of een vischgraatje vast in de keel blyft zitten, zo dat men voor stikking begint te vreezen; in welk geval het best is te trachten het zelve uit te haalen, of neer te drukken in den Slokdarm, met bekwaame werktuigen uit balein en een spons gemaakt, welke by *Hildanus* kunnen gezien worden. Het is ook van nut, wanneer de spys in



de keel blyft zitten, een weinig ſterk op de rug te kloppen, want daar door wordt dikwyls dezelfs nederdaaling in de Maag bevorderd.

*Van de Maag.*

§. CLVI. DE Maag is een vliezig deel, uit verſcheidene ſoorten van rokken ſamengeſteld, zynde hol en geſchikt ter ontfanging, verteer- ring en uitdryving der ſpyzen.

*Dia-* §. CLVII. Zy is onmiddelyk onder het *mid-*  
*pbragma.* *denrif* gelegen, tegen wiens bovenſte gedeelte zy aanlegt tuſſchen de lever en milt en onder het *pancreas*, doch waarvan byna drie deelen in de linker-zyde en ſlechts een in de rechter gelegen zyn.

*Aanmerking.*

UIT deeze waare legging van de Maag, die zelden ter deeg van de Ontleedkundige en Geneesheeren wordt gade geſlaagen, moet haare ongeſteldheid, die zo gemeen aan de *hypochondriaci* is, verſtaan worden; als zy wordt opgeblaazen of door winden uitgezet, is 'er pyn en ſpanning in de linker-zyde, die zich tot aan de rug toe uitſtrekt, en verkeerdelijk aan de Milt wordt toegelchreven. Wy leeren hier ook uit, dat 'er vergeefs in ziekten, uit een gebrek van de Maag voortkomende, pleiſters op 't *scrobiculum cordis* geplaatſt worden, en andere middelen om de Maag te verſterken, dewyl zy eerder moeſten gelegd worden op het *hypo-*  
*chon-*

*chondrium sinistrum*, en digte by de *spinalis medulla*. Het is ook eene dwaaling, uit de onweetenheid van deeze logging voortkomende, dat men de *Maag-pyn* stelt plaats te hebben in het linker *orificium*, dewyl dit veel nader aan de rug is; de rechte zitplaats van deeze pyn is eigentlijk in de rechte opening van de Maag.

*Cardialgia.*

*Orificium.*

§. CLVIII. OP de rechter-zyde van de Maag legt de Lever, een zeer groot ingewand, vol met bloedvaten; doch de milt is aan de linker en onderste zyde van de Maag vast; maar onder het *pancreas* legt de zelfstandigheid van de Maag zelve, de bodem wordt vast gehecht met het *omentum*, en door middel van dit met het *intestinum colon*.

§. CLIX. DE Maag krygt haare warmte, welke de kooking en innerlyke ontbinding der spyzen ten uitersten helpt bevorderen, voornamelyk van die heete bloedryke ingewanden, de Lever en Milt; dewyl de eigene hitte, welke men aan het bloed, door de slag-aderlyke vaten aangevoerd, moet toeschryven, niet genoeg in staat zy om de kooking te verrichten.

§. CLX. DE zelfstandigheid van de Maag is geheel en al vliesachtig, en wel geheel en al uit rokken samengesteld. De eerste wordt gemeenlyk gezegd van het *Peritonæum* te komen, en is de buitenste; zyne vliezen loopen dwars; de tweede is de spierachtige, waarin men eenen dubbelen loop van vezelen waar-



neemt: de derde is de zenuwachtige; de vierde de *ruuwe*. Onder den zenuwachtigen kruipen de slagaderlyke en aderlyke vaten, en dezelve is met kleine kliertjes bezet.

*Aanmerking.*

DE Spierachtige is uit langwerpige en kringswyze vezelen, die de eerste in schuinsche hoeken snyden, samengesteld. Deeze kringswyze worden voornamelyk gevonden aan den bodem van de Maag, en in haar rechter gedeelte, omtrent de *pylorus*, alwaar die vleeschachtige ook dikker en menigvuldiger zyn. Daarenboven wordt 'er gevonden een zonderling maakfel van vleeschige vezelen in de lengte, van het eene *orificium* tot het ander loopende. Vervolgens is het aanmerkelyk, dat omtrent het linker *orificium* deeze vleeschachtige vezelen kringsgewys loopen. In de linker zyde, alwaar de Maag de grootste ruimte heeft, zyn alle de rokken, die de Maag samenstellen, zeer teer en fyn, om dat daar geen groote kracht wordt vereischt om de spys uittedryven, vermits om de hooger legging, met betrekking op het rechter *orificium*, de spys gemakkelyk nederdaalt; want daar zyn de *vasa brevia*. Doch omtrent den bodem en de uitloozing van de Maag zyn de rokken zeer sterk. De uitspanning nu van de langwerpige vezelen van het een *orificium* tot het ander, werkt uit, dat in de *vomit*, het geen van de eene

ope-

opening naar de andere moet worden gedreeven, overgestort wordt; waarom het dikwyls gebeurt, dat het geen terstond eerst ingenomen is, en nog in den bodem van de Maag vertoeft, niet door braaking wordt ontlast; maar wel dat de kwaade en galachtige vochten, die in het gedarmte zich ophouden, door de *vomitus* worden uitgedreeven.

§. CLXI. DE zenuwachtige rok is de zitplaats van de honger, welke anders gemeenlyk aan het linker *orificium* wordt toegeschreeven; dezelve ontstaat door het zuur worden der overgebleevene spyzen, dewyl zy door den zenuwachtigen rok met hunne zachte en geestryke zuurheid te prikkelen, eene begeerte naar spys in de Ziel verwekken.

§. CLXII. TWEE openingen heeft de Maag, *Orificia*. de linker en rechter; de eerste vervolgt aan de keel en flokdarm en is zeer zenuwryk, doch hooger als de rechter gelegen; van buiten wordt zy omringt door twee vry aanzienlyke zenuwtakken van het *par vagum*, welke naderhand over de rug van de Maag naar het *orificium dextrum* gaan.

§. CLXIII. DE Maag krygt zeer aanzienlyke zenuwen, gedeeltelyk van het agtste paar, gedeeltelyk ook van de *nervus intercostalis*; en wel in de linker zyde krygt zy ze van het *par octavum*, ter rechter zyde van de *nervus intercostalis*: uit deeze takken komen verscheidene andere kleinere voortspruiten, die



die door de wanden van het linker *orificium* verstrooid worden, en het zelve by wyze van een net of kroon omringen.

§. CLXIV. WAT de vaten van de Maag belangt, men moet aanmerken, dat de rechter Slag-aderen uit de *ramus hepaticus*, de linker uit de *spleneticus* komen; daarna aan den bodem van de Maag komt uit de *cœliaca* een Slagader, die de *gastro-epiploïca* wordt geheeten, om dat hy ook zyne onderste takken naar het *Omentum* (e) verspreidt. Van deeze gaat een aanmerkelyke tak naar de *Pylorus*, hierom *Arteria pylorica* genaamd.

*Aanmerking.*

*Vasa coronaria.*

DEEZE vaten, zo wel als de onderste *gastro-epiploïca*, die in den bodem van de Maag loopen, als de *gastrica*, welke over de rug of of het bovenste gedeelte van de Maag gaan, omringen de wanden van de Maag, hierom worden deeze vaten met een' naam *kroon-vaten* genoemd.

§. CLXV. MET de Slag-aderen gaan de Aderen verzeld, welke met haar dezelve verstrooiing hebben, waarom zy ook met dien naam worden genoemd: zy voeren het bloed te rug naar de *vena Portæ*, en wel ter linker zyde in de

(e) *Epiploën* en *Omentum* betekenen dezelfde zaak, nelyk het Darmnet: zo dat *vasa gastro-epiploïca* wil zeggen vaten, die op de Maag en op het Darmnet loopen.

de *vena Splenica*, ter rechter zyde in de *ramus Mesentericus*.

*Aanmerking.*

HET is aanmerkenswaardig, dat niet alleen de slag-aderlyke vaten van de Maag, maar ook de aderlyke, en wel beide onderling door *inmondigingen* vereenigd en samengevoegd zyn, <sup>Anastomoses.</sup> en men kan de te ruggang van het bloed uit de Slag-aderen in de Aderen door gekleurde vochten niet vinden.

§. CLXVI. DE zogenaamde *vasa brevia* zyn tweederley in foort, namelyk slag-aderlyke en aderlyke, en komen uit de *ramus splenicus arteriosus & venosus*, wordende in het linker gedeelte van de Maag ingehecht, alwaar zy de grootste ruimte en teerheid heeft, en deeze zyn gewoon: ligt te breeken, en open te gaan in een *vomitum cruentum*.

§. CLXVII. HET nut der bloedvoerende vaten is, dat het daarin loopende bloed, naar de Maag gevoerd, haar verschaft eene gematigde warmte, die tot kooking en ontbinding der Spyzen zeer nodig is; vervolgens, dat zy het fyne schei-vocht ter afscheiding naar den klierachtigen rok van de Maag brengen, en ook op dat zy beweeging, spanning en kracht aan de Maag zouden verschaffen.

§. CLXVIII. DE werking van de Maag is de Spyzen te ontfangen, voor een tyd in zich te houden, en dezelve door een bekwaam schei-vocht,



vocht, gelyk het speekfel, en 't geen de natuur in de Maag zelve ontlaft, ter deeg te ontbinden, en naderhant ontbonden zynde door de *motus peristalticus*, en de toetrekking van de *pylorus* naar het Gedarmte voort te dryven.

*Aanmerking.*

DE vertoeving der Spyzen in de Maag verschilt naar hunnen verscheidenen aart en natuur, ook naar de verschillende gesteldheid van de *motus peristalticus*, die in de Maag plaats heeft. Want vaste Spyzen, en die door kaauwing niet genoeg ontbonden zyn, vertoeven hier langer eer zy ontbonden worden; daarna hoe sterker de Maag is, dat is, hoe werkfaamer de *motus peristalticus* is, des te fchielyker worden de Spyzen uit de Maag geworpen.

*Ziektekundige Beschouwing van de Maag.*

VEELE en verscheidene ongemakken zyn 'er, daar de Maag aan onderhevig is, welke nu eens voortkomen uit gebrek van de *motus peristalticus*, dan eens, dat de loop van 't bloed niet behoorlyk toegaat, of dat het zenuw-fap, of het Maag-vocht niet wel is gesteld.

*Aanmerking.*

DE Maag heeft drierley werking: in haar *Appetitus.* huishoudt de trek naar Spys, vervolgens kookt zy die, en houdt ze eenigen tyd in zich, waarop men dan ook acht moet slaan. Hier uit  
moe-

moeten alle ongemakken van de Maag afgeleid worden, en alle Geneesmiddelen, die de ziekten der Maag zullen herstellen, moeten naar deeze drie aangewend worden.

§. CLXIX. UIT eene bedorvene beweging van de Maag komt 1.) Maagpyn. Want deeze komt nergens anders van daan dan van eene krampachtige toeknyping van de Maag, inzonderheit van haare *orificia*, voornamelyk van het rechter. Deeze pyn is zeer scherp, en doet zich gevoelen omtrent het *harte-kuiltje*, *Scrobiculum cordis*, strekt zich uit tot aan de rug, ja wel tot aan de schouders; dit ongemak komt ons veel voor in de Praktyk, voornamelyk by *Hypochondriaci*, en zo de Maag geinflammeerd is door gramschap ( $\beta$ ), vergift, purgeer- of braakmiddelen. Zy is gewoon verzeld te gaan met *dysenteria* en *cholera*; dikwyls is haar geweld zo sterk, dat zy de Lyders van hun zelven doet vallen.

§. CLXX. 2.) DE *tonus peristalticus* van de Maag wordt beledigd, door haare al te sterke opblaazing of uitzetting van winden, welke eene zeer pynlyke aandoening is, en eene groote benaauwdheid en ongerustheid te weeg brengt, zynde zeer gemeen aan *Hypochondriaci*. En om dat de opgeblaazene Maag de nederzaking van het *Diaphragma* belet, zo moet de adem-

( $\ell$ ) Om dat zy namelyk werken door de Maag *spasmodice* aan te doen: men heeft een *inflammatie* van de Maag zien ontstaan, door een *vomitif* te geeven aan eene Vrouwe, omtrent den tyd der maandelyksche Stonden.



ademhaaling benaauwd worden: hier zyn verhittende Geneesmiddelen voordeelig.

§. CLXXI. 3.) BRAAKING, welke niets anders is, als eene omkeering van de *motus peristalticus* in de Maag zelve, met eene zeer sterke toefluiting van de *Pylorus*.

*Aanmerking.*

EENE groote toeknypende en famentrekken-  
de kracht is 'er in 't rechter *orificium* van de Maag,  
en inderdaad het begin van de *motus peristalticus*,  
die door de gantsche *volumen* der ingewanden  
voortgaat, is in dit *orificium* gelegen. Somtyds  
wordt door *convulsie* dat gedeelte van de Maag,  
(’t welk hadt moeten verwyden,) en het *duode-*  
*denum* uit medegevoelendheid famengetrokken,  
en dan geschiedt de uitwerping der ingenome-  
ne stoffen niet naar beneden, maar eerder naar  
boven.

*Singul-  
tus.*

§. CLXXII. 4.) DE *bik* is wel eene stuiptrek-  
king van het *Diaphragma*, doch haar oorzaak is  
meestentyd gelegen in de Maag, en wel in haa-  
re linkere opening.

*Aanmerking.*

DIKWYLS is de enkele verkoeling, gelyk  
wy in kinderen zien, oorzaak van de hik; som-  
tyds komt zy van eene scherpe stoffe, hangen-  
de aan de rokken van de Maag, en wordt ter-  
stond door koud water te drinken geneezen;  
doch zo eene *inflammatie* of *sphacelus* deeze aan-  
doening veroorzaakt, is 'er geen, of ten minsten  
zeer weinig hoop.

§. CLXXIII.

§. CLXXIII. 5.) DE Maag kan ook met *verlamdheid* aangedaan worden: deeze kent men uit *Paralysis*. de bezwaarende pyn, wanneer de ingenomene Spyzen even als een zwaar gewicht drukken, en komt daar van daan, dat haare beweging of toon weggegaan is in de geene, die kwynende, of eerst van eene zwaare ziekte hersteld zyn.

§. CLXXIV. 6.) AL te groote uitzetting der Maag, van haare *magteloosheid* voortkomende, *Atonia* is oorzaak, dat het ingenomene te lang in de zelve blyft.

*Aanmerking.*

SOMTYDS wordt de Maag zo opgezet, dat zy tot aan de *pubes* geheel nederzakt, en alle de overige ingewanden bedekt: dusdanig een voorbeeld leezen wy by *Bonetus Sepulchreto Anatomico Lib. III. Sect. VIII. pag. 870.*

§. CLXXV. 7.) DE *kramp* is ook gewoon de *Spasmus* Maag te kwellen, die haar zeer toetrekt en vernauwt, en veel by *Hypochondriaci* plaats heeft; zy geschiedt dikwyls met eene zeer scherpe pyn en eenen grooten afkeer van Spys. De oorzaak is meestentyd de gramschap, koud drinken, een sterk purgeer- of braakmiddel.

*Aanmerking.*

DAT de Maag door de *kramp* wonderlyk kan toegetrokken worden, getuigt *Hildanus Lib. I. Cent. 4. in Observ.* van een meisje, 't welk door het misbruik van de *Crocus metallorum*, en ONTLEEDK. *Verz. I. Verz. VIII.* G de



de daarop gevolgde *hypercatarsis*, gestorven, en de Maag zo toegetrokken gevonden is, dat zy nauwelyks de grootte van een Hoender-ey hadt.

§. CLXXVI. 8.) DE *inflammatie* van de Maag is veel gemeenzaamer ziekte als men doorgaans gelooft, en is gevaarlyk als zy als een toeval by andere ziekten komt.

*Aanmerking.*

DIE door vergift, of een sterk purgeer- of braakmiddel sterven, of door gramfchap of koud drinken, sterven alle aan een *inflammatie* in de Maag, en de daaruit voortspruitende *spbacelus*; zo by *morbi acuti*, by kinderpokjes en mazelen, ook by eene *dysenteria* eene *inflammatie* van de Maag komt, is zy in 't algemeen doodelyk, waarvan wy elders breeder gehandeld hebben.

§. CLXXVII. 9.) DE *exulceratie* van de Maag is wel een ongemak dat zeldzaam voorkomt, doch zy heeft fomtyds ook plaats na een *cholera*, *dysenteria*; ook ontstaat zy by *Hypochondriaci* uit eene verzameling van zuure en bytende vochten.

*Aanmerking.*

DIT ongemak wordt zelden geneezen, komt ligt weder, en vereifcht niets dan *demulcentia* en *delinientia*, van alle fmaak beroofd zynde.

§. CLXXVIII.

§. CLXXVIII. 10.) EEN *Bloed-braaking* ge- *Vomitus*  
beurt van het barsten der *Vasa brevia* in de *cruentus*.  
vrouwelyke kunne, als de Maandstonden ag-  
terlyk of geheel opgehouden zyn, of ook by  
*Hypochondriaci*, als de mild opgezet of geob-  
strueerd is.

§. CLXXIX. 11.) SOMTYDS kunnen de Wor-  
men de Maag ook op eene doodelyke wyze  
doorvreeten.

§. CLXXX. 12.) DE Maag wordt ook door-  
gevreeten van het ingenomen vergift, en dee-  
ze doorvreeting is meestentyds doodelyk.

*Aanmerking.*

VOORBEELDEN hier van kunnen geleezen  
worden in de *Miscell. Nat. Curios. Decad. I. An-*  
*no IV. & V. Obs. 38. Decad. II. Anno II. Obs. 76.*

§. CLXXXI. EN dit zyn de gebreken van de  
Maag, die uit het beledigen van de zelfstandig-  
heid voortkomen; nu gaan wy over tot die,  
welke hunnen oorsprong neemen uit eene kwaa-  
de verzameling van vochten, hier vergaderd;  
en deeze zyn:

1.) DE *Honds-honger*, welke de Grieken *Fames*  
*Bélamos* noemen, of eene zeer vergroote Eet- *canina*.  
lust, welke voortkomt van een zuur vocht, 't  
welk de rokken van de Maag sterk prikkelt;  
deeze komt gemeenlyk als de ziekten aan 't  
afgaan zyn.

§. CLXXXII. 2.) DE *spyswalging*, of de in 't *Anore-*  
geheel verlooren gegaan zynde Eetlust, welke *xia*.



verscheidene ziekten verzelt, en voortkomt van het stomp worden der vochten in de Maag.

*Aanmerking.*

DE werking van de Maag, waar onder wy de Eetlust, Verteering en Uitdryving van de Spyzen begrypen, is *systematicq*, en hangt af van 't geheele lichaam, of liever van de gematigde en vrye beweging en gesteldheid van het bloed en 't zenuw-sap. Zo derhalven deeze beweging der vloeistoffen in eenige ziekte of door eene andere oorzaak ontruft, of al te schielyk of al te traag is, dan is de trek naar spys en deszelfs verteering terstond weg, waarom dezelve byna in geene innerlyke ziekte behoorlyk gesteld is.

*Apepsia.* §. CLXXXIII. 3.) DE *Verteerloosheid* wordt genaamd, wanneer de kooking en ontbinding der Spyzen geheel en al weggegaan is om de groote ongesteld- en raauwheid van het Maagsap, of uit gebrek eener matige warmte.

*Brady-pepsia.* §. CLXXXIV. 4.) DE *langsaame koking der Maag* is, wanneer de Maag half gekookte Spyzen looft, en komt ook voort van eene onbekwaame ontbinding der Spyzen.

*Dyspepsia.* §. CLXXXV. 5.) DE *moeilyke verteering der Spyzen* verschilt alleen in trap van de *Verteerloosheid*, zo 'er *raauwheeden* uit de kooking der Spyzen in de eerste wegen overblyven.

*Aanmerking.*

DE Raauwheeden zyn tweederley in foort, want zy zyn of *zuur*, of *salpeterachtig*: de eerste <sup>*Acida*</sup> ontdekt men door oprispingen, braaking, knaa- <sup>*vel nido-*</sup> <sup>*rofa.*</sup> ging en pyn van de Maag, als de afgang uit den aars gaat; en meestentyds, 't welk aanmerkelyk is, ziet de afgang 'er witachtig uit. De salpeterachtige worden ontdekt door stinkende oprisping, en inzonderheit door brand en *hette* omtrent de *Præcordia*. <sup>*Phlogi-*</sup> <sup>*sis.*</sup>

IX. H O O F D S T U K.

VAN HET GEDARMTE.

§. CLXXXVI. **D**E Slokdarm, Maag en het Gedarmte maaken te samen een aan één vervolg, langachtig, rond kanaal uit, van de keel tot aan den aars toe uitgestrekt, welk kanaal op verscheidene plaatsen naar de verschillende wydte, legging, maaksel en gebruik verscheiderley naamen aanneemt.

§. CLXXXVII. HET Gedarmte wordt verdeeld in het dunne en dikke, en van beyde zyn 'er drie foorten. Dunne Darmen worden de eerste genaamd om de dunheid der vliezen, en beginnen van den *Pylorus* en eindigen aan 't klapvlies van 't *Colon*. De overige, om de dikte der vliezen en de groote wydte, wierden by de Ouden *volle* of nu *dikke* genaamd. <sup>*Plena.*</sup>

§. CLXXXVIII. HET eerste Gedarmte wordt



*Duodenum.*

het *twaaalfvingerige* geheeten, om dat het mees-  
tentyds twaalf vingeren breed lang is; het be-  
gint van den *Pylorus*, en loopt eerst *perpendicu-*  
*laar*, vervolgens *horizontaal* van de rechter zyde  
van 't *abdomen* naar de linker nier. De gedaan-  
te van deezen darm is gelyk die der Maag, na-  
mentlyk gebogen, waarom men het ook zon-  
der te dwaalen een byvoegfel van de Maag zou  
kunnen noemen; het dient zo wel als de Maag  
tot de kooking of ontbinding der Spyzen, en  
tot verder bewerking van den Chyl, ten wel-  
ke einde het op den afstand van eenige ving-  
ren breed van den *Pylorus* de gal en het al-  
vleesch-sap ontfangt, 't welk door vershil-  
lende buizen, die echter maar ééne opening  
hebben, in dit Gedarmte gestort worden, en  
even als uit de hoogte in dit Gedarmte neder-  
daalen.

*Aanmerking.*

*Orificia.* IN de honden en andere dieren is het einde  
van 't *Duodenum* daar, alwaar de buis van 't *Pancreas*  
ingeplant wordt; want de *Ductus pancreaticus*  
en *cholodochus* hebben twee verschillende *openin-*  
*gen*, die zeer veel van elkanderen afstaan.

§. CLXXXIX. HET *Duodenum* is zeer sterk  
en dik, doch niet zeer wyd, hebbende van  
binnen zeer veel kliertjes.

*Aanmerking.*

AANMERKENSWAARDIG zyn in het *Duo-*  
*denum*

*duodenum* een oneindig getal *gersten-klieren*, welke *Glandulae miliares* duidelyk, na dat de eerste rok afgescheiden is, in een gekookten darm gezien worden: deeze heeft *Brunner* in zyn *Dissertatio Epistolica* het eerst ontdekt en naauwkeurig beschreeven. Deeze klieren storten in een groote menigte een vocht uit, van denzelven aart als het speeksel, tot ontbinding der Spyzen, welk vocht met het voedsel vermengd zynde, zeer veel tot deszelfs innerlyke ontbinding te weeg brengt.

§. CXC. DE ruige en klierachtige korst, welke *Crusta villosa* vry dik in het *Duodenum* is, hebben ook dit gebruik, dat zy den onderleggenden zenuwachtigen rok, welke van een zeer fyn gevoel is, beschermt zo wel voor de scherpe gal als voor de Spyzen, die al te zout zouden worden.

§. CXCI. HET *Duodenum* verschilt hierin van de andere Darmen, dat het niet vast is aan het *Mesenterium*, gelyk het *Jejunum* en *Ileum*. Vervolgens, dat het byzondere vaten heeft, zo dat het geen takken krygt van de *Arteria mesenterica superior* en de *Vena portarum*, maar van de *Cœliaca* en van een tak van de *Vena portarum*; ten derden, dat in geen Gedarmte byzondere vochten uitgestort worden, gelyk hier het *succus pancreaticus* & *biliifusus*; ten vierden, dat het geen *vasa lactea* heeft.

§. CXCII. HET legt in de rechter zyde onder de Lever, waaraan het zeer vast gehecht is, en daar het ook van moet afgescheiden



worden; daarna horizontaal een bocht gemaakt hebbende, gaat het naar de linker zyde.

*Jejunum.*

*Mesenterium.*

§. CXCI. HET tweede Gedarmte wordt het *nuchtere* genaamd, om dat het meestentyds ledig gevonden wordt. Dit begint omtrent de lenden-wervelbeenderen, namentlyk omtrent het middenpunt van 't *Darmscheil*, daarna loopt het naar boven in de linker zyde, en boven den navel heen. Het eindigt, daar de roode koleur der Darmen ophoudt en de bleeke begint, en daar de *valvulæ conniventes*, welke dit gedarmte in groote menigte heeft, niet meer gezien worden.

*Motus peristalticus.*

§. CXCI. DE *wormswyze beweging* heeft inzonderheit plaats in het *Jejunum*, door welkers behulp het chyl-sap in de openingen der melk-vaten gedreeven wordt, tot welk oogmerk inzonderheit de *valvulæ conniventes* dienen. Doch om dat door zyn sterker beweging het beslooten voedsel schielyker voortgaat, wordt het meestentyds ledig gevonden.

#### *Aanmerking.*

HET is zeer waarschyglyk, dat in dit Gedarmte, 't welk met zeer veel melk-vaten voorzien is, het grootste gedeelte van de vloeibare stoffen of den drank door de *venæ lymphaticæ & lacteæ* naar de *masa* van 't bloed gaat.

*Ileon.*

§. CXCV. DE derde is de *omgewonde darm*, de dunste en langste van alle, zynde alleen wel zo lang als alle de andere samengenomen: de  
klap-

klapvliezen en vouwen van binnen zyn hier zeer zeltzaam; ook zyn 'er minder bloedvaten, waarom het van eene bleeke koleur en zo rood niet is als het *Jejunum*. Het legt onder den navel, en bestaat de zyden van het *os Ileum*, waarom het ook den naam van *Ileum* gekreegen heeft; het vervult ook de geheele plaats van *Regio den onderbuik en liezen*; 't wordt zeer vast ver-<sup>*bypogastrica &*</sup> eenigd met het *mesenterium*, en hangt als 't wa-<sup>*inguinalis.*</sup> re los in den buik, zo dat het naar boven, naar beneden, en van den eenen kant naar den anderen bewoogen kan worden.

§. CXCVI. DIT heeft het zonderlings, dat het aanmerkelyke klier-vochten heeft, van *Peyerus* het eerst gevonden, en deeze zyn het meest omtrent deszelfs einde zichtbaar: zy hebben de grootte en gedaante van een geersten-<sup>*Semen*</sup> zaadje, doch zyn in eene groote menigte famen<sup>*mili.*</sup> vereenigd: uit dezelve wordt een groote hoeveelheid vocht, van aart als een ontbindend speeksel, en van natuur om het voedsel ter deeg te kleinzen, tot verdere bewerking van den Chyl uitgestort.

*Aanmerking.*

DEEZE kliervlechten, door eene scherpe purgeerende *stimulus* gedrukt, of ook door een bytend scherp galachtig zout in de *Diarrhœa* geprikkeld, storten eene groote menigte wey, die <sup>*Serum.*</sup> uit de Slag-aderen voortvloeit, uit, en laten het in 't hol van 't *abdomen* vallen.



§. CXCVII. VAN de dikke Darmen doet zich  
*Cæcum.* eerst het *blinde* op , 't welk aan 't rechter *Os Ileum* gelegen is, en begint daar het *Intestinum Ileum* eindigt, en eindigt in een byvoegfel of *processus vermiformis*. De lengte van dit gedarmte is niet veel grooter dan drie of vier vinger breed. In de *processus vermiformis* ziet men klieren, die iets afscheiden. Het is zeer wyd en met sterke rokken voorzien; het aanhangfel of de *processus* is kort, en heeft nergens eene uit-, maar wel eene ingang.

*Colon.* §. CXCVIII. HET andere is de *Kronkeldarm*, het welk begint, daar het *Intestinum Ileum* in het  
*Valvula.* klapvlies overgaat. Deeze darm heeft sterker vliezen en wyder vaten, op dat het door zyne geweldiger famentrekkende wormswyze beweging den drek naar boven zou kunnen dryven; het legt in de rechter zyde omtrent den  
*Crista.* rand van 't *Os Ilei*, waaraan het vast is.

§. CXCIX. HET *Colon* ryft op van de *Costa offis Ilei* naar de rechter nier, waarmede het ook met vliezen vereenigd is, vervolgens maakt het onder de Lever een bocht, en wordt daar  
*Folliculus felleus.* met het *Duodenum* en 't *Galblaasje* vastgehecht door een vlies, 't welk meestentyds van het doorwaasfemen van de gal zich geel vertoont. Vervolgens loopt het dwarsch onder den bodem van de Maag, waaraan het ook door middel van 't *Omentum* vast is: daarna gaat het naar de linker zyde, alwaar het door vliezen zich hecht met de milt: hier maakt het weder-

om een bocht , en gaat naar de linker nier , waaraan het zich door 't *Mesocolon* hecht: vervolgens klimt het weder op , en maakt een bocht in de linker zyde , de gedaante hebbende van de letter S , en dan gaat het vervolgens naar het bekken en 't *Os Sacrum*.

*Aanmerking.*

DE legging en vereeniging van het *Colon* is een Geneesmeester , die de Praktyk oefent , zeer noodzaakelyk , niet alleen op dat hy de aangedaane plaats van de ziekte , maar ook op dat hy de reden en oorsprong der toevallen in verscheidene ziekten kent. Want dit gedarmte lydt inzonderheit in de *affectus hypochondriacus & hystericus* , en deszelfs opblaazing en pyn in de linker zyde is eertyds verkeerdelyk de milt toegeschreeven ; en om dat het zeer vast aan de linker nier is , daar van daan komt het , dat een wind , hierin opgeslooten , gemakkelyk den steen , die somtyds in de linker nier zich ophoudt , prikkelt en beweegt , en dat ook weder de pyn , van de steen voortgekomen door dit gedarmte tot medelyden te verwekken , een zeer zwaar kolyk-pyn doet ontstaan. Het is ook aanmerkenswaardig , dat de bocht van dit gedarmte omtrent de holligheid van 't linker *Os Ilei* , welke de gedaante van de letter S uitmaakt , vast vereenigd zy met de laatste lendenwervelen , en met het *Os Sacrum* door middel

van



van het *Mefocolon*, waar door ook de *Vasa hæmorrhoidalia* gaan.

§. CC. HET *Colon* is onder de dikke Darmen het allerlangft en wydfte, inzonderheit aan deszelfs begin, waarvan dit de reden fchynt te zyn, om dat, vermits de fchuinze legging van het *Ileum*, de drek daar ftilstaat en dit gedarmte opzet, en het beflootene door middel van de fterke vliezen, die het heeft, en derzelver toetrekking, naar boven gedreeven wordt.

Liga-  
menta.

§. CCI. HET heeft drie *banden*, waar door het meerder kracht en vaftheid gegeven wordt: de flag-aderlyke en aderlyke takken, als ook de kleine zenuwtjes, eindigen in de *proceffus vermiformis*.

Valvula.

§. CCII. HET *klapvliesje*, dat aan dit *Intestinum* geplaatft is, is van *Baubin* ontdekt, en *Tulp* geeft 'er *Lib. III. cap. 21.* eene fraaie afbeelding van: en het is zo gemaakt, dat door het zelve de drek uit het *Colon* niet weder in 't *Ileon* komen kan. Deeze *Valvula* beftaat uit zeer fterke en klierachtige rokken.

§. CCIII. HET *Colon* heeft vervolgens zeer veele half-ronde *celletjes*, welke, den drek droog zynde, daar hunne gedaante aan geeven (*f*), en beletten, dat 'er minder drek opgegaard wordt, of op één hoop famenkomt.

§. CCIV. HET *Colon* heeft ook zeer veele klier-

(*f*) Het is eerder te gelooven, dat de drek zyn gedaante door het uitdrukken uit den aars aannemt.

kliertjes , waaruit een *lymphaticq* en flymerig vocht zweet; zy hebben de gedaante van een *lens*.

§. CCV. VEEL dikker rokken dan by het dunne gedarmte maaken het *Colon* uit. Want de binnenste rok is veel zenuwachtiger , en heeft zo veel kliertjes niet als 'er in 't *Fejunum* en 't *Duodenum* gezien worden , buiten alle twyfel om deeze reden , vermits in deeze eene groote menigte melk-vaten zyn , welkers openingen , den chyl ontfangende , in de *tunica villosa* eindigen. Want deeze is even als een zeef , waar door de chyl gezift wordt. Overal dan , daar melk-vaten zyn , wordt deeze rok gevonden , gelyk in het *Fejunum*. Doch in de grove Darmen ontbreekt deeze geheel , om dat daar noch melk-vaten , noch eene verdere bewerking van den chyl te wachten zyn.

§. CCVI. HET *Colon* wordt van de andere Darmen onderscheiden door de *ligamenten* en *celletjes* , welke *ligamenta* in den beginne drie zyn , vervolgens maar twee , zeer zenuwachtig , na 't doorsnyden van welke de binnenste klapvliesjes of celletjes verdwynen , ten klaaren blyke , dat de celletjes in het *Colon* gemaakt worden van de binnenste rokken , door de *ligamenta* by elkander getrokken.

§. CCVII. HET *Colon* ontfangt zyne zenuwen uit de *Intercostalis* en de *ramus mesentericus inferior* , niet van de middenste ; en om die reden is het zeer gevoelig en aan verscheidene  
kramp.



krampachtige famentrekkingen onderhevig, welke dikwyls zo zwaar zyn, dat zy het rechte gedarmte zeer vast doen toeknypen, zo dat 'er zelfs geen *clysteer* gemakkelyk kan ingespooten worden.

*Rectum.*

§. CCVIII. MEN noemt *rechte darm*, wanneer het *Colon* vernaauwd wordt; en omtrent het *Os Sacrum* in eenen rechten weg naar den aars gaat, welke het einde van deezen darm is, wiens rokken zeer dik en vleeschachtig zyn. Doch het heeft geen celletjes of klapvliesjes, gelyk 'er in 't *Colon* zyn, maar 'er zyn slechts plooijen, die den uitgang van den drek vertragen. Het wordt met zeer veel vet omringd, en heeft veele *glandulae lenticulares*, die een slym afscheiden, zeer bekwaam om den drek glibberig te maaken; veele en groote *Vasa hæmorrhoidalia* worden hier ook gevonden. Dit *Intestinum* wordt met sterke *ligamenten* aan 't *Os Sacrum*, *Coxæ* & *Pubis* vastgehecht, door middel van het *Peritonæum*; by de Mannen is het vast aan de wortel van de *Penis* en den hals van den blaas, doch by Vrouwen aan den *uterus* en deszelfs *vagina*; waarom 'er eene groote en onderlinge medegevoeligheid van deeze deelen is.

*Aanmerking.*

Om de medegevoelentheid van deeze deelen komt het, dat de genen, die eenen *tenesmus* hebben, te gelyk tot wateren aangezet worden,

den, en dat die eenen steen in de blaas hebben, geduuriglyk tot stoelgang aangezet worden. In de Vrouwen, als het kind naby zyne verlossing in het *Collum uteri* nederklimt, is altoos een aandrang tot wateren; ook kunnen scherpe *suppositoria* somtyds een *abortus* veroorzaken.

§. CCIX. DE *Aars* heeft drie Spieren, de *Anus*. eerste is de *Sphincter* of Sluitspier, die dezelve toetrekt, en uit kringachtige vezelen samengesteld, en door middel van kleine vezeltjes aan de huid en blaas vast is: de twee overige zyn de *Opligters*, welke van de *Ossa Coxarum* *Elevatores*, en derzelve *ligamenta* onderscheidentlyk voortkomen, en den aars, na den drek ontlast te hebben, te rug haalen; zo deeze al te slap zyn, gebeurt 'er eene uithanging van den aars.

§. CCX. HET *Intestinum rectum* heeft zyne zenuwen van de *Nervus ossis sacri*, als ook van den *Plexus mesentericus inferior*, waarom het van een zeer scherp gevoel is, het welk beweezen wordt door de zwaare pynen, die voortkomen van het gezwel van de *Venæ hæmorrhoidales*, en het gantsche lichaam aandoen.

§. CCXI. DE *Sphincter ani* wordt van buiten zeer vast vereenigd met de huid, en heeft eenige *bolletjes*, of ten minsten zes *Valvulae*, uit welke door kliertjes iets *weyachtigs* druipt om den *Serosum*, aars te bevochtigen, en de uitdryving van den drek te bevorderen.

Ziek-



*Ziektekundige Beschouwing.*

§. CCXII. MET verscheidene ongemakken worden de Darmen gekweld, en onder deeze is

*Inflam-*  
*matio.* 1.) TE rekenen de *Ontsteeking*, welke niet minder als die der Maag doodelyke toevallen veelyds veroorzaaken, en dezelve heeft het meest plaats in de *passio Iliaca*, in de *Convulsio Colica*, dikwyls ook in de *Dysfenteria*, en na men vergift heeft ingenomen, of wanneer de menschen om hals geraaken door sterke *purgantia* of *emetica*: welke ontsteeking, zo zy niet schielyk door bekwaame middelen verdreeven wordt, binnen kort in *spbacelus* en den dood eindigt.

§. CCXIII. 2.) DE Maag niet alleen, maar ook de Darmen ondergaan, inzonderheit van de winden, eene al te groote uitzetting, en ook eene al te naauwe samentrekking.

*Aanmerking.*

Zo de Maag en het Gedarmte door winden al te zeer uitgezet worden, zo dat deszelfs kracht, die men *systaltica* & *contractiva* noemt, weggaat, wordt de *anus* niet alleen geslooten, de drek opgehouden, maar 'er komen ook, om de spanning en rekking der *nervi intercostales* en van het *par vagum*, zeer groote ongerustheeden, benaauwdheden en koude in de uiterste deelen over het geheele lichaam, en op deeze wyze ontstaat 'er een zogenaamd *wind-kolyk*.

Want

*Colica*  
*flatulenta.*

Want zo de vliezen der darmen al te zeer gerimpeld en samengetrokken zyn, en te gelyk ook de ontlasting door den aars verhinderd is, en byaldien hier eene toetrekking van een *Spasmus* geschiedt, zal het bloed, in zynen vryen doortocht belet zynde, met geweld naar andere plaatsen gevoerd worden, alwaar het opgezameld zwaare ongemakken zal veroorzaaken.

§. CCXIV. 3.) DE doorbooring van de darmen is ten uitersten doodelyk, en deeze geschiedt meestentyds van wormen, of van *corrodeerende*, zuure, galachtige vochten: meestentyds wordt dit gevonden in het *Intestinum Ileum*, om dat dit het dunste van alle en de gewoonlyke verblyfplaats der wormen is.

§. CCXV. 4.) VAN den omgekeerden *motus peristalticus* komt een *Kronkel* in de darmen, en deeze wordt meestentyds in de *Iliaca passio* gezien, gelyk 'er voorbeelden van gevonden worden in de *Miscellan. Nat. Cur.* En in dit geval is 'er geen schielyker werkend middel als de levendige kwik in eene groote menichte met *oleosa* ingeeeven.

§. CCXVI. 5.) DE *Krimpelingen* der darmen komen of van de wegvreting der zenuwachtige rokken, of van derzelver al te groote uitgezetheid door winden; het eerste gebeurt meest in de *dysenteria*, het laatste in winden.

§. CCXVII. 6.) DE darmen zyn ook dikwyls onderworpen aan wreede pynen, welke voortkomen van het bedervend bloed, inzonderheit van de *Fluxus hæmorrhoidalis*, en dan



is de oorzaak tusfchen de vliezen en niet in het hol van de darmen te zoeken; dit is men gewoon te noemen een *ambeijen-kolyk*, en dikwyls ook een *colica spasmodica convulſiva*.

*Colica  
bæmar-  
rboïda-  
lis.  
Cholera.*

§. CCXVIII. 7.) HET Bort, het welk eene groote en pynlyke ontlaſting der vochten is door braaking en ſtoelgang, en niet buiten gevaar, zo wy het niet ten eerſten tegengaan, heeft zynen oorfprong van een galachtige ſterk bytende ſtoffe.

§. CCXIX. 8.) DE wonding der darmen is meefſtentyds doodelyk, als zy dwars geſchied is, inzonderheit in de dunne darmen, om dat 'er groote vaten gedilacereerd zyn: hier volgt ligt *gangrena* & *ſphacelus* op.

9.) DE verandering van legging der darmen, welke niet alleen gebeurt in eene *hernia ſcrotalis*, maar ook in eene *umbilicalis*, moet hier ook in aanmerking komen.

§. CCXX. 10.) D O O R eene al te ſterke toetrekking der rokken van het *Duodenum*, en daar door belette doortocht van de gal, waarom dezelve weder tot haaren oorfprong, dat is, tot de Lever, moet keeren, ontſtaat de *Geluw*; hieruit volgen gemeenlyk krimpingen en pynen in de darmen, en *Maag-pyn*.

*Îcterus.  
Cardial-  
gia.*

§. CCXXI. 11.) I N dezelve onthoudt zich ook dikwyls de Bron-wel der *intermitteerende* koortſen, alwaar niet alleen zuiverende zoutmiddelen nodig zyn, maar ook braakmiddelen, en zo de ſtof laager zit, de *Mercurius dulcis*.

§. CCXXII.

§. CCXXII. 12.) VEELTYDS komen 'er zeer heftige krimpings in de dunne darmen, vooral in 't *Jejunum* en *Ileum*, 't geen men weeten kan door de plaats van de pyn, welke omtrent de navel is.

§. CCXXIII. 13.) DE *Wind-zucht* is eene al *Tympa-* te sterke uitzetting der darmen door winden, *nitis.* zynde derzelver rokken naauwer en meer gespannen geworden.

§. CCXXIV. 14.) BYALDIEN de Spieren, *Levatores ani* geheeten, al te slap worden, 't welk dikwyls in kinderen, en in *dysenteria* gebeurt, zakt de aars uit, inzonderheit zo 'er eene *pooging* is om den drek te loozen: en de *Nisus.* zelve wordt niet zonder moeite weder ingebracht.

§. CCXXV. 15.) HET *Intestinum rectum* met zyn *Sphincter* wordt ook lam, inzonderheit in oude en stervende lieden, wanneer de drek hen tegen wil en dank afloopt. Indien dit in *morbi acuti* geschiedt, is de dood aanstaande; doch gebeurt het van ouderdom heeft men veel nut door 't inneemen van *nervina balsamica*.

§. CCXXVI. 16.) Ook komt 'er *jeukte* aan *Pruri-* de nabygelegene en uiterlyke deelen van den *tus.* aars, inzonderheit by *Scorbutici*, die *lues venerea* hebben, en by oude lieden, van een scherp brandend wey, 't geen door de kliertjes en holletjes doorzweet.

§. CCXXVII. 17.) EENE *Diarrhaea chylosa* komt van eene obstructie van de *tunica villosa*, welke het meest in 't *Jejunum* is, van eene



kwaade, flymachtige, kleevende ftoffe, welke door het verftoppen van de openingen der *vasa laftea*, den doorloop van den chyl belet; waardoor de raauwe en chylachtige vuiligheeden van het voedsel verzameld zynde door het prikkelen van de beweging der darmen buiten-natuurlyken afgang verwekken.

*Aanmerking.*

DEEZE aandoening gebeurt het allermeeft by kinderen, inzonderheit zo zy nog aan den borft zyn, om dat het bloed in de eerfte wegen *coäguleert*: de tekenen zyn, zwelling van 't *abdomen*, uitmagering van de bovenfte leden, eene geduurige dorft en witachtige afgang.

§. CCXXVIII. 18.) EENE *Diarrhæa* is de vermeerderde *Motus Peristalticus* der Darmen, met eene menigvuldige en fchielyke ontlasting der vuiligheeden, voortkomende van de zout-zwavelachtige, doch inzonderheit galachtige fcherpheid, die de rokken der ingewanden afknaagt.

*Aanmerking.*

DE *Diarrhæa* is meeftentyds *Epidemicq* in den zomer by zeer heet weer, wanneer de uitwaasfeming belet wordt door een tocht of koude lucht, inzonderheit by den nacht; zy is ook gewoon te grasfeeren in het begin van de herft door het eeten van fruiten en boomvruchten en eene belette doorwaasfeming: de reden hier-

hiervan is duidelyk te begrypen , omdat de zout-zwavelachtige vuiligheden van eenen zeer fynen aart, die anders door den omtrek van de huid gewoon zyn weg te waasfemen , zo zy in het lichaam blyven, door de Darm-klieren en Galbuizen naar de rokken der Darmen gevoerd worden.

§. CCXXIX. 19.) DE *Dysenteria* is een bloedige afgang, verzeld met zwaare snydingen in den buik; voortkomende van eene galachtige zeer bytende fcherpheid.

§. CCXXX. 20.) DE *Pasfio Iliaca* is eene uitwerping door den mond van dat geen, het welk door den aars ontlast moest worden, voortkomende van eenen omgekeerden *motus peristalticus* der dunne Darmen, van verfcheidene oorzaken af hangende.

#### *Aanmerking.*

DE *Pasfio Iliaca* kan te recht verdeeld worden in *Chronica* en *Acuta*; de eerfte zonder *inflammatie*, zonder zwaare pyn en koorts, hoedanig eene gemeenlyk gebeurt, zo 'er eene groote menigte darmen in het *Scrotum* gezakt is, en fomtyds vier of vyf weeken duurt zonder gevaar. De *Acuta* gaat verzeld met zeer fcherpe pyn, ftuiptrekking, ontfteeking; zo deeze in *sphacelus* overgaat, wordt zy doodelyk: en zy ontftaat, zo 'er flechts een klein ftukje van 't *Ileum* in het *Scrotum* gezakt is, of zo by vrouwen een gedeelte van den darmen in de



liezen neerzakt, en tusfchen de peezen der fpiereu van 't *abdomen*, alwaar de *ligamenta rotunda uteri* gelegen zyn, bekneld wordt.

§. CCXXXI. 21.) HIERTOE behoort ook de dus genaamde *morbus niger Hippocratis*, welke eene uitwerping is van zeer finkenden afgang, hebbende eene zwarte koleur, van het uitgeftortte bloed in 't *Ileum*, meeftentyds verzeld met eene braaking van zwarte ftof, ten laafte eene doodelyke uitkomst hebbende.

*Colica  
rhoïda-  
lis.*

§. CCXXXII. 22.) EEN *Ambeijen-kolyk* is een geweldige pyn, die in de linker zyde begint, en zich door 't gantsch *abdomen* uitftrekt, onder de plaats, daar de Maag legt, met eene zeer groote benaauwdheid, ongerustheid en eene zeer zwaare hardlyvigheid om het bloed, dat tusfchen de zenuwachtige rokken van het *Intestinum Colon* zich ophoudt, en dezelve zeer opfpant.

#### *Aanmerking.*

DIT ongemak wordt *Colica hæmorrhoidalis* geheeten, om dat het zeer gemeen is by die geen, welke met vloeijingen van ambeijen gekweld zyn: wanneer deeze belet zyn, vloeit het bloed met geweld naar de rokken van 't *Colon*, welke al te zeer door 't zelve opgezet zynde een zeer fcherpe pyn veroorzaaken, welke het geheele lichaam tot medegevoelendheid verwekt. Zy wordt het best geneezen door aderlaating, door het aanzetten van bloedzuigers, en door

ge-

gematigde, verdryvende en pynstillende middelen, als ook die waterachtig, en verkoelend zyn.

§. CCXXXIII. 23.) EENE al te groote opblaazing der darmen, of een *wind-kolyk* is eene *Colica* pynlyke opzetting der darmen van de winden, *flatulenta*. die zich hier ophouden, om de slapheid of vertraagde *motus Peristalticus*; zy gaat verzeld met zwelking van den buik en hardlyvigheid.

*Aanmerking.*

SOMTYDS gebeuren 'er zeer geweldige opblaazingen in de Darmen, wanneer eene sterker toetrekking of *spasmus* eenig gedeelte of van 't *Colon* of van 't *Ileum* bevat, waardoor de winden niet kunnen los worden.

§. CCXXXIV. 24.) DE opblaazing van het *Intestinum Colon* in de rechter zyde, alwaar het omtrent de *Costa osfis Ilei* begint, is geene onzeldzaame aandoening: de Lyders klaagen over pyn in de rechter zyde, alwaar het beginsel van 't *Colon* gelegen is. Hiertoe behooren ook de windachtige pynen omtrent het rechter en linker *hypochondrium*, welke ontstaan in de *flexuræ Coli*, als daar winden zyn, of eene drekachtige, scherpe, bytende stof.

*Aanmerking.*

DEEZE pynlyke opblaazingen omtrent de *hypochondria*, welke door het gevoel en 't gezicht gekend worden, zyn zeer gemeenzaam by



die; welke een dusgenaamde *morbus spasticus hypochondriacus* hebben, schoon deeze ongemakken dikwyls verkeerdelyk toegeschreven worden aan de daar zich onthoudende ingewanden, de Lever en Milt namelyk; daar zy eerder hunnen oorsprong hebben van de winden in de *flexuræ Coli*, welke op deeze plaatsen duidelyk zichtbaar zyn; waarom ook wind-verdryvende klisteeeren op 't oogenblik verligting aan dit ongemak verschaffen, dewyl zy de winden verdryven, en dezelve eenen uittocht geeven.

*Tormina.* §. CCXXXV. 25.) DE *Snydingen* in den buik zyn niet anders dan zeer zwaare kramptrekken-  
de famentrekkingen, verzeld met zeer wreedde pyn, welke toevallen gepaard gaan of met een buikloop of zeer groote hardlyvigheid.

*Aanmerking.*

DEEZE hebben het meest plaats, zo vergiften, of eene scherpe, brandende stoffe de *tunicæ intestinorum* beschadigen, en afknaagen, waarom van ingenomen vergift, by voorb. *Arsenicum*, van een zeer sterk purgeermiddel, zwaare snydingen in den buik ontstaan, waarop naderhand volgt een menigvuldige afgang.

*Metal-  
lurgi.*

§. CCXXXVI. 26.) DE *Colica convulsiva* by de *Metaal-bewerkeren* behoort hier ook toe; welke niets anders is dan een zeer geweldige pynlyke *Spasmus intestinalis* met eene zeer hardnekkige  
hard-

hardlyvigheid, meestentyds voortkomende van de loodachtige rooken en dampen, door den mond opgedronken.

*Aanmerking.*

OVER deeze zaak kan men leezen onze verhandeling de *Metallurgia morbifica*; als ook *Wedelii Disfertatio de Colica Saturnina*. *Stockhausen du fumo lithargyrii noxio*.

§. CCXXXVII. 27.) ONDER de clasfe der ziekten, welke van den verkeerden *motus intestinorum peristalticus* voortkomen, moet men ook brengen de gebreken omtrent den afgang, waarby men met recht mag tellen de al te traage en hardnekkige stoelgang, en de harde en verstopte, en die ten eenemaal ophoudt.

*Aanmerking.*

EEN verstopte stoelgang wordt geheeten, welke geschiedt door de menigte stof, door de menigvuldige en verharde *fæces*, zo zy in de dikke darmen zyn, en daar tot klonters geworden niet kunnen voortgaan noch door den aars eenen uitgang krygen. Een vertraagde stoelgang wordt genaamd, welke van eene traager beweeging der darmen voortspruit, van gebrek van gal en eene overheersching van zuure famentrekkende vochten, hoedanig iets gemeenlyk by *Hypochondriaci* gebeurt: een *alvus constricta* komt niet uit een gebrek der stoffe



voort, maar eerder van krampachtige famentrekking, zo deeze de ingewanden benadeelt, waarom byna by alle zwaare pynen, die van een *spasmus* ontstaan, een *alvus constricta* gewoon is zig te voegen; gelyk wy zien in de *Colica Convulsiva*, in de steen, hoofd-tand-hartpyn, en die van ambeijen voortkomt, in de *epilepsia* der kinderen. Waaruit nu duidelyk de reden blykt, waarom de *Salia volatilia oleosa*, de *nervina*, de *absorbentia*, de *nitrosa*, de *antispasmodica*, gelyk de *Castorina*, en de *anodyna* dikwyls de bekwaamste en beste middelen zyn tegen een in 't geheel beletten stoelgang.

§. CCXXXVIII. 28.) By de ziekten der Darmen, welke van eenen verkeerden of veranderden *motus peristalticus* voortkomen, behoort ook die geheele *morbus spasticus hypochondriacus*, als welke nergens in 't lichaam zyne zit- of verblyfplaats heeft, zo wel ten opzichte der oorzaak, als met betrekking op de werking en uitwerkselen, dan in de maag en 't groote kanaal der ingewanden, en voornamelyk in den verkeerden of veranderden *motus* van deeze zenuwachtige deelen.

*Aanmerking.*

DEEZE aandoening, zo hinderlyk door de winden en kramptrekkingen, openbaart zich het meest door beslootene oprispingen en winden, door beslooten lyf, snydingen in den buik, be-

benaauwdheeden, opblaazingen der *hypochondria*, somtyds ook door loslyvigheid, welke nu en dan wel eens al te sterk is; derhalven wordt de zitplaats van dit kwaad te recht in de maag en het gedarmte gesteld; en het krygt zynen oorsprong niet, gelyk het gevoelen van sommige is, uit de verstopte of opgepropte ingewanden des onderbuiks. Want de *Cachectici Scorbutici, Hydropici* zyn meestentyds van dit kwaad bevryd, alwaar echter om de kwaade gesteldheid der ingewanden in den buik de voortgang van het bloed door het *Mesenterium* en het Gedarmte, zeer moeilyk is; en het ontstaat ook niet uit de ophouding der vloeijing van de ambeijen, daar het echter van de kwaade gesteldheid dezer vloeijing zeer veel verzwaard wordt, dewyl eerder die *dispositie* tot ambeijen een uitwerksel van de *morbus hypochondriacus* is; om dat van wegen de *spasmi & flatus intestinorum* de voortgang en omloop van het bloed door de ingewanden van den buik in de darmen met de *vasa meseraica* belet wordt; waarvan daan, de aderen door de *spasmi* samengedrukt zynde, het bloed met geweld door de slagaderen naar de uiteindens van 't *Intestinum rectum* gevoerd zynde, de openingen der vaten gemakkelyk ontslooten worden: doch al het geen, 't welk de natuurlyke toon, kracht en beweeging van maag en darmen te niet doet en omkeert, is de bron en oorzaak van dit allerzwaarst kwaad; van deezen aart zyn koud drinken na eenen grooten gramschap, schrik,

of



of ook na een geweldiger lichaams-beweeging ingenomen, het welk wy ook gezien hebben te gebeuren, na het gebruiken van krachtige purgeer- of braak-middelen. Alle groote bloedstortingen, of ook koortsen, als mede het ophouden en beletten van buik-loopen en *dysenteria* door *adstringeerende* middelen, al te groote verkoelingen van den buik, een misbruik van zuur, en wel het meest eene al te groote droefheid, benaauwdheid, of al te groote vermoeijng van geest na den eeten, verkeerde studeeringen en geduurig nachtbraaken, welke alle inzonderheit in lichaamen van natuure zwak, of door ziekte afgemat, zeer gemakkelyk deeze aandoening kunnen te weeg brengen.

§. CCXXXIX. 29.) DE afknaagingen van de rokken der darmen, niet zeldzaam van scherpe, zuure vochten voortkomende, laten langduurige buikloopen, benaauwdheeden, en pynen na zich, en zyn moeilyk te geneezen.

*Lumbri-  
ci.*

§. CCXL. 30.) DE *Wormen*, die in het kanaal der Darmen zich ophouden, veroorzaken door hunne knaaging, fomtyds ook door doorbooring van de darmen zelfs, zeer zwaare toevallen, zo dat behalven de pynen en krimpelingen in de darmen en opspanningen van den buik, daar ook uit voortkomen stuiptrekkingen, *Epilepsiæ*, *atrophia*, *febres lentæ*.

*Aanmerking.*

VERSCHIEDENE soorten van wormen zyn  
'er,

'er, want eenige zyn lang, plat-rond, welke fomtyds samengedraaid zyn; of zy zyn ook breed, gelyk een dun vlies, en worden *tæniæ* genaamd; of zy gelyken ook naar een soort van komkommer-zaad; deeze worden in het *Intestinum rectum*, *Ascarides* geheeten. De allergevaarlykste zyn, die in de maag huishouden, welke fomtyds twee hoofden hebben; verscheidene waarneemingen getuigen, dat de darmen door de wormen doorboord geweest zyn; zie de *Miscell. Nat. Curios. Dec. I. Ann. III. Obs. 141. Dec. II. Ann. I. Obs. 120.*

§. CCXLI. 31.) HET *Intestinum rectum* is ook aan veele gebreken onderhevig; zo een scherp vocht uit de *glandulæ lenticulares* druypt, of eene zuure wegvreetende stof uit den afgang hier vertoeft, wordt het toegekneepen, of ondergaat een *spasmus*, en dan komt 'er eene geduurige geneidheid tot stoelgang, welke den naam van *tenesmus* draagt.

*Aanmerking.*

DIT ongemak is zeer gemeen by die geen, welke aan eene *diarrhæa* of *dysenteria* laboreeren, of die een groote menigte zuur in de eerste wegen opzamelen, gelyk de *hypochondriaci*, oude lieden, en die veel zuure wynen drinken. By de *tenesmus* wordt dikwyls gevoegd een trek om geduurig zyn water te loozen met brandigheid en al droppelende, om dat aan de *Sphincter Vesicæ* het *intestinum rectum* zeer naauw vereenigd is, waar-



waarom in tegendeel ook de *stranguriæ*, inzonderheit die van een steen in de blaas voortkomen, gewoonlyk met een *tenesmus* verzeld gaan.

§. CCXLII. 32.) HET *Intestinum rectum* is ook aan *exulceratien* onderhevig, welke het meest gezien worden in de *dysenteria*, gelyk de opening der lyken aantoon: als deeze *exulceratien* 'er zyn, is 'er een geduurige *tenesmus*, en 'er wordt eene scherpe, ulcereuse stoffe, hoewel in kleine meenigte, ontlast.

§. CCXLIII. 33.) EEN *geinflammeerde* pyn en gezwel kwelt zeer dikwyls deezen darm, inzonderheit zo het bloed, dat door de aderen van den aars pleeg ontlast te worden, hier stil staat; deeze aandoening is men gewoon te noemen *hæmorrhoides cæcæ*.

#### Aanmerking.

DEEZE pyn is fomtyds zeer heftig, zo het bloed der ambeijen geen uittocht vindt, om dat de uitgezette vaten den zenuwachtigen rok sterk spannen en drukken. Waarom het beste hulpmiddel is, zo in den beginne bloed-zuigers aangelegd worden, of zo de verdryving ondernomen wordt door uiterlyke *verzachtende* *Paregorica.* *dingen* en *resolventia*, of zo het bloed reets ge-coäguleerd is, met omzigtigheid eene opening gemaakt wordt, op dat het daar zynde geronnen bloed zou kunnen worden uitgeperst.

§. CCXLIV. 34.) UIT een innerlyken *tumor hæmorrhoidalis* gebeurt dikwyls eene *inflam-*  
ma-

*matie*, waarop, zo wy dezelve niet fchielyk te hulp komen, fomtyds *sphacelus* volgt, doch die anders in *absces* overgaat, welke, indien zy niet naar behooren behandeld wordt, in een *ulcus fistulosum* uitloopt.

§. CCXLV. 35.) SOMTYDS wordt het *Intestinum rectum* zeer geweldig toegetrokken in de *affectus spasmodici*, zo dat het geen vocht noch wind, ja zelfs geen *clysteeren* doorlaat, gelyk gebeurt by die geen, welke een *malum hypochondriacum*, een *colica hæmorrhoidalis*, of *convulsiën* hebben.

### *Heelkundige Beschouwing.*

§. CCXLVI. ALLE de wonden der Darmen, inzonderheit die van het *Duodenum* als ook van 't *Jejunum*, zyn volstrekt doodelyk, om dat hier menigvuldig veel vaten zyn, en een sneller *motus peristalticus*, waardoor het ingenomen voedsel fchielyker weggaat en langfaamerhand eene stinkende bederving aan de nabygelegene deelen geeven: vervolgens gaan ook alle de wonden der darmen gemakkelyk in *inflammatie* en *sphacelus* over, en brengen dus den Lyder zeer fchielyk om hals.

§. CCXLVII. DE zwaare kwetsuuren van het *Intestinum Ileum* moeten van gelyken voor volstrekt doodelyk gehouden worden, ten zy zy klein zyn, naar buiten loopen, en aan het gezicht zich opdoen, zo dat men 'er toegroeijende heelmiddelen aan kan gebruiken; want  
dus



dus wordt aan de stof, die in dezelve zich onthoudt, eenen uitgang gegeven, op dat zy niet in het hol van den buik valle.

§. CCXLVIII. DE Wonden van het *Intestinum Colon* hebben zo veel gevaars noch doodelykheids niet in zich als die der dunne darmen, eensdeels om dat zy sterker en dikker rokken hebben, welke gemakkelyker kunnen samen-groeijen, anderdeels om dat zy ligter vereenigen en met de bekleedfelen van 't lichaam vast-groeijen, eene opening overlaatende, waardoor de drek loopt; vervolgens ook om dat dit gedarmte, inzonderheit onder de maag en in de rechter zyde schielyker buiten het *abdomen* schiet en uitpuilt, waarom niet alle de wonden van 't *Colon* doodelyk te achten zyn.

§. CCXLIX. V E R V O L G E N S gebeurt 'er eene *hernia umbilicalis* van het uitschieten van het *Intestinum Ileum*, zo het onder de navel is: is het 'er boven, dan is het van 't *Colon*, ontstaan uit eene al te groote verslapping van 't *Peritonæum* en de spieren van 't *abdomen*, alwaar eene spoedige inbrenging en inhouding met kleefpleisters, plaats vindt.

*Aanmerking.*

EENE *Hernia umbilicalis* valt meest voor in den kindschen tyd, en ontstaat ook uit een wind-kolyk: zy gebeurt ook by vrouwen, die een te sterk geweld oefenen om de vrucht uit te dryven.

§. CCL.

§. CCL. EEN *Lies-breuk* is eene uitpuiling *Hernia* van een gedeelte van 't *Ileum* omtrent de Lie-<sup>*inguina-*</sup>  
zen, alwaar de *vasa spermatica* eene byzondere <sup>*lis.*</sup>  
opening hebben in de *tendines musculorum abdominis*; doch als het *Peritonæum* al te veel uitgerekt wordt, dan is men gewoon het een Darm-breuk of *Enterocoele* te noemen.

§. CCLI. EENIGE gevallen zyn 'er, alwaar door het gat van de navel buiten den buik een stuk van 't *Colon* geschooten is in de vrucht, en om dat dit gezwel onvoorzigtig van den Heelmeester voor een vleeschig *Uitwas* gehou- *Sarcoma*,  
den wierdt, is het roekeloos en doodelyk weg gesneeden, gelyk men leezen kan in *Miscell. Nat. Curios. Dec. III. Ann. III. Obs. 183.*

§. CCLII. WAT het *Intestinum Rectum* belangt, het zelve is ook aan verscheidene aandoeningen onderhevig, welke eene Heelkundige beschouwing verdienen; en wel vooreerst de uitzakking van den aars, welke gebeurt door dat de *musculi levatores*, welke omtrent het begin van 't *Peritonæum* vereenigd zyn met het *Os Sacrum et pubis*, al te zeer door den toevloed der vochten verslapt zyn, inzonderheit zo 'er aandrang van *tenesmus* is, en eene groote pooging tot stoelgang; dit ongemak is de kinderen zeer gemeen.

§. CCLIII. NU zyn 'er nog overig die gezwollen van eene verscheide figuur en grootte, welke den aars van buiten beslaan, waarom



*Ficus.* ■ zy den naam draagen van *Vyg-werten*, *Mariscæ*, of *Condylomata*, en gewoon zyn voort te komen van het *succus nutritius* naar buiten gedreeven, van het bloed in de uiterste vaten stil staande, vooral in spongieuze lichaamen, en alwaar uiterlyke ambeijen om verscheidene oorzaken in hunne gewoonlyke vloeijing belet zyn; zy beletten zeer de nederzakking van den afgang en het gemakkelyk zitten op de billen.

§. CCLIV. DIT foort van gezwellen wordt het best geneezen door snyden, zo men het hoofd maar gemakkelyk binden kan; de bloedstorting kan gestuit worden door het *Caput mortuum vitrioli*. Die meerder over deeze zaak begeert te weten gaa by *Hier: Fabricius ab Aquapendente de Operation. Chirurg. pag. 327.*

§. CCLV. Hiertoe behooren ook de pynlyke barsten of *Rhachades*, welke van het doorzweeten eener scherpe wey, met een *miasma virulentum* besmet, gewoon is te ontspruiten, en niet behoorlyk kunnen geneezen worden dan door *linimenta mercurialia et sulphurata*, met een *anodynum* vermengd.

§. CCLVI. HIERTOEF behoort ook de gestoten aars in kinderen die dus gebooren zyn. Zo 'er eenig bewys van een gat te zien is, kan 'er gemakkelyk eene kruis-incisie gedaan, en een loode canul ingebracht worden, om de weder samengroeijing te beletten.

§. CCLVII. JEUKTE is dikwyls aan de  
uiter-

uiterfte en nabygelegene deelen van den aars, een ongemak, dat zeer lastig is, en niet zelden by oude lieden en *Scorbutici* voorvalt, van wegen een fcherpe invreetende wey, die uit de *Lacunæ glandulosæ* omtrent de *Sphincter* van den aars wordt uitgestort.

§. CCLVIII. NIET zeltzaam komen 'er zweeren by den aars, en ontstaan meestentijds uit het opzwellen der *vasa hæmorrhoidalia cæca*, of als de ambeijen, inzonderheit de uiterlyke, ophouden te vloeijen, en wel voornamelyk zo zy van Heelmeesters onvoorzigtig met *caustica et acria* behandeld worden.

*Aanmerking.*

DEEZE *ulcera* verschillen van de innerlyke *geexulcereerde* ambeijen, welke van veel meer belang zyn, om dat zy gemakkelyk in fistels overgaan, dewyl de ulcerachtige stof door de vliezen van het *Intestinum rectum* kruipt, en ook naar de buiten deelen gaat, op dat 'er omtrent den aars openingen en gaten komen, alwaar voorzigtig gedaane *incisies* met daar toe bekwaame werktuigen de beste hulp verschaffen.

§. CCLIX. EENE ontlasting van afgang tegen wil en dank komt of van een *paralysis* der vleeschachtige spier-vezelen, waaruit de *Sphincter* samengesteld is, in verlamde of door ouderdom afgeleefde menschen, of die na



aan hun sterfuur zyn, of van eene gantsche affnyding van den *Sphincter*.

## X. HOOFDSTUK.

### VAN HET DARMSCHEIL, DE MELKVATEN EN BORST-BUIS.

§. CCLX. **H**ET Darmscheil wordt in 't Latyn *Mesenterium* genaamd even als iets midden tusfchen de darmen: het is niet alleen de band, waaraan alle Darmen vastgehouden worden; maar ook de steun voor allerhande foort van vaten, slagaderlyke, aderlyke, die melk voeren, ja zelfs voor de zenuwen, welke alle in groote menigte en takwordingen naar de Darmen loopen.

§. CCLXI. HET *Mesenterium* bestaat uit een dubbel vlies, het onderste en 't bovenste, waar by sommige een derde, *cellulosa vel mucosa* voegen, waarin het vet begreepen is, waar onder, als ook onder het vet, de zenuwen en vaten van allerley foort gelegen zyn, op dat, zo de mensch misfchien sprong of viel, deeze geen gevaar van barften liepen.

§. CCLXII. HET *Mesenterium* wordt in het eigenlyk dus genaamde of *Mesereum* en in *Mesecolon* verdeeld: aan het eerste zyn vast de dunne darmen, en by gevolg het *Jejunum* en *Ileon*: doch het *Mesocolon* bindt de dikke darmen, inzonderheit het *Colon*, waarvandaan  
het

het ook den naam van *Mesocolon* gekreegen heeft; het is dikachtig, heeft eene ronde gedaante, en is aan het midden van den rug vast; doch om zyne lange gedaante is het *Mesocolon* aan de rechter en linker zyde door middel van het *Peritonæum*, inzonderheit omtrent de *Ossa Ilei*, vereenigd. Het *Mesenterium* is vryer, zo dat het van de eene zyde naar de andere kan vallen, en dus is 't met het *Mesocolon* niet gelegen, nadien dit vaster aan 't *Peritonæum* vereenigd is.

§. CCLXIII. HET *Mesenterium* of *Meseræum* krygt gemeenlyk zynen oorsprong van den *Penszak*; doch zo wy de zaak naauwkeuriger *Perito-* gade slaan, ontspruiten de vliezen van 't *Me-* *næum.* *senterium* eerder van de banden, die de lenden-wervelen samenbinden, en samengesteld worden uit de uiterlyke vliezen der Slag-adren en Aderen; het is vast vereenigd met de eerste, tweede en derde wervel der lendenen. Het Centrum nu van 't *Mesenterium*, waarin de *vasa arteriosa*, de *vena meseraica superior* en de *ramus dexter venæ Portæ*, als ook een groote zenuw-tak loopen, is vast vereenigd met de eerste wervel der lendenen.

§. CCLXIV. HET *Mesocolon* wordt gemeenlyk gesteld een affspruitsel van 't *Mesenterium* te zyn, doch gelyk de zaak zelve getuigt, is het *mesocolon*, dat in de linker en rechter zyde gelegen is, niet dan eene voortbrenging van 't *Omentum*.



*Aanmerking.*

VAN deeze waarheid heeft *Laurentius Lib. VI. Anatom. Cap. XV.* al gewag gemaakt, wanneer hy zegt, dat het *Epiploön* by het *Intestinum Colon* de verrichting van 't *Mesenterium* doet, en onder het nut van 't *Epiploön* is dit het voornaamste, dat het 't ampt van 't *Mesenterium* by 't *Colon* waarneemt, derhalven is 'er geen ander *Mesocolon*; als ook *Vesalius Lib. de Fabrica corporis humani: Mesenterium*, 't welk het *Colon* aan de rechter zyde van 't *Ileum* en ter linker zyde met het linker vereenigd, krygt een zelve begin met het vlies van 't *Omentum*, het welk het *Colon* langs den bodem van de Maag uitgestrekt, vast houdt.

§. CCLXV. TUSSEHEN de vliezen van het *Mesenterium* is eene groote en talryke menigte klieren in 't vet verborgen, welke van geen gelyke grootte zyn, en niet trotsgewyze gelegen, maar hebben eenen circulachtigen omloop, zo dat de geheele omtrek van het *Mesenterium* volgens een ronde lyn met klieren, die onder het getal der *Conglobatæ* zyn, doorzaaid is.

*Aanmerking.*

DE werking van de *glandulæ conglobatæ*, die tusfchen de vliezen van 't *Mesenterium* leggen, is om de melk- en water-vaten te ondersteunen, en als 't ware haar tot fchut-fluizen of

Ver-

Verlaaten te dienen, en op dat zy door de *Cataract* kracht en samentrekking der zenuwachtige<sup>te</sup> vezelen de beweging van den chyl en *lympha* naar de verzamelplaats van den chyl zouden voortzetten.

§. CCLXVI. DE Slag-aderlyke vaten, die naar het *Mesenterium* en *Mesocolon* gaan, zyn tweederley soort, namelyk een groote Slag-ader wordt verdeeld in *bovenste tak*, die naar *Ramus* het *Mesenterium* gaat, en *arteria meseraïca su-superior* genaamd wordt, en in *onderste tak*, *Ramus* welke onder het begin van de *arteria semina-inferior* ontspruit, en naar 't *Mesocolon* gaat, inzonderheit naar dat gedeelte, 't welk in de linker zyde legt.

*Aanmerking.*

MEN moet aanmerken, dat de tak uit de *arteria meseraïca superior* naar 't beginsel van 't *Colon* gaat, en naar dat gedeelte van dezen darm, het welk in de rechter zyde gelegen is: doch de *arteria meseraïca inferior* verspreidt zich door het *Colon*, dat in de rechter zyde legt, en ook door het *Intestinum rectum*.

§. CCLXVII. HET *Mesenterium* en *Mesocolon* ontleenen hunne aderen van de *Vena Portæ*, en haar rechter tak heeft zelfs den eigensten loop als de *arteria meseraïca superior*, doch aan het linker gedeelte van het *Colon* en aan het *Intestinum rectum* loopt de *Vena* uit



de *ramus splenicus* of *sinister Venæ Portæ* volgens de lengte van het *Mesocolon* naar dit gedarmte, welke tak op het *Intestinum rectum* den naam van *hæmorrhoidalis* draagt, om dat zyne ontslootene openingen bloed storten, en deeze aandoening *hæmorrhoides internæ* geheeten worden.

*Aanmerking.*

AANMERKELYK is het, dat de bloedvoerende vaten in het *Mesenterium*, met betrekking op het gedarmte, waar naar toe zy de sappen voeren en hen voedsel verschaffen, zeer wyd en ruim zyn.

§. CCLXVIII. MET de bloedvaten in het *Mesenterium* gaan aanzienlyke zenuw-vlechten en bondeltjes, uit menigvuldige zenuwachtige vezeltjes samengesteld, verzeld, welke hunnen oorsprong krygen uit de *nervus intercostalis* van beide zyden, gedeeltelyk uit het *par vagum* en de takjes van de *nervi lumbales*. Doch de zenuw-takjes zyn gewoon over de bloedvaten te loopen, en zich in hunne rokken te hechten, zo dat zy de vaten als binden en omringen, buiten twyfel met dat oogmerk, dat de voortgang van het overtollig en slymig bloed door deeze vaten gemakkelijker voortgezet wordt.

*Aanmerking.*

DRIE zenuw-vlechten van het *Mesenterium*  
stelt

stelt *Vieussens* in zyne *Neurologia* vast, een bovenste, welke naar het *centrum* van 't *mesenterium* loopt, een middenste, die naar 't *Mesocolon* gaat, en een onderste, welke naar 't *Pelvis*, *Intestinum rectum* en de Pis-blaas leidt.

§. CCLXIX. DE zenuwen geeven aan de vliezen der darmen een zeer scherp gevoel, het welk beweezen wordt door de zwaare snydingen en kramptrekkingen, welke het Gedarmte gewoon zyn aan te doen, en van het Gedarmte naar andere zenuwachtige deelen overgebracht worden: zy verschaffen ze ook beweeging, toon en kracht, op dat zy des te gemakkelyker hunnen *motus peristalticus* zouden kunnen volbrengen.

*Aanmerking.*

NIET tegenstaande het Gedarmte een scherp en schielyk gevoel heeft, zo is nogthans het *Mesenterium* byna van alle gevoel beroofd, en van deeze zaak is geene andere reden te geeven, als dat de vliezen van het *Mesenterium* alleen eenvoudig zyn, en niet samengesteld uit vleesch- en zenuw-vezelen, gelyk de rokken van het Gedarmte; dewyl de zenuw- en vleesch-vliezen alleen het wezentlyke en waare gevoel-tuig zyn.

§. CCLXX. Door de verdubbeling van het *Mesenterium* worden ook gevoerd de dus genaamde melkvaten, van *Asellius* in 't jaar



1622 ontdekt, welke uit de darmen hunnen oorsprong ontleenen, en oneindig in getal zyn, meer of min klein, voornamelyk voortkomende uit het *Jejunum* en *Ileum*, en dan eens van de overige vaten afgezonderd, dan weer met dezelve in eene rechte of schuinsche lyn voortlopende, gaan zy over de bloedvaten heen, welke dikwyls met malkander door *anastomoses* vereenigd zyn; zy loopen vooreerst naar de menigvuldige klieren van het *Mesenterium*, welke omtrent de takwordingen der vaten voornamelyk gelegen zyn, en melkvaten van den eersten soort genoemd worden; doch naderhant gaan zy van deeze klieren voort naar het *Receptaculum chyli*, dertig jaaren daarna van *Pecquet* uitgevonden, wanneer door den *Ductus Thoracicus*, door denzelven ook ontdekt, de *chylus* zelfs en *lympha* opklimmen, en in de linker *subclavia* met het bloed vermengd worden, in welke *subclavia* by de inplanting van den *Ductus* openingjes zyn, met halfmaansche klapvliezen versterkt.

§. CCLXXI. HET chyl-sap wordt inzonderheit door de *Tunica villosa*, die in het *Jejunum* en *Ileum* zyn, even als door een vloei-papier gelekt, alwaar een overgroot getal worteltjes van melkvaten dezelve opneemt, en door de melkvaten van den eersten rang, naderhant door de klieren, ten laatsten door de melk-

vaten van het tweede foort naar de verzamel-plaats van den chyl voeren.

§. CCLXXII. DE beweeging en voortgang van den chyl wordt bevorderd door de *Motus Peristalticus* der darmen, welke inzonderheit in 't *Jejunum* plaats heeft; zy wordt ook bevorderd door de daarin zynde *valvulae conniventes*; waaromtrent de mondjes der melkvaten ingeplant worden; ook wordt zy voortgezet door de nimmer ophoudende werking der spieren van het *Abdomen*, als ook door de klapvliesjes, welke in de *vasa lymphatica* zelfs in eene groote menigte zyn, en ook door de klieren van het *Mesenterium*, welke door de veerkracht der Zenuw-vezelen de chyl in de melkvaten van den tweeden rang dryven.

§. CCLXXIII. DE Melkvaten vertoonen zich zeer wel voor het oog, wanneer men drie of vier uren na den eeten een hond opsnijdt, en het *Sternum* weggenomen zynde de linker Long naar de rechter zyde omflaat, en in het midden van de rugge-graat de *Ductus Thoracicus*, tusfchen de *Vena azygos* en de *arteria magna* gelegen, toebindt: dan ontdekken zich aanstonds de melkvaten van allerlei foort en vertoonen zich met chyl opgevuld: en de *Ductus thoracicus* laat zich onder den band te gelyk met de *cisterna* met chyl gevuld zien.

§. CCLXXIV. DE *Ductus thoracicus* is gemak-



maklyk in eenen levendigen hond, die te voren ſterk gegeten heeft, te vinden, doch een weinig moeilyker in een dood menſch: echter zyn 'er verſcheidene handgreepen uitgevonden om dezelve gemakkelyk en bekwaam te vinden.

*Aanmerking.*

*Vasa  
lymphatica.*

OVER eenen nieuwen handgreep om den *Ductus thoracicus* te vinden heeft *Saltzmanus* te *Neurenburg* eene verhandeling geſchreeven, welke daarin beſtaat, dat men een *watervat* van eene aanmerkelyke grootte zoekt, op de *Vena emulgens* van de linker nier gelegen zynde, te voren doorgeſneeden hebbende de ſtam van de groote ſlagader, daar dezelve by deeze deelen gelegen is, en deeze afgeſcheiden zynde, op dat men des te beter dit vat vinden en 'er een blaas-pyp in plaatsen kan: dan blaazende ontdekt zich de *cisterna* of 't *receptaculum chyli* buiten de *tendines proceſſuum Diaphragmatis* gelegen, en aan de eerſte lendenwervel vaſt zynde, te gelyk met den geheelen *ductus thoracicus*, welke met een gekoleurd vocht, of liever met waſch kan opgevuld worden, zo men maar eerſt de linker *vena ſubclavia* en de *jugularis* van dezelve zyde met eenen draad toegebonden heeft. Doch men kan hem op de volgende wyze veel gemakkeliker vinden: namelyk het *Diaphragma* wordt van de ribben der rechter zyde los gemaakt

en

en in het *Abdomen* de nieren, met het *Diaphragma* en *Peritonæum* vast zynde, opgeligt en naar de linker zyde omgeslaagen; vervolgens wordt tusfchen de *processus tendinosi Diaphragmatis* omtrent de eerste en tweede lenden-wervelen naar de rechter zyde een kleine *incisie* gedaan, het vet dus los gemaakt hebbende, ziet men de *cisterna chyli*, waarin, met een pyp geblaazen, zich ontdekt de buis tusfchen de *arteria magna* en de *vena azygos* onder het *Pleura* gelegen.

§. CCLXXV. IN den mensch klimt deeze buis eerst op tot de ribben van de rechter zyde, doch wanneer hy op de vierde borst-wervel gekomen is, kromt hy op de hoogte van het hart zich naar de linker zyde, gaat dus in twee en meerder takken, en doorboort de *glandula thymi* en loopt dus voort tot de *subclavia sinistra*, wiens opening, nu eens één, dan twee zynde, met een half-*Valvula* maansch klapvliesje versterkt is, op dat 'er geen *Semilunaris* bloed in den borst-buis kome.

§. CCLXXVI. DE beweeging en voortgang van den *chylus* en *lympa* naar boven door den *ductus thoracicus* wordt niet weinig voortgezet door de boven opleggende *arteria magna*, en van de geduurige beweeging der *Processus diaphragmatis* onder het ademhaalen. Ook beletten de klapvliesjes, waarmede deeze buis voorzien en afgedeeld is, dat het boven-  
ste



ste gedeelte van de *lymphæ* minder tegenstand biedt aan het onderst, dat 'er ruglings opvolgt.

*Aanmerking.*

DAT de *Ductus thoracicus* met halfmaanfche klapvliesjes voorzien is, kan men zeer wel met een proef aantoonen, waardoor men boven het hart in den openen buis door een spuit een vocht of gesmolten wasch spuit, wanneer men bevinden zal, dat een klein gedeelte van de kanaal slechts daardoor zal opgevuld worden, deszelfs onderst gedeelte ledig blyvende; daar in tegendeel de inspuiting van vocht, zo dezelve aan het onderste gedeelte van de buis te werk gesteld wordt, schielyk den geheelen buis opvult.

*Ziektekundige Beschouwing.*

§. CCLXXVII. GEEN deel van 't gantsche lichaam is zo zeer bloot gesteld voor opproppingen, verstoppingen der vaten, opblazingen, stil-staan der vochten, gezwellen, en *scirrheuse* verhardingen, als het *Mesenterium*, om dat in geen gedeelte van het lichaam de vrye omloop van het bloed zo zwaar en menigvuldig kan ontroerd worden.

§. CCLXXVIII. VERSCHEIDENE *morbi chronici*, gelyk *Cachexia*, *Febres lentæ*, *hecticæ*,

*intermittentes chronicæ, Ascites, Tabes, Affectus hypochondriaci*, snydingen in den buik, bloedrige afgangen hebben zeer dikwyls hunne vaste plaats en zetel in het *Mesenterium*.

*Aanmerking.*

DIT is reets lang aangemerkt van *Fernelius in Patholog. Lib. II. Cap. 7*, want ik bekenne, zegt hy, en verzekere, dat ik de oorzaaken van *Cholera, Melancholia, Mania, Diarrhæa, Dysenteria, Cachexia, Atropbia, Febres lentæ, errantes*, en eindelyk van verborgene kwaalen meestentyds in het *Mesenterium* ben gewaar geworden.

§. CCLXXIX. DE oorzaaken der ziekten, die haare vaste plaats in het *Mesenterium* hebben, zyn meestentyds *abscesfen, exulceratien, klier-gezwellen, Scirrhi, Steatomata, overkrop-* <sup>*Infarc-*</sup>  
*pingen* en uitzettingen der *vasa meseraica* door<sup>*tus.*</sup> al te veel bloed, en hunne openingen in de Darmen, eindelyk *Inflammationes et Sphacelationes Mesenterii*.

*Aanmerking.*

UIT de *abscesfen* en *exulceratien* van het *Mesenterium* krygen de *Febres lentæ et hecticæ* haaren oorsprong, uit de *scirrheuse* en verharde klieren komen *Atrophiaë*; van groote klieren gezwel-



*Hæmor-  
rhagiæ  
intesti-  
nales.*

*Febris  
semiter-  
tiana seu  
hemitri-  
tea.*

zwellen harde gezwollen in den buik onder dezelve gedaante als een *Hydrops* of *Tympanites*; uit de overkropping der *vasa meseraica* door een al te dik bloed *spasmi hypochondriaci* en langduurige snydingen in den buik; uit het opengaan of ontsluiten van deeze vaten in het *Intestinum Ileum* de zo genaamde *Fluxus hepatici* of liever de bloedstortingen der darmen: van de etter door de rokken der darmen zypende pynen, en stinkende, zwarte, en bloedrige etter-buikloopen; van de *Inflammatie* van 't *Mesenterium* en meestentyds ook van 't Gedarmte de halve derdendaagsche Koorts, niet buiten gevaar.

§. CCLXXX. DE ziekten van het *Mesenterium* krygen meestentyds haaren oorsprong van den beletten omloop van 't bloed in dit deel; deszelfs vryen doorgang hier verhinderd zynde worden de vaten overkropt, de vochten en het bloed staan stil, 'er komen *stases* en *extravasationes*, welke de *causæ continentes et proximæ morborum meseraicorum* zyn.

§. CCLXXXI. VAN niets komen de *morbi meseraici* meerder voort dan van de opstoppingen der maandstonden en vloeijingen der ambeijen, en door een ontydig gebruik van *adstringentia* en *opiata* om de *paraxysmi* der koortsen te beletten, en sterke bloedstortingen en buikloopen weg te neemen.

*Aan-*

*Aanmerking.*

HET is niet wonderlyk, dat na het opstoppen of ophouden van die *excretiones criticae*, welke het overtollig-en fchaadelyk bloed tot een heilzaam inzicht loozen, een groote menigte van het zelve vergaarderd en opgezameld wordt in de *vasa meseraica*; waardoor niet alleen hun toon verflapt en los gemaakt wordt, maar dikwyls ook *stagnationes*, *stases* en *extravasationes* komen, inzonderheit zo de Lever en Milt niet gezond en geheel, maar verftopt en famengetrokken zyn. Daarenboven wordt hier veel toegebracht door een bloedryk-geftel, door een zittend leven, gebrek aan drank, het inzwelgen van geestryke vochten en het misbruik van koud drinken in een verhit lichaam; als mede door een roekeloos gebruiken van *commoventia*, *emmenagoga*, *purgantia* vel *sudorifera* in bloedryke lichaamen, en die een gebrek aan loozing van bloed hebben.

§. CCLXXXII. SOMTYDS legt'er een *Apostema* tuffchen de vliezen van het *Mesenterium* verborgen, wanneer 'er zich eene fleepende koorts met hoest en uitmagering van het lichaam ontdekt; doch fomtyds breekt het ook de vliezen der darmen door, en dan is 'er pyn in 't *abdomen* en eene ftinkende en etterachtige ftof wordt met de drek geloosd.

*Aanmerking.*

VAN Hildanus Cent. I. Obs. 70 wordt een  
ONTLEEDK. Verz. I. Verv. XI. L. ge-



geval verhaald, dat een meisje geduurende zes weken een koortsje met hoest en uitteering hadt, waarin men het *Mesenterium* vondt vol van eene etterachtige *Massa*, en rondom groote gezwollen, waarvan sommige grooter dan een Hoender-ey, andere dan een noot of castanje waren. *Raygerus in Miscellan. Nat. Curios. Dec. III. An. 3. Obs. 139.* heeft in iemand, die aan eene sleepende koorts, hardheid van buik en uitmagering van het lichaam gestorven was, *ulcera* in het *Mesenterium* gevonden. *Dodonæus Obs. XXXIII. p. 169.* beschryft een *absces* van het *Mesenterium* met een afgang van eené zwarte stinkende stof, welke geduurige snydingen veroorzaakt heeft.

§. CCLXXXIII. Zo het *Abdomen* begint te zwellen, hard en dik wordt, doch de bovenste ledenmaaten invallen, dor en sappeloos worden, de pols menigvuldig en zwak is, dan is het *Mesenterium* meestentyds vol van klierachtige gezwollen van eene aanmerkelyke grootte.

*Aanmerking.*

DERGELYKE waarneemingen kan men leezen in *Miscellan. Nat. Curios. Dec. I. ann. IV. Obs. 166*, alwaar na den dood de klieren van het *Mesenterium* verontaard gevonden zyn tot *fungeuse* gezwollen van eene verwonderlyke grootte, zo dat men het voor eene *Hydrops* aanzag. Zie ook by *Hoechstetterus Dec. VI. cas. 6*, alwaar eene vrouw na de verlossing een groot ge-

gezwel en pyn aan den buik kreeg, en een groot gezwel in het *Mesenterium* gevonden wierdt. Het zelve wordt ook bevestigd van *Tulp. Obs. Lib. II. Cap. 32*, welke verhaalt, dat de *Steatoma* van een klier in het *Mesenterium* LXXX. ~~te~~ woog; het *Abdomen* was in den tyd van twee jaaren tot een groot gezwel uitgewasschen, zo dat men vast geloofde, dat zy water tusschen het vel in hadt: zie denzelven Schryver cap. 33. en 34. De kinderen, die aan een *Atrophis* sterven, en een hard en gespannen *Abdomen* hebben, heeft men altoos by de ontleding bevonden, dat het *Mesenterium* verharde klieren van eene aanmerkelyke grootte hadt.

§. CCLXXXIV. Door het opvullen en uitzetten der *vasa meseraica* met een overtollig en slymig bloed komen *Pathemata Spasmodica* & *Hypochondriaca*.

*Aanmerking.*

Dus heeft *Guarinonius Consult. V.* by eenen *Hypochondriacus* de *venæ Mesenterii* zodanig verwyd gevonden, dat zy veel naar darmen geleecken. *Mercatus Tom III. lib. I. cap. 17.* heeft in *Hypochondriaci* de *vasa meseraica* met spatten en *Varicosa*, cancreus gevonden. Zie meerder by *Martin. Martini lib. de morbis mesenterii abstrusioribus*, als ook in de *Miscell. Natur. Curios. Dec. I. an I. Obs. 32.*

§. CCLXXXV. WANNEER in het *Mesocolon* een zweer is, of ook als de *venæ*, te veel door



bloed, inzonderheit dat door ambeijen anders gewoon is weg te vloeijen, opgespannen zynde, opengaan, dan komt 'er dikwyls eene groote menigte geklonterd bloed voor den dag.

*Aanmerking.*

DIT hebben wy dikwyls waargenomen, dat na een *Febris continua*, die lang geduurd hadt, eenige ponden zwart bloed door stoelgang ontlast zyn, het welk ligtelyk te lyden was voor lichaamen, die te voren aan eenen ambeijen-vloed waren onderhevig geweest.

§. CCLXXXVI. WANNEER door een overtollig bloed de al te zeer opgezette *Venæ mesentericae* in het *Intestinum ileum* opengaan, dan wordt 'er dikwyls bloed met den afgang, en ook zonder denzelven geloosd, en dit noemt men eenen *Fluxus hepaticus*.

*Aanmerking.*

DERGELYKE waarneeming kan men leezen in de *Observat. Knaunigii*, in welk geval dikwyls zwart bloed te voorschyn komt.

§ CCLXXXVII. Ook is de *ruige korst*, die de zeef van al den chyl en 't vocht, dat naar 't bloed gaat, is, niet vry van ziekten en ongemakken, ten zy het of al te naauw, of samengetrokken of verstopt wordt.

*Crusta villosa.*

*Aanmerking.*

DE worteltjes der melkvaten worden ingeplant

plant in den zenuwachtigen rok der dunne darmen en in de dus genaamde *crusta villosa*, en worden niet van hunnen toon, en beweeging van famentrekking en verwyding beroofd, gelijk dit gemeen is aan al andere kanaalen, welke vocht in het menschlyk lichaam voeren.

§. CCLXXXVIII. Zo deeze vaatjes al te naauw, samengetrokken of verftopt zyn, komt 'er niet alleen minder vocht in het bloed, maar het dikke kaasachtige blyft over, en daar van daan komen opspanningen, geduurige stoelgang, een bezwaarende en spannende gewaarwording in het *Abdomen*. Door eene naauwkeurige waarneeming is het bekend, dat even voor het na bed gaan een *purgans* in te neemen onder de gedaante van pillen, minder pisloozing veroorzaakt, als gewoonlyk 's nachts geschiedt, ja dat na eene *purgatie* den tweeden of derden dag de afgang minder wordt.

§. CCLXXXIX. In hooge jaaren, alwaar langsaamerhant een grooter naauwte van al de vaten komt, gebeurt dit zelfde ook in de *vasa lactea*, waarom zy veel hardlyviger zyn dan jonge lieden.

§. CCXC. Zo deeze *Tunica villosa* geobstrueerd raakt, het welk van *adstringeerende* middelen komt, onder welker getal ook de *Cortex chinæ* is, wanneer zy verkeerdelyk gebruikt wordt om de *paroxysmi febriun*, of de *Fluxus alvi* weg te neemen, komen 'er *diarrhœa chylosæ* met opzwellling van het *Abdomen* en opgeblaazen-



heid, als ook met eene zeer benaauwde opspanning in de Maag, welke ziekte zeer gemeen is by zuigende kinderen, wanneer de mondjes der vaten door al te zeer gestremd, dik, slymig melk verstoppt en omwonden worden.

§. CCXCI. Eene al te groote verflapping van deezen rok, gelyk in de *diarrhæa* en buikloop gebeurt, wordt veroorzaakt van een al te groote afscheiding van een scherp wey door de klieren; en om dat na het ophouden der *spasmi* en *constrictiones* der aangedaane deelen meestentys eene groote verflapping volgt, zo blykt hieruit de reden, waarom op den dag, die tusschen de intermitteerende koortsen vry is, de dikker drekachtige gal-vuiligheeden naar de *massa* van 't bloed gaan en stof verschaffen om eenen nieuwen *paroxysmus* te beginnen.

§. CCXCII. Wanneer de openingen der melkvaatjes of verstoppt of samengetrokken zyn, dan is de doorgang der mineraale wateren, de Thee en andere *infusien* langzaamer, en dit veroorzaakt gemeenlyk veele ongemakken; doch om dat deeze openingen niet beter en gemakkelijker kunnen gezuiverd en open gemaakt worden dan door een geduurig en menigvuldig drinken, daarom bemerken wy ook, dat de doorgang der vloeistoffen door de menigte en 't gewicht der waters, zo men in hun gebruik voortgaat, zeer gemaklyk bevorderd wordt.

# XI. HOOFDSTUK.

## VAN DE ALVLEESCH-KLIER.

§. CCXCIII. **D**e *Pancreas* is de grootste klier van het menschlyk lichaam, hebbende de lengte van zes of zeven vingerbreed, en de breedte omtrent van drie, zynde een duim dik: zy legt dwars onder het achterste gedeelte van de maag, en is vast vereenigd met het *Duodenum*, als ook met de milt, en het *Omentum*.

### Aanmerking.

ALVLEESCH-KLIER, of *Pancreas* is zy genaamd, om dat zy een soort van eenvoudig vleesch gelykt; en *Vesalius* heeft voor deezen geloofd dat deeze klier tot het *Omentum* behoorde, waarom hy schryft *Libr. V. cap. 4. de fabr. corp. human*, het onderste vlies van het *omentum*, leggende onder het achterst gedeelte van de Maag, krygt daar een klierachtig zeer groot lichaam, het welk *Pancreas* geheeten wordt. Want zo wy de vasthechtingen en legging van deeze klier nauwkeuriger beschouwen, ontdekken wy, dat het een dik vlies van 't *omentum* is, dat vry sterk is en onder het achterst gedeelte van de Maag legt, waaraan de *Pancreas* naderhand zeer vast vereenigd is.

§. CCXCIV. EER het maakfel en zamenstel der klieren behoorlyk ontdekt was, en toen men den *Ductus thoracicus* en de *venæ lacteae* nog niet gevonden hadt, geloofden de Ouden, dat het  
nut



nut van de *Pancreas* niets anders was, dan dat hy eene zachte ondersteuning aan de maag gaf, en ook een steun was voor de *vasa splenica*, welke naar de Milt, 't *Omentum* en de Maag gaan.

*Aanmerking.*

Na dat in den jaare 1622 van *Afellius* de *vasa lactea* gevonden waren, heeft men een ander gebruik aan de *Pancreas* toegekend, namelijk dat hy diende tot verdunning en zuivering van den chyl, waardoor hy schielyker in het ingewand van de lever tot bloed zou veranderen

§. CCXCV. In den jaare 1644 is het eerst van *Mauritius Hofman* in een Haan de *Ductus Pancreaticus* gevonden, en naderhant van *Virsjunge* in een mensch aangetoond en openbaar gemaakt: deeze buis of *ductus* loopt door het midden van de *Pancreas* en heeft de dikte van een dunne Stroo-halm, en wordt omtrent het *Duodenum* wyder, en naar de milt dunner gevonden, en stort het vocht met eene byzondere en wyde opening, die het van buiten in den darm een klap-vlies heeft, in het *Duodenum*.

*Aanmerking.*

DEEZEN buis gevonden hebbende, geloofde men, dat hy een zout onnut wey voerde, dat van den chyl afgescheiden was, waarom zy de *Pancreas* het allernuttigst oordeelde tot zuivering van den chyl; doch *Moebius* heeft het eerst een ander gebruik aangetoond, namelijk, dat dit vocht de gisting en ontbinding der spyzen bevorderde.

Zo

Zo dit vocht namelyk een zuiver excrement en van geen gebruik was, zou de al-voorzienende Natuur dat kanaal of die zak niet geplaatst hebben aan de bovenste darmen, alwaar de bewerking van den chyl in de maag moet volbragt worden, maar eerder aan de onderste, alwaar de verzamelplaats der kwaade en onnutte vochten is, welke uitgeworpen moeten worden.

§. CCXCVI. De *Pancreas* is eene *glandula conglomerata*, welke bestaat uit eenen grooten hoop kleine kliertjes, waarvan elk heeft zyn byzonder slagaderlyk en aderlyk bloed-vat, zenuw, uitwerp-buis, en vezelachtige vliezen. Alle deeze zeer kleine en menigvuldige uitwerp-buisjes, overal verstrooid, loopen eindelyk in een grooter kanaal uit, waarin zy het afgescheide vocht storten, gelyk wy zien in de *glandulae salivales*, *sublinguales*, *mammariae* en *parotides*.

Aanmerking.

VIEUSSENS heeft in zyn *novum Systema vasorum* met eene fraaije proefneeming het maakfel en samenstel van de *Pancreas* getoond, dat het eene *glandula conglomerata* zy. Namelyk hy nam een geheele *Pancreas*, versch uit een menschlyk lichaam genomen, en hong dezelve eenige weeken aan een spyker, waarna hy dezelve dus gedroogd verdeelde in zeer veele, ja byna ontallyke doorschynende vliesjes, in



ieder van welke hy met het Microscoop bloedvaten zag, uitwerp- en waterbuizen en takjes van zenuwen, zodat alle klieren niets dan opwindingen en oprollingen zyn van vliezen, waardoor de kleinste vaten van allerhande soort verspreid zyn.

§. CCXCVII. DE *Pancreas* krygt zyne slagaderlyke vaten van den *ramus splenicus* of *cœliaca sinistra*; doch de aderlyke van den linker tak van de *Vena Portæ*, die ook *Splenicus* genaamd wordt, welke twee grooter vaten dwars over de bovenste oppervlakte van de *Pancreas* loopen, en in eenen rechten weg naar de milt gaan; doch een meenigte takken aan de *Pancreas* zelfs afgeeven. Het rechter en wydste gedeelte van de *Pancreas*, het welk vaster vereenigd met het *Duodenum* is, krygt ook een slagaderlyk takje van de *cœliaca dextra*: de zenuwen geeven ook takjes aan deeze klier, welke hunnen oorsprong van de *intercostalis* en het *par vagum* krygen.

§. CCXCVIII. HET gebruik van de *Pancreas* schynt geen ander te zyn, als dat van andere *glandulæ conglomeratæ*, het welk in de afscheiding van een vocht bestaat. Namelyk zy scheiden het allerfynste gedeelte van het bloed, het welk zeer veel overeenkomst schynt te hebben met het zap, dat door de *glandulæ salivales*, *parotides* en *sublinguales* afgescheiden wordt. Ook is het nut en de kracht van dit vocht niet anders, dan dat van 't speekfel, het welk een vocht

van

van eene gistende kracht is, veel toebrengende om eene verdere ontbinding der spyzen en bereiding van den chyl te bevorderen.

*Aanmerking.*

VOORHEEN meenden *Sylvius de le Boe* en zyne volgers, dat dit vocht een zuur was, en met de alcalische gal in het *duodenum* vereenigde, en deszelfs scherpheid verftompte, en zeer veel toebragt tot eene verdere volmaking en bewerking van den chyl. Deeze zelve Schryver heeft uit de tegen-natuurlyke gesteldheid zo wel van de gal als het Alvleesch-klier vocht, de bron en oorzaken van verscheidene ziekten, inzonderheit *Chronici* afgeleid; doch de ondervinding, en wel meest de smaak zelfs werpt dit gevoelen om ver; want 'er wordt nooit eene zuure smaak in dit ingewand of in zyn vocht ontdekt, en het Sap naauwkeurig verzameld zynde, heeft nooit met een alkalisch vocht vermengd geëffervesceerd, en is voor de tong byna smaakeloos, waarom het het zelfde tot eene meerdere ontbinding der spyzen in de darmen schynt te verrichten, als het speeksel, dat in groote menigte in den mond vloeit en met de spyzen vermengd wordt.

§. CCXCIX. HET is aanmerkens-waardig, dat in den mensch, doch niet in andere dieren, de *ductus choledochus* en *pancreaticus* samen vereenigen, en met eene gemeene opening in het



*duodenum* open zyn, zo namelyk, dat deeze vochten van boven en dus als uit den hoogen op den bodem van de buiging van het *duodenum* neerstorten, en de onderleggende *masa* van den chyl met dezelve vermengd wordt.

*Aanmerking.*

IN de dieren is meestentyd ter afstand van eenige vingeren breed van den *ductus cholédochus* de opening van den *ductus pancreaticus* gelegen; doch in den mensch wordt de gal, eer zy in het gedarmte komt, door het smaakelooze en speekfel-vocht van deeze klier verdund en bereid gemaakt, buiten twyfel om die reden, omdat 'er eene groote menigte en heete scherpe gal wordt afgescheiden by den mensch, welke zo veele geestryke, scherpe en heete dingen gebruikt, het welk in de dieren niet gebeurt, welke eenvoudig en gematigd voedsel, inzonderheit uit het Plantenryk, en schoonwater tot hunnen drank gebruiken. Dit gevoelen is opgehelderd geworden van *Brunner*, in zyn Tractaat *de Pancreate*, welke waargenomen heeft, dat de *Pancreas* uit dieren weggesneden zynde, gelyk als in honden, dezelve door menigvuldige braakingen overvallen geweest zyn, en *Panarolus* schryft in zyne zogenaaude *Observationes Pentecostes*; dat een man met menigvuldige en byna dagelyksche braakingen overvallen is geweest, en dat men na zyn dood de *Pancreas* scirrheus en even als steenachtig gevonden heeft.

§. CCC. ALLE die gebreken, welke allerhande foorten van klieren gemeen zyn, hebben ook plaats by de *Pancreas*, en onder deeze zyn inzonderheit de gezwollen van zeer veel grootte, de verhardingen of scirrheuswordingen, de *apostemata* en de exulceratien.

*Aanmerking.*

DE ongemakken, waaraan de klieren onderhevig zyn, moeten inzonderheit afgeleid worden van de verstopping der kleinste buisjes, zo wel die bloed voeren, als ter afscheiding dienen, uit welker opstapeling het geheele maakfel der klieren samengesteld is. Want wat kan gemaklyker verstoopt worden dan een zeer fyn en zeer naauw kanaal? Uit de verstopping en oppropping der vaatjes ontstaat vooreerst een gezwel, naderhant een hardheid of Scirrhus, die zeer schielyk in een kankerachtige zweer uit zynen aart verbasterd.

§. CCCI. Als de *Pancreas* zeer gezwollen is geworden, of ook scirrheus of bedorven, dan ontstaan 'er voornamelyk *morbi chronici*, gelyk zyn *cachexia*, *atrophia*, een spannende pyn in de rug en lendenen, *phthisis*, *melancholia*, *affectus hypochondriacus*.

*Aanmerking.*

DERGELYKE gevallen, alwaar de *Pancreas* van een verwonderbaarlyke grootte ge-



weest is, en de Lyder met zeer zwaare pynen in de Nieren gekweld was, kan men leezen by *Blancard in Anatom. Practic.* en by *Riolanus Libr. II. Cap. 16.*, die dezelve in eene *melancholie* verschriklyk gezwollen gevonden heeft; als ook in de *Miscell. Natur. Curios. Dec. II. anno VI. obs. 91.* alwaar *Zwingerus* de *pancreas* zeer groot by eenen *Maniacus* gevonden heeft. *Schelhammer* getuigt ook, dat hy in het lyk van een kind, zes jaaren oud, aan eene *atrophia* gestorven, de geheele *pancreas* scirrheus gevonden heeft. Zie vervolgens de *Misc. Nat. Cur. Dec. I. anno II. obs. 88. Dec. II. anno II. obs. 79.*, alwaar by een meisje van twee jaaren, aan een langsaame *atrophia* gestorven, de *pancreas* insgelyks verhard gevonden is geweest. *Schenck* heeft in het lyk van iemand aan eene *phthisis* gestorven, de *pancreas* scirrheus gezien, waarvan men leezen kan *Obs. 117. Dec. III. M. N. C. it. Dec. III. ann. VII. obs. 146. anni III. obs. 288.* Aanmerklyk is het, dat *Tileman*, volgens getuigenis van de *M. N. C. Dec. II. ann. V. obs. 138.*, in een man, aan een *anasarca* gestorven, de *Pancreas* ter lengte van een vierde van een el en twee vingeren breed en zeer hard gevonden heeft, doch de Lever in alles gezond. Op deeze plaats vult de Schryver meerder dergelyke waarneemingen over deeze zaak in.

§. CCCII. VERSCHEIDE *Pathemata hypochondriaca & hysterica* en andere, doch inzonder-

derheit *melancholica* ontspruiten uit een geobstrueerde en bedorven *Pancreas*.

*Aanmerking.*

DIT hebben wy door het ontleeden van eenige lyken dus bevonden, alwaar de *hypochondriaci* aan eene *Cachexis* gestorven waren, en de *Pancreas* scirrheus bevonden wierdt, het welk ik by een voornaam man van deeze Stad gezien heb. In de ontleeding eener vrouw, met *convulsiones*, *epilepsia* en *passio hysterica* gekweld, is na den dood de *Pancreas* kwaalyk gesteld bevonden. Een dergelyk geval verhaalt *Harvæus Obs.* 59. en 91. en *Riolanus in Anthro-pologia* getuigt, dat de *Pancreas* tot eene zeer aanmerklyke grootte opgezwollen was by *Augustus Thuanus*, die eenen *affectus hypochondriacus* gehad en daaraan gestorven was, by wien hy ook scirrheus was gevonden.

CCCIII. GELYK de *Scirrhi* van klieren langzaamerhant en door verloop van tyd in kankreuse en voortkruipende zweeren overgaan, dus getuigen de ontleedkundige Waarneemingen ook, dat dit zelve ongemak aan de *Pancreas* gebeuren kan. Daaruit ontstaan doodelyke toevallen, *lipothymia*, *hectica febres* & *atrophia*.

*Aanmerking.*

DE waarneemingen, hierover verzameld,  
kan



kan men zien in onze *Disfertatio de Pancreatis morbis*.

CCCIV. WANNEER het grooter en wyder gedeelte van de *Pancreas*, het welk vast aan het *Duodenum* zit, hard en scirrheus wordt, en het zelve ongemak insgelyks mededeelt aan het *Duodenum* en het rechter *Orificium ventriculi*, dan gebeuren 'er menigvuldige braakingen van het ingenomen voedzel, zodat 'er eene *Atrophia* en sleepende koorts volgt, waarvan *Riverius* eene waarneeming in zyn praktyk inlascht.

CCCV. DE *Pancreas* geobftrueerd en verhard zynde, houdt deszelfs werking op in het kleinzen en volmaaken van den chyl, en in de fcherpheid van de gal te verdunnen, waarom het niet te verwonderen is, dat dusdanige menschen zeer onderhevig zyn aan menigvuldige stoelgangen, braakingen, als ook *affectus chronici*, inzonderheit aan *Phthisis* en *Cachexia*, omdat de raauwe en niet welgemengde chyl veel toebrengt tot de sluiting en verftopping der allerkleinste vaatjes.

## XII. H O O F D S T U K.

### VAN DE MILT.

CCCVI. **D**E Milt is een bloedryk ingewand, het welk gelegen is Lien. in het *hypochondrium sinistrum* onder het *Diaphragma*, waaraan het even, ten minsten met vliesachtige vezels, vastgehecht is, doch vaster wordt het vereenigd met het *Peritonæum* en de *costæ spuria*: het is ook vereenigd met het bekleedfel van de linker nier, als ook aanden Maag door de *vasa brevia*; met de *Pancreas* is het vast door de *vasa Splenica*, en is dus gelegen, dat het bolle gedeelte naar de ribben en het *Diaphragma* gekeerd is, doch het holle naar de linker zyde van de Maag legt. Aan deeze deelen hangt het als 't ware los. De milt heeft by den mensch eene langwerpige ovaalachtige gedaante, zynde zes duim lang en omtrent drie breed, en één dik: hy weegt ten naasten by tien of elf oncen. Het vlies, waarmede hy in den mensch omwonden wordt, is een en enkel, zeer dun, doch by de dieren is het sterker, en de gedaante van de Milt komt by hen ook anders voor, vertoonende namelyk een tong.

#### *Aanmerking.*

DE Milt heeft in de dieren ook eene andere legging, namelyk hy is meerder naar vo-  
ONTLEEDK. *Verz. I. Verv. XIII.* H ren,



ren, in den mensch meer naar achteren; hy legt onder het achterst gedeelte van de Maag en 't *Diaphragma*, waarom ook een gezwel onder de valsche ribben in de linker zyde by *Hypochondriaci* verkeerdlyk voor een gezwel van de Milt gehouden wordt, omdat hy op die plaats niet legt, maar meerder naar de rug zich uitstrekt.

CCCVII. HET is aanmerklyk, dat by jong gebooren kinderen in betrekking op de overige ingewanden de milt veel grooter is, welke ongevoelig en langzaamerhant door verloop van jaaren afneemt.

*Aanmerking.*

DE reden van dit verschytsel schynt voornamelyk deeze te weezen, dat 'er in de vrucht een weinig moeilyker doorgang van bloed door 't vaatachtig ingewand van de milt is, omdat de inademing 'er ontbreekt, door wien de milt anders geduurig bewoogen en gedrukt wordt naar boven en naar onderen, als leggende zeer dicht onder het *Diaphragma*: om die reden is de bloeds-omloop door dit ingewand veel gemaklyker en vaardiger in kinderen buiten de Baarmoeder zynde.

CCCVIII. DE koleur van de milt verschilt ook; by sommige namelyk is zy paers, by andere van eene lood koleur, by eenige bleekrood of ook zwart purper-achtig, te weeten naar maate de gesteldheid, natuur en koleur van

Van 't bloed verscheiden is, en naar maate ook de temperamenten en ouderdommen verschillen.

CCCIX. EENE vry aanmerkelyke Slag-ader komt 'er uit de *Aërta* aanstonds onder het *Diaphragmá*, welke *Coeliaca* genaamd wordt, en deeze geeft niet alleen takken aan de maag, aan het *Omentum*, *Hepar*, *Duodenum*, maar zendt ook eenen aanzienlyken en wyden tak naar de milt, welke in dezelve gekomen zynde door haar geheele *masa* met ontallyke takken verstrooid wordt.

CCCX. Ook gaat 'er een aderlyk vat van eene aanmerklyke grootte naar de milt uit de linker tak van de *Vena Portarum*, welke den naam van *Splenicus* draagt, en omtrent tweemaal zo wyd als de Slag-ader is; en wordt ook binnen het ingewand van de Milt in oneindige takken en kleiner takjes verdeeld; Daarenboven krygt de *Lien* vry aanmerklyke zenuwen van het *par vagum & intercostale*, welke in haar lichaam gaan en door de geheele zelfstandigheid verdeeld worden.

CCCXI. OM DAT de milt byna geen gevoel heeft; dewyl zy geen zenuw-spierachtige vliezen heeft; en 'er echter aanmerkelyke takken in haar lichaam gaan; zo schynt dit voorzeker om geen ander oogmerk dus gebeurt te zyn, dan dat zy den loop en omloop van 't bloed zouden aanzetten door de vaten, welke in een oneindig getal takken verdeeld wor-



den; nademaal het zeker is, dat tot de rokken van de Slag-aderen zenuwen komen, om te vermeederen haare *systole* en famentrekking, welke veel van de veerkracht en het ringswyze maakfel der vezelen afhangt.

CCCXII. HET is ten uiterften aanmerkenswaardig, dat uit den ftam van de *Vena Splenica* een tak komt, welke naar het *Intestinum rectum* gaat, en de *Vena haemorrhoidalis interna* genaamd wordt. Deeze moet het bloed uit de onderfte *arteria meferaïca* naar dit ingewand gevoerd langs eenen langen en lootlynigen weg naar deeze *vena splenica* te rug voeren, en omdat deeze beweeging uit haare natuur een weinig moeilyker is, ftaat het bloed om die reden ook gemaklyk in dit ingewand ftil, en breekt eindelyk door het uitzetten de allerkleinste vaatjes, waarvan het vloeijen der ambeijen zynen oorfprong ontleent.

*Aanmerking.*

DE inplanting van deezen tak heeft *Casferius* in zyne tafelen lib. VII. tab. 9., fraai befchreeven en afgebeeld, die in dezelve tafel ook het eerst van allen de milt van den mensch geheel-en-al vaatachtig voorgesteld heeft. De *Vafa brevia* zyn zeer kleine takken zo van de *Arteria* als *Vena Splenica*, welke naar het linker gedeelte van de maag het bloed, alwaar het zeer dun is, voeren, en ook gemaklyk in eenen *vomitùs cruentus* geopend worden

den, zo namelyk de milt verftopt zynde een hinderpaal aan den vryen omloop van 't bloed ftelt.

CCCXIII. WAT het gebruik en de werking van de milt belangt, die kan men het best uit haar maakfel zelve leeren kennen. *Malpighius* is de eerste geweest, die te kennen gegeven heeft, dat de milt beftondt uit loutere celletjes en onnoemlyke klieren, proeven neemende in de milt van dieren, inzonderheit in die van een kalf; alwaar hy waargenomen heeft, dat zo in de *arteria Splenica* laauw water gefpooten wordt, en door eene menigvuldige infpuiting de geheele milt uitgewafen en naderhant door de Slag-ader, zynde de *Vena Splenica* toegebonden, opgeblaazen wordt, wanneer men de arterie naderhand ook toebindt, en de milt dus opgeblaazen laat uitdroogen, men zien zal, dat de geheele milt uit celletjes beftaat.

*Aanmerking.*

NIET TEGENSTAANDE deeze Proef, by dieren genomen, zeer wel gelukt, zullen 'er fchoon zy op eene zelve wyze in de milt van een mensch in 't werk gefield wordt, echter dusdanige celletjes niet gevonden worden.

CCCXIV. Ook heeft *Ruysch* door eene zeer konstige opfpuiting der vaten getoond, dat



de menschlyke milt uit oneindige takjes van vaten en slag-aderlyke en aderlyke takjes samengesteld is, en deeze celletjes niet heeft, welke men by dieren vinden kan. *Malpighius* heeft ook klieren in een menschlyken milt aangetoond; doch de voortspruitfels der Slag-aderen en aderen, welke tot bundeltjes in den milt geschikt zyn en in zachter sapachtige lichaamtjes vereenigd, vertoonen de gedaante van klieren, en hebben dus de allerbeste Ontleedkundigen bedroogen. Zie *Ruysch Epist. IV. probl. & thes. Anatom.*

*Aanmerking.*

OVER deeze zaak verdienen ook geleezen te worden *Ruyschii Epist. X. problem. en thesauri anatomici.*

CCCXV. DIT is aantekens-waardig, dat het bloed in den milt zeer vloeibaar, purper-rood, bezwaarlyk samenstollende en wel terdeeg vermengd gevonden wordt, en ook door de groote milt-ader ontlast wordt.

*Aanmerking.*

IN 't algemeen moet men dit onthouden, dat het dunne en behoorlyk vermengde bloed bewerkt wordt, hoe de omloop door de allerkleinste en haair-buisjes der deelen sneller en gemaklyker is; daarom oordeelen wy, dat de milt alleen om die reden samengesteld is uit  
on-

oncindige zeer kleine vaatjes; dat het bloed van de drukking van deeze zeer kleine vaatjes, waartoe zeer veel helpt de aandrang van de Slag-ader, de voortspruitsels der zenuwen en de geduurige schuddende beweging van het *Diaphragma*, tot de kleinste deeltjes verdund, gedeeld, gekleinst worde, en 'er dus eene innerlyke vereeniging der vloeibaare en vaste deele gebeure, niet anders, dan 'er in de longen geschiedt, dewyl het bloed uit dezelfde door de Longs-ader veel vloeibaarder van eene purpere kleur voortkomt, dan 'er door de *Arteria pulmonalis* is ingegaan.

CCCXVI. HET bloed in den milt vloeibaarder en dunner geworden zynde, is het des te bekwaamer voor het gebruik van de Lever, om namelyk dat bloed, het welk uit het *Mesenterium*, *Mesocolon*, *Omentum* en de Maag eenigzins van zyne vochtigheid is beroofd geworden, schielyker door de vaten van de Lever, namelyk door de takken van de *Venæ portae*, welke geen *diastole* noch *systole* hebben, doorvloeiten rondloopt, het welk gebeurt, wanneer 'er het van de milt voortkomend en te rug loopend bloed, zeer dun en vloeibaar zynde, bygemengd wordt.

CCCXVII. VERSCHIEDENE verschynselen en uitwerkingen worden 'er waargenomen by die dieren, welke men de milt uitgesneden heeft, namelyk zy worden vet en schrokken.



kende in 't eeten, ja zelve geil, en dan krygen zy een gezwel in 't rechter *bypochondrium*, 't welk van de grootheid van de Lever ontstaat: over welke zaak vooral verdient nagelezen te worden *Malpighius in Disfert. Anat. Cap. 5.*

*Aanmerking.*

DAT men zonder levensgevaar uit beesten de milt kan wegsnyden, getuigen zeer veele proefneemingen, ten dien einde gedaan, doch men zal dit niet even gelukkig in het menschlyk lichaam kunnen onderneemen, gedeeltelyk omdat de milt in een mensch digter by de *Medulla Spinalis* dan in dieren legt; en ook omdat de mensch van een gevoeliger natuur is, en daarom meerder onderhevig aan zwaare aandoeningen, stuiptrekkingen en koortsen, en om die reden laat ik het geen *Bartholinus Cent. IV. hist. 51.* van de uitsnyding van de mild gezegd heeft, aan zyne plaats.

CCCXVIII. Doch de reden der verschynselen, welke by dieren, die men de mild heeft uitgesneden, voorvallen, moet hieruit afgeleid worden. Vooreerst ontspruit de meerder grootte van de milt by hen, omdat het bloed in grooter menigte na het uitsnyden van de milt tot de lever gevoerd wordt, en zyne vaten meerder vult en uitzet;  
ver-

vervolgens loozen die dieren, welke de mild missen, meerder water, omdat 'er een grooter menigte bloed, de mild weggenomen zynde, gevoerd wordt door de *vasa emulgentia*; welke onder de *arteriæ coeliacæ* leggen, en dus gebeurt 'er eene overvloediger afscheiding van het zoute wey; vervolgens worden zy geiler, omdat 'er door de *Arteriæ spermaticæ* ook een grooter gedeelte bloed naar de *Testes* gevoerd wordt; ook worden zy schrokkender in 't eeten om het menigvuldiger aangevoerde bloed naar de rokken van de Maag.

### *Ziektekundige Beschouwing*

§. CCCXIX. Om de overgroote menigte van zeer kleine vaatjes, waaruit de geheele zelfstandigheid van de Mild samengesteld is, kan geen ingewand zo schielyk opzetten, zwellen en opgepropt worden, dan de Mild zelve, omdat naamlyk het dikker bloed moeilyker in de takjes der aderen komt, en de slagaderlyke vaten zeer opgezet en verslapt zynde gemaklyk en binnen korten tyd een uitwas kunnen veroorzaaken.

### *Aanmerking.*

Niets kan de Mild zo zeer doen opzwellen, als het drinken van kouden drank in een

ONTLEEDK. Verz. I. verv. XIV F sterke



sterk bezweet lichaam , en deeze zwelling , zo zy niet schielyk door *diluentia* , door het drinken namelyk van een groote menigte warm water , ontbonden wordt , bedreigt zwaarder ongemakken , zo 'er eene sterkere lichaams beweeging bykomt.

§. CCCXX. Zo het gezwel ouder wordt , wordt het bezwaarlyk ontbonden , en dan groeit het dikwyls tot eenen zeer grooten klomp aan , zodat het somtyds VIII  $\text{æ}$  weegt , waarover men zien kan *Diemerbroek* ; en *Real-*  
*dus Columbus* heeft een mild , die XX  $\text{æ}$  woog , gezien. *Hippocrates* heeft die geen , welke een grooten mild droegen , *miltzuchtige* genaamd.

*Lienosi*,

§. CCCXXI. TEN tweeden is eene aanmerklyke pyn in het *hypochondrium sinistrum* naar de rug toe , zo dezelve bestendig blyft en niet vergaat , maar eene vaste plaats beslaat , buiten twyfel een teken van een groote mild , vooral zo de ademhaaling moeilyker wordt , en 'er ook benaauwdheid om het hart met eene zekere eetloosheid vereenigd wordt , als doende de mild dan , door de zwaarte van zyn klomp , al te zeer uitrekken de banden en bindfels , waarmede de mild aan het *diaphragma* , de maag en ribben vast is.

§. CCCXXII. SOMTYDS gebeurt 'er eene scheuring van de mild door de al te groote uitspanning zyner vaten , en zo 'er eene uiterlyke geweldige oorzaak bykomt , gebeurt de  
 scheu-

scheuring van dit ingewand ligter, om dat de Mild van een mensch met zeer dunne vliezen bekleed is.

*Aanmerking.*

DERGELYKE voorbeelden kan men leezen in *M. N. C. Dec. II. Anno IIX obs. 129*, en by *Bohnius de lethali tate vulner.* by *Tulp lib. II. obs. 29.* by *Hier. ab Aquapendente in libris anatom. chirurg.* of in *libro de operat. chirurg. p. 52.*

§. CCCXXIII. TEN derden is 'er *scirrbus* en hardheid van de Mild; deeze begint meest in het vlies, het welk den mild omringt, en gaat langzaam voort tot de *vasa capillaria*, welke van tyd tot tyd dus samenge trokken en verhard worden, dat de Mild hard gelyk een steen of kraakbeenig wordt.

*Aanmerking.*

VOORBEELDEN kan men vinden in *M. N. C. Dec. I Anno III. obs. 188. Dec. I. Anno I obs. 29.* Gelegenheid tot *scirrbus* van den Mild kan gegeven worden door een ontydig gebruik van *adstringentia* in al te sterke bloedsstortingen, in *dysenteria* en intermitteerende koortsen, vooral derdendaagfche.

§. CCCXXIV. TEN vierden is 'er *inflammatie* van den Mild, welke echter een weinig zeltzaamer ziekte is; zy wordt gekend uit den grooten pols - slag zelven omtrent de valsche ribben in 't *hypocondrium sinistrum*, hoedanig



een voorbeeld *Tulp* verhaalt *Obs. libr. II. cap. 8.*

§. CCCXXV. Ook is 'er bederving van de mild en zyne stinkende wegteering: het *absces* zelfs kan mischien menigvuldiger zyn dan de *inflammatie*.

*Aanmerking.*

EEN Lever zo zwart als pik is waargenomen van *Blancard* in *Observ. Anatom. Practic.*, en ook in de *M. N. C. Dec. II. Ann. 10. obs. 146.*

§. CCCXXVI. ONDER de ongemakken van de Mild, inzonderheit zyne gezwellen, verstoppingen en verhardingen, zyn de volgende het allerkenlykst: *bloedbraaking*, wanneer uit *Vomitus cruentus* de gebroken *vasa brevia* het bloed in het hol van de Maag gestort wordt, en eene braaking van zuiver, doch meest van zwart en dreckachtig bloed veroorzaakt.

*Aanmerking.*

PRAKTIKAALE Ontleedkundige Waarneemingen hier en daar opgezameld, getuigen, dat in een *vomitus cruentus* de Mild nooit onbeschadigd gevonden is, zynde de *vasa brevia* ten uitersten opgezet; en hier over moet men zich niet verwonderen, omdat de maag aan de linkerzyde, tegen welke deeze vaten leggen, zeer dun is, zodat zy gemaklyker opgezet en geopend kunnen worden.

§. CCCXXVII. DE zwarte ziekte by *Hippocrates* dus genaamd, alwaar van onderen en

boven zwarte en stinkende stoffen ontlast worden, heeft ook haaren oorsprong in eenen verstopten of verharden mild, alwaar de *vasa brevia* in de Maag, als ook de bloedvaten in het *intestinum ileum*, het welk een zeer teer gedarmte is, geopend worden om den onderschepten vryen doorloop van bloed, zynde als 't ware 'er een hinderpaal in de mild gesteld.

*Aanmerking.*

WAARNEEMINGEN over deeze zaak kan men vinden in onze *Disfert.* over deeze *morbus niger*.

§. CCCXVIII. AL te groote bloedstortingen, inzonderheit hardnekkige en langduurige, hetzy door de neus, vooral aan de linker zyde, of door den ambeyen-vloed, of eene bloedstorting uit den *uterus*, zyn ook gewoon te volgen op de verstoppingen der ingewanden van den onderbuik, voornamelyk de Lever en Mild.

*Aanmerking.*

DERGELYKE bloedstortingen zyn zeer verderfelyk en sleepen ligtlyk den dood achter zich na om het groot gemis der krachten, gelyk gemeenlyk by *hydropici* en *cachectici* gebeurt, welke aan eene verharde of verstopte Lever of Mild kwynen.

§. CCCXXIX. DE *Cachexia scorbutica* of de *chlorosis virginum* vervangen meestentyds de



gebreken van den mild, inzonderheit zyne opzetting en verstopping, en *Hippocrates* verdient voornaamentlyk over deeze zaak gelezen te worden *de intern. affect. sect. 34. & 40 item 35.*

*Aanmerking.*

DE *scorbut* en *cachexia* zyn inzonderheit ongemakken van de verstopte ingewanden van den onderbuik, voornamelyk van de Lever en Mild, welke verstopt zynde het bloed en de *lympba* dikker worden, de vochten verstyven, onzuiver en bedorven worden, omdat in de Lever de *scoriæ biliosæ salinæ* niet afgescheiden worden. Hierom lyden byna alle deelen van het lichaam van het dikke en onzuivere bloed *Nutritio*. straffe; vooral wordt de *Voeding* beroofd, het lichaam zwelt op, de koleur wordt bleek, de krachten neemen af, en 'er komen hier en daar zweertjes en bedervingen van de hui voortkruipen, voornamelyk rot het tandvleesch en wordt bloederig.

### XIII H O O F D S T U K.

#### V A N D E L E V E R.

§. CCCXXX. **D**E Lever legt in het hoogste gedeelte van den buik, namelyk in het *Hypochondrium dextrum* tegen het *diaphragma* aan, en van daar strekt zy zich uit een

een weinig verder dan het *cartilago ensiformis*.

§. CCCXXXI. Zy wordt verdeeld in het holle en bolle gedeelte. Het laatste is door middel van 't *Pertonaeum* zeer vast vereenigd met de valsche ribben van de rechter zyde, doch wel meest aan een gedeelte van het *Diaphragma*, omtrent de rechterzyde van de *spina*, waarnaartoe zy zich in de dwarste uitstrekt: doch haar holle gedeelte, inzonderheit het linker, omvat den *Pylorus* en het voorste gedeelte van de Maag: maar het rechter holle gedeelte raakt de rechter Nier aan, en legt daar voor een gedeelte op een end van 't *Colon*, en vereenigt zich ook met zekere gedeeltens met het *duodenum* en *jejunum*. Het onderste gedeelte van de Lever zakt in een gezond recht over eind staande mensch onder de valsche ribben en komt tot aan de navel zelfs.

*Aanmerking.*

EEN zieklyke en opgezwolle Lever zakt dikwyls tot onder de navel.

§. CCCXXII. DE banden, door welker hulp de Lever haar behoorlyke plaats en legging behoudt, worden gemeenlyk drie geteld, van welke echter de voornaamste is de *Hang-Ligamentum*, en die dit ingewand wel vast met het *diaphragma* bindt; want door deezen band wordt *suspensorium* het anderzins zwaare gewicht van de Le-



ver ondersteunt, dat het niet naar beneden valle.

*Aanmerking.*

DEEZE band wordt niet alleen aan het uiterlyke vlies van de Lever gehecht, maar dringt ook tot in haare zelfstandigheid toe door.

§. CCCXXXIII. DE twee overige banden, waarvan de eerste is de *vena umbilicalis*, welke uit de *fissura hepatis* uitgaat en in de navel ophoudt; en de tweede, waarmêe de Lever aan 't *cartilago ensiformis* vast zit en zeer dun en slap is, komende van de verdubbeling van 't vlies van de Lever, zyn zo zeer geen sterke steunsels van de Lever.

DE Lever, na dat de houding van 't lichaam verscheiden is, en dat wel of overeind, of onderst boven, of voor over of achter over of op de linker of rechter zyde, verandert van leg-plaats, het welk voornaamlyk blykt uit de gezwollen van de Lever, welke de houding van 't lichaam veranderd zynde ook van plaats veranderen.

§. CCCXXXIV. DEWYL de Lever zeer vast aan het *Diaphragma* zit, en dit in de werking van de in- en uit-ademing naar boven en beneden bewoogen wordt, blykt het ligtlyk, dat de Lever de beweeging van 't *Diaphragma* volgt, namelyk dus, dat zy in de inademing naar beneden daale, doch in de uitademing naar boven gedreeven wordt.

§. CCCXXXV.

§. CCCXXXV. DE Lever is byna geheel uit enkele bloed-vaten samengefteld, en onder deeze verdient het eerfte in aanmerking genomen de zo genaamde *Vena Portæ*, welke in dit deel de verrichting van een slag-ader doet, en als 't ware met een byzonder voorrecht boven alle andere deelen voorzien is; want het voert naar dit ingewand het bloed, dat het ontfangen heeft van de Maag, 't *Mefenterium*, de *intestina*, 't *omentum*, *mesocolon*, *pancreas* en milt.

*Aanmerking.*

ZONDERLING is het maakfel van deeze Ader, dat alle andere aderlyke vaten zo niet hebben. Want gelyk in deeze de kleinste en kleiner takjes het bloed naar den ftam voeren en dus naar 't hart, dus ontfangt de *Vena Portæ* wel het bloed uit de kleiner vaten in den ftam, maar voert het naderhant weer uit deeze in ontelbaare kleiner en allerkleinste takjes, het welk anders de slag-aderen eigen is, waarom zy de verrichting van een Ader en Slag-ader doet.

§. CCCXXXVI. DE Ouden hebben niet onaardig deeze ader vergeleeken by een boom, met takken en wortels voorzien, alwaar de wortels in ontelbaare vezels uitloopen, door welker hulp het voedend fap uit de pooren der aarde opgenomen wordt, en eind-  
ONTLEEDK. *Verz. I. verv. XV.* E lyk



lyk in zeer menigvuldige en ontallyke takken verftrooid.

§. CCCXXXVII. DE *Vena Portæ* loopt omtrent in 't midden, het holle gedeelte van de Lever in, en wel met vyf grooter takken; doch zodra deeze *Vena* hier ingaat en de zelfftandigheid van de Lever doorboort, krygt zy aanftonds rokken gelyk aan die der Slagaderen, grove en fterke namelyk, welke ook meestentyds zeer vast vereenigd zyn met de zelfftandigheid van de Lever, die men *Parenchyma* noemt, buiten twyfel met dat inzicht, dat de groote openingen deezer vaten altyd gaapen en open blyven, en niet gemaklyk toevallen, en een hinderpaal geeven aan den vryen doortocht van 't bloed.

§. CCCXXXVIII. INZONDERHEIT dient men aan te merken voor den ingang van de *Vena Portarum* in de Lever, een zeker vliespijerachtig omwinfel, het welk gelyk eene fcheede, niet alleen den ftam van de *Vena Portæ*, maar ook de *arteria hepatica* en de *ductus biliarii* omkleedt en verbergt, zynde dit vlies van *Glissonius* gevonden, welke het ook den naam gegeven heeft van *Capsula Glissoniana*, over welke zaak hy kan nageleezen worden, *Cap. XXVIII. Anatomie Hepatis.*

*Aanmerking.*

DEEZE Spier-vliesachtige *Capsula* geeft een oorsprong aan den eerften rok van de *Vena Por-*

*Portæ*, welke door het ingewand van de Lever verftrooid wordt, en maakt dezelve in de Lever dikker en fterker. Namenlyk *Glissonius*, deszelfs uitvinder, fchryft op de aangehaalde plaats te recht, dat dit vlies naar de wyze van de *Vena Portæ* in takken verdeeld wordt, en tot aan de laafte haarvaatjes zich met dezelve verdeelt en verfpreadt; en het fchynt ook niet onaanneemlyk, dat deeze rok het buitenfte vlies geeft aan de *ductus biliarii hepatici*, door de binnenfte zelfftandigheid van de Lever verfpread, waardoor deeze fterker worden. Ook moet dit aangemerkt worden, dat de *Vena Portæ* geen half-maanfche klapvliesjes heeft, waarmede anders de Aderen gemeenlyk voorzien zyn, welke ook in de takken van de *Vena cava* van de Lever gevonden worden.

§. CCCXXXIX. Ook verdient onze befchouwing het maakfel van de *Vena cava* en haare vereeniging met de *Vena Portæ*, hoedanig eene in 't gantsche lichaam niet gevonden wordt. Want de eindens van de *Vena cava* zyn vereenigd met de uiteindens van de *Vena Portæ*, het bloed aanbrengende, niet dat zy een aan één vereenigd kanaal uitmaaken, gelyk in de vereeniging der Slag-aderen en Aderen gefchiedt; maar de kleinste takworingen van de *Vena cava* loopen eerder in de zyden van de *Vena Portæ*, zodat deeze eenen rechtenhoek midden doorsnydt.



*Aanmerking.*

TOT geen ander einde fchynt dit zonderling maakfel van de *Vena cava* en *Vena Portæ* gefchikt, dan opdat het bloed, het welk dunner dan de gal is, door de openingen van de *Vena cava*, niet anders dan de chyl in de ingewanden door de melk-vaten, gedreeven wordt, blyvende de dikker gal over, welke vervolgens in de *ductus biliarii*, die aan de *Vena Portæ* vervolgen, vloeit, en langs dezelve door een grooter buis in het *duodenum* gevoerd wordt.

§. CCCXL. BEHALVEN de *Vena Portæ* van de Lever, welke de verrichting van een Slagader doet, is de Lever ook nog voorzien met een groot aderlyk vat, het welk het overschietend bloed van de affcheiding van de gal en *Lympha* naar 't hart te rug voert, en dit vat is niets anders, dan een groote tak van de *Vena cava*, welke door onderscheide gaten drie onderscheide takken van de Lever ontfangt; te gelyk hecht zich ook in 't bolle gedeelte van de Lever een zeer aanzienlyke tak, het bloed zelfs uit de onderfte deelen te rug voerende, en dus wordt het bloed van de Lever en van de onderfte deelen door het gat van 't *diaphragma* naar 't rechter hart te rug gevoerd.

*Aanmerking.*

HET is aanmerkens-waardig, dat de holligheid van de *Vena cava* in de Lever kleiner is dan die van de *Vena Portæ*, en de reden hiervan is niet moeilyk te begrypen; want in de Lever geschiedt eene groote en menigvuldige afscheiding, zowel van gal als van *lympba* uit het bloed, door de *Vena Portæ* aangevoerd.

§. CCCXLI. BEHALVEN de *Vena Portæ* wordt 'er nog een ander bloed-aanvoerend vat gevonden, het welk is de rechter tak van de *arteria coeliaca*, welke het geheele hol van de Lever ingaat, en de geheele oppervlakte en zelfstandigheid met tallooze takwordingen doorwandelt: doch dit bloed wordt met dat inzicht niet aangevoerd, dat daar de gal van afgescheiden zou worden, maar opdat de vaten zelfs en hun rokken, waarvan hier een zeer groot getal is, voedsel zouden krygen. 'Er is waargenomen van scherpziende Ontleedkundige, dat de afstamsels van deeze Slag-ader, zo iemand dezelve met naauwkeurigheid navorst, slechts reiken tot de omwindfels der vaten, en 'er is geen twyfel aan, of dit bloed gaat door de takjes van de *vena cava* naar 't hart.

§. CCCXLII. BUITEN deeze bloed-vaten wordt 'er in de zelfstandigheid van de Lever ook een groote menigte van ontelbaare water-buisjes gevonden, welke *vasa lym-*



*phatica* genaamd worden. Deeze vaten doen zich in versch geslachte beesten gemaklyk aan 't gezicht op, flechts door een kleine kunst-greep, namelyk door 't toebinden van den *ductus thoracicus*: doch in een mensch worden zy zichbaar, zo in den tak van de rechter *coeliaca* of ook door de *Vena Portarum*, door middel van een spuit een groote menige warm water gespootten wordt.

*Aanmerking.*

BOVENAL verdient aangetekend te worden, dat omtrent het midden van de vorige eeuw in een en 't zelfde jaar in verscheide en ver van elkander leggende Landen, byzondere water-buizen of *vasa lymphatica* van sommige zeer geleerde en zeer schrandere Ontleedkundigen zyn uitgevonden, namelyk in Denemarken van *Bartholinus*, in Zweeden van *Olaus Rudbeck*, in Engeland van *Gulif*, in Nederland van *Sylvius*, waardoor naderhant een groote twist ontstaan is tusfchen *Bartholinus* en *Rudbeck*, over de eer der uitvinding. Doch *Nuck* heeft dit leerstuk en de geschiedenis der *vasa lymphatica* met verscheide nieuwe bygevoegde voorbeelden zeer wel opgehelderd, en wel door middel van opspuiting met kwik de *vasa lymphatica* met hunne takken en loop aan 't oog vertoond.

§. CCCXLIII. In het vereenigd deel van de

Le-

Lever heef *Nuck* ten minsten driehonderd *vasa lymphatica* geteld; doch uit haar hol gedeelte komen 'er ook ontallyke voort, en kruipen inzonderheit langs de *ductus biliosi* en de *Capsula Glissonii*.

*Aanmerking.*

HET verdient onze oplettenheid, dat de *ductus lymphatici*, die menigvuldig in getal over het bolle gedeelte van de Lever loopen, alleen uit deszelfs binnenst vlies ontspruiten, en door het *ligamentum suspensorium* zich ook in den *ductus thoracicus* planten: doch die uit het holle gedeelte komen, gaan uit de binnenste en diepste zelfstandigheid van de Lever, doch niet uit de *glandulae conglobatae*, in 't holle gedeelte van de Lever gelegen, voort, en voeren naderhant door een gedeelte van de *Pancreas*, en tusschen de verdubbeling van het *Peritonæum* hun *lympha* in den algemeenen ontfanger, namelyk in den *ductus thoracicus*.

§. CCCXLIV. In de Lever is ook nog een aderlyk vat van een byzonder gebruik tot voeding van de vrucht, namelyk de *vena umbilicalis*, waardoor het moeders-bloed aangevoerd wordt met het voedend sap, uit de *Placenta* te rug vloeiende, door de zelfstandigheid van de Lever in het geheele lichaam van de vrucht; maar omdat het niet in de *Vena Portarum* zich stort, maar eerder met een byzonder *cylindricq*



kanaal, 't welk *Heister in M. N. C. Cent. V. & VI. obs. 27.* zeer wel beschryft en afbeeldt, terftond gebragt wordt in de *vena cava* zelve. De reden, dat het zich niet eerder in de *vena portæ* ontlast, is, omdat het bloed van de moeder aangevoerd zuiver en reets van de galachtige deelen bevryd is. Deeze genoemde *vena umbilicalis* doet in een volwasfen mensch niet verder deeze verrichting, maar haare holte groeit toe, en de ader zelfs verandert in een peesachtigen band, welke belet, dat de Lever niet met geweld tegen de *thorax* gedreeven wordt in de *affectus spasmodici*.

§. CCCXLV. BEHALVEN de bloed-en water-vaten zyn 'er ook in de Lever uitwerp-buizen, welke gemeenlyk onder den naam van *pori biliarii* voorkomen. Deeze hebben dezelve takwordingen als de *vena portæ*, en ontfangen uit alle de deelen van de Lever het daar afgescheiden vocht, en brengen het in een wyder kanaal, het welk *ductus biliaris hepaticus* genaamd wordt; gedeeltlyk wordt het ook gevoerd door byzondere *ductus hepatici* naar de gal-blaas, waaruit het vervolgens weder gaat door een zonderling gedraaid kanaal, *ductus cysticus* genaamd, naar de algemeene buis, *choledochus* geheeten en naar het *intestinum duodenum*.

*Aanmerking.*

ZONDERLING is het maakfel van den *porus* of *ductus hepaticus* in de Lever, dewyl name-lyk zyne uiteindens in de binnenste holte zelve van de *Vena Portæ* eindigen, tot een klaar bewys, dat deeze het gal-vocht zelfs uit het bloed, in de *Vena Portæ* zich bevindende, opneemt, als het bloed eerst door de takjes van de *vena cava* afgescheiden is: doch *Bianchi* is in dit gevoelen, dat de *ductus hepaticus* met de *vena portæ* aan één vervolgd is, het welk een omgekeerd kanaal uitmaakt, en oordeelt, dat de eenigzins zwaare gal te rug vloeit, dat integendeel het eenigzins ligter bloed van de takken van de *vena cava* opgenomen, en in het *intestinum* zelfs ontlast wordt.

§. CCCXLVI. UIT dit samenstelzel van de Lever, geheel en al uit bloedvaten, en meenigvuldige gal-uitwerpbuisjes bestaande, blykt *Excretor*thans op het duidelykst, dat het niets anders *ria bilio-* *sa.* dan een werktuig is, waardoor het bloed afgescheiden en gezuiverd wordt, dewyl dit hier van haare zout zwavelige alcalische verbrande vui- *Salino* ligheeden, door middel van dit doorzygtuig *sulphureæ* gereinigd, en dus gezuiverd en gematigd *alcalinæ* *fordes* zynde tot de voeding zeer bekwaam ge- *adustæ.* maakt wordt.



*Aanmerking.*

Orga-  
non san-  
guifica-  
tione.
Ductus  
chiliferi.
 DEN Ouden echter was het gebruik der *hepar* onbekend; zy waren van gedachten, dat het een *werktuig* was der *bloedmaking*, omdat zy zagen, dat de Lever geheel met vaten en bloed vervuld was, en dat de *chyl* onmiddelyk door de *venae meseraicae* naar de *hepar* gevoerd wierdt; maar na de ontdekking van andere *chylbuizen*, en een naauwkeuriger overweeging van alle byzonderheeden, zo blyft 'er niets anders overig dan te stellen, dat de *hepar* het bloed zuivert, en de gal afscheidt, welkers nut immers tot bewaaring der gezondheid ten hoogst nuttig en nootzakelyk is.

§. CCCXLVII. 'ER is in het geheele lichaam geen ingewand te vinden, daar het bloed zo langzaam en traag in omloopt, dan in de *hepar*, waarom de voorzichtige natuur de *hepar* zeer wyslyk aan het *diaphragma* heeft vastgehecht, opdat door derzelver geduurige beweeging naar boven en beneden den langzaamen omloop van het bloed bevorderd zoude werden.

*Aanmerking.*

De reden waarom door de *hepar* het bloed traager omloopt, is, omdat in de *vena portae*, of het aanbrengend vat, geen polslag, of voortdryving des bloeds, in de uiterste eindens der *vasa capillaria* plaats heeft, en daarom heeft

heeft ook de alwyze natuur dit gebrek verbeterd en vervuld door de *vena portæ* sterker dan de overige *venæ* te maaken, opdat zy des te beeter aan de geduurig toeneemende dikte van bloed weerstand zoude kunnen bieden: ten anderen ontlast zich het bloed, dat in de Milt zeer gekleinst en verdund is, met dit eenigzints verdikte gedeelte van bloed in de Lever, dat uit den geheelen omtrek van de *intestina*, 't *mesenterium*, *omentum* te rug komt, opdat het bloed hier vloeibaarder geworden zynde, des te beter door de kleindere vaatjes zou kunnen loopen. Ten derden, eindelijk was het zeer noodzakelyk, dat de *hepar* aan het *diaphragma* vastgehecht was, om het bloed beter en gemaklyker door de *hepar* te doen omloopen.

§. CCCXLVIII. UIT het gezegde blykt thans klaar, dat de beweeging en arbeid des lichaams, waardoor de ademhaaling geduurig vermeerderd werdt, de vaardigste hulpmiddelen zyn om de *obstruëtio hepatis* en *lienis*, en bygevolg om *passiones Chronicæ* voortekomen, en daarom blykt ook duidelyk, waarom die geene, welke een zittend leven leiden, zo zeer aan *morbi chronici*, *calculi hepatis* & *cystidis felleæ*, *hepatis infartûs*, *obstructiones*, en daar uit voortvloeiende *cachexia*, *scorbutus*, en andere kwalen meer onderhevig zyn.

§. CCCXLIX. TOT bevordering van den omloop van 't bloed door de *hepar* helpt veel, dat



*Ductus.*

dat 'er aanmerkelyke zenuw takken, die het *Diaphragma* doorbooren, en uit het agtste paar voortkomen, nadat de vaten en buizen, namentlyk de *vena portæ*, *ductus biliarii*, en de takken van de *arteriæ hepaticæ* gaan, en deeze vaten onderling met elkander vereenigen en samenbinden, zekerlyk tot geen ander einde, dan om de *tonus*, fterkte en beweeging der vaten met meerder kragt te kunnen volvoeren, en dus den loop des bloeds regelen en bestieren.

*Aanmerking.*

HIERUIT zal gemakkelyk de reden blyken van die groote *consensus*, die 'er is tusfchen de *hepar*, en bygevolg tusfchen de *ductus biliofi* en de *ventriculus*, nadien de beide deelen met takken van dezelfde zenuwen voortkomende voorzien zyn, waardoor het gefchiedt, dat na het inneemen van een fterk *vomitif* of *purgeermiddel*, waardoor de *ductus biliarii* zeer geprikkeld worden, een groote menigte gal uit de *hepar* naar het *intestinum duodenum* gevoerd wordt, en dat de *ventriculus* en het *duodenum* door *spasmi* samengetrokken, dezelve gewoon zyn te vervolgen tot aan de *ductus biliarii*, en hierdoor een *icterifche cachexia* veroorzaaken, welke meeftentyds met een *cardialgia* gepaard gaat.

§. CCCL. 't GEBRUIK der zenuwen  
ftrekt

strekt niet alleen de om *plaatslyke beweging*, en *Motus* het gevoel te versterken, maar brengt ook *localis.* veel tot den omloop van 't bloed toe: want van deezen hangt de sterkte der deelen af.

§. CCCLI. BUITEN en behalven dat de *bepar* de gal afscheidt van het bloed, heeft hy nog één ander gebruik, 't geen tot meerder nuttigheid is; namentlyk, dat zy door haare overgroote *moles*, en met haare warme zelfstandigheid vast tegen de maag aanlegt, en dus veel toebrengt tot de scheiding en chylbereiding der vaste spyzen.

*Aanmerking.*

BEKEND is de fraaije *natuur-werktuigkundige* *Phisico* proef, en welke PAPIN met zyn *machine* *mechanicum.* deedt, welkers opening en deksel, na 'er een genoegsame kwantiteit van de hardste beenderen en water ingedaan te hebben, hy vast floot, waarmede hy schielyk met behulp van een kleine gemagtigde warmte, in een korten tyd deeze harde beenderen tot een jelle kookte.

§. CCCLII. 't Is ook buiten dat bekend, op welke manier men in een korten tyd de beenderen van dieren in een *alembicus vesicæ* gedaan, met behulp van waterdampen zagt kan maaken, welke proef by de *chemisten* *Philosophisch præpareeren*, of zonder vuur calcineeren genoemd wordt.

§. CCCLIII.



§. CCCLIII. 't BLYKT derhalven op 't klaarste, dat deeze twee *viscera*, de *hepar* aan de rechter, en de *lien* aan de linker zyde, dewyl zy vast tegen den *ventriculus* aanleggen, en dezelve neffens haare openingen omvattende, de uitwaasfemingen bevorderen, welke uit de warmte in de lucht en het *menstruum salivale* beslooten zynde, op dezelfde manier zeer bekwaam zyn, om de innerlyke zelfstandigheid der voedzelen te ontbinden. Want de *ventriculus* geslooten zynde, laat eenigen tyd de vluggere deelen van de lucht der voedfelen, en het *menstruum salivale* uitwaasfemen; hieruit blykt ook de reden, waarom gulziger dieren, gelyk honden, wolven, rotten, verkens, de *hepar* vast rondom de *ventriculus* hebben leggen, welke zy met meenigvuldige *globi* omvat.

§. CCCLIV. DE *hepar* heeft nog een uitstekend gebruik, dat hy namentlyk tot een *Diverticulum.* bergplaats strekt voor het al te zeer verdikte of uitgezette bloed, wyl de geheele *vena portæ* met alle haare takken, byna een derde gedeelte van de geheele *masa* der *hepar* uitmaakt; en dus is de groote uitgestrektheid der *hepar* samengesteld uit ontallyke vaten, opdat het al te zeer verdikte bloed daar een bergplaats vinden, en door zyne hoeveelheid en zwaarte uitzettende de vaten niet te wyt uitrekken, en derzelve Veerkracht en *tonus resolveeren*, en dus den loop des bloeds beletten zoude.

Ziek-

*Ziektekundige Beschouwing.*

§. CCCLV. DE *hepar* is een groote opmerking waardig, wanneer dezelve kwaalyk gesteld is, tot het voorkomen van *langduurige ziekten*, die haare *Morbi Chronici.* voornaamste zit-plaats in dit kwaalyk gestelde *viscus* hebben: vooreerst komt ons voor de al te groote *opvulling* der Lever zelfs of der *Infar-* vaten, en tegennatuurlyke uitzetting door *ctus.* het stilstaan, of te traagen voortgang des bloeds door deszelfs vaten. Aan dit ongemak zyn 't meest van alle *plethorici*, die een zittend leven leiden, onderhevig, en ook die geenen, die zeer gulzig in 't eeten zyn, en of weinig of onbehoorlyke drank, gelyk brandewyn, en zuure wynen drinken; dit ongemak gaat met de meeste *morbi chronici* gepaard, of liever zy gaat dezelve voor.

*Aanmerking.*

DIKWYLS veroorzaakt de groote uitspanning der Lever-vaten, dat de Lever zeer zwaar wordt, zodat zy den *ventriculus* en het *diaphragma* ook naar beneden trekt, niet zonder groot madeel voor de gezondheid; waardoor moeiljke ademhalingen, *dolores, spasmi, diaphragmatis distensiones* en *inclinatio ad vomitum* ontstaan.

§. CCCLVI. WEGENS de al te groote opvulling en uitzetting der vaten in de *hepar*,  
ziet



ziet men niet zelden *aneurismata* en *varices* te voorschyn komen. De *aneurismata* vallen wel het minste voor, en geschieden door het sterk uitrekken van een tak in de *Coeliaca*, en maaken zich kenbaar door haare sterke en moeilijke *pulsatio*; doch de *varices* vallen meerder voor in de takken van de *vena portæ*; men kan hier van voorbeelden aangehaald vinden, by *Vesalius*, *Guarinonius* & *Morton*.

*Calida.* DE *obstructio hepatis* is tweederley, of warm  
*Frigida.* of koud: de eerste is niets anders als een *stasis sanguinis*, dewelke pynen, *febres*, *singultus*, *an-*  
*Dolor* *xietates* in het rechter *hypocondrium*, gespannen  
*tensivus.* pyn en *vomitus* veroorzaakt, en in een woord, 't is eene oprechte *inflammatio hepatis*, schoon deeze kwaal een weinig zeldsaamer voorkomt.

### Aanmerking.

*Pulmo-* ZELDZAMER ontstaan 'er *inflammationen* in  
*nes.* de *Lever*, dan in de *Longen* en andere deelen, omdat zy meest ontstaan uit een geweldige voortstuwung van 't bloed tot in de kleinste vaatjes, waaruit een *inflammatio* ontstaat, omdat het bloed niet te rug komt, maar onbeweeglyk blyft en stilstaat. De reden is deeze, dat wegens de menigvuldige aderen, dewelke hier de verrichting der Slag-aderen volvoeren, 'er geen geweld of voortstuwung van bloed in de uiterste eindens der vaten plaats heeft.

§. CCCLVII. DE *inflammatio*, zo 'er geen  
 re-

resolutie plaats heeft, of zo dezelve te diepe wortelengeschooten heeft, gaat in een *abscessus* of *apostema* over, 't welk ook eenigzins zeldsaamer voorvalt. Zo deeze geopend wordt, dan loopt de etter en bedorve *masa* door de *ductus biliarii* naar het *duodenum* en de *intestina*: deeze kwaal gaat meesten tyds gepaard met een *febris hectica*, *atrophia*, en aanmerkelyk verval in krachten, verminderde eetlust, en de kwaal is zeer langdurende.

§. CCCLVIII. Zo de *inflammatie* noch ontbonden werdt, noch in *absces* overgaat, dan komt 'er *sphacelus* uit voort, verzelt gaande met een geduurig voorgaande koorts, veel gelykende naar een *febris hectica*, verval van krachten, en *singultus*: na den dood de Lever ontleedende, bevindt men dezelve zwart en bedorven, nevens de naast aanleggende deelen, 't *colon*, en 't rechter gedeelte van de *ventriculus*, en de *diaphragma* aangedaan door de *spacelatio* van de *hepar*.

§. CCCLIX. De *verharding* en *schirrhus* *he-*Indura-  
*patis* geschiedt, doordat de vliezen en rokken<sup>tio.</sup> der vaten al te zeer uitgezet zyn door het *serum sanguinis*, en het daaruit voortkomende gezwel, 't welk eindelyk wegens het stilstaan der vochten hard en *cartilagineus* wordt; en wyl de geheele *hepar* uit vaten bestaat, die met sterke vliezen van de *vena portæ* voorzien zyn, daarom ontstaat 'er eene hardheid, wanneer deeze sappen dikker worden; want de



vliezen worden wel 't allermeeft hard en groot.

§. CCCLX. Doch men moet niet aanftonds alle verhardingen of *famentrekkingen* en verdikkingen der vaten *scirrhi* noemen, maar dan eerst, wanneer zy vereeld en *cartilagineus* worden, en zy hebben meest plaats in het buitenfte vliezig gedeelte van de *hepar*, en in de uiterfte vaten: dikwyls beftaat deeze verharding het geheele vaatachtig geftel.

§. CCCLXI. Uit de langduurige *stasis sanguinis* in dit *viscus* komt 'er een *sphacelus* voort, wegens haare grootere *atonie*, voornamentlyk in die lichaamen, welke aan zwaare gemoedsbeweelingen en langduurige droefheid onderhevig, en daaruit een groote verflapping der deelen gevallen zyn.

*Aanmerking.*

DERGELYK geval heeft men waargenomen over twintig jaaren in een Raadsheer, welke door een langduurende droefheid, 't grootste verlies van kragten, verloorene eetenslust, inwendige hette met een flappe en snelle pols gekreegen hadt, waarby naderhand nog *singultus* & *conatus ad vomendum*, fchoon te vergeefs, kwamen, en in den tyd van vier weeken overleedt. In het ontleeden van deszelfs lichaam bevondt men de *hepar* geheel bedorven, en zwart als pik met een yslyke ftank;

stank; dat gedeelte van het *diaphragma*, 't welk tegen de Lever legt, beneffens het rechter gedeelte van den *Ventriculus*, hadt dezelfde kwaal naar zich getrokken.

§. CCCLXII. DE *waare inflammatio hepatis vera*. valt zeldzaamer voor dan de *valsche*, wanneer *Spuria*. niet zo zeer de substantie van de *hepar* zelfs, als wel deszelfs *ligamentum*, 't welk aan de *valsche ribben* en het *diaphragma* vast zit, doch *Costæ* 't meest van alle de omleggende deelen, 't *Spuria*. *pæritonæum*, de *musculi intercostales*, ook die van het *abdomen* in de rechter zyde, onder het *diaphragma*, onder de *costæ spuria*, met een bezwaarende spannende en stekende pyn aangedaan worden, verzelt van koorts, en *præcordiorum anxietates*; by vervolg van tyd komt 'er een hoest by, door welke echter de lyder weinig kwyt raakt.

*Aanmerking.*

ALHOEWEL dit ongemak meenigvuldiger, en onder den naam van *inflammatio hepatis*, of voor een *Hepatitis* in het bolle gedeelte gehouden wordt, echter vindt men 'er in de Scholen der Medicynen, en in onze praktyk weinig gewag van maakt: de *Pleuritus notha* is wel bekend, maar niet de *hepatitis spuria*: doch men kentze, zo de buitenste deelen en bekleedzelen van het lichaam, omtrent deeze plaats geleege, pynlyk zyn, en de pyn zelfs



door het aanraaken vermeerderdt met voorafgaande groote koude , en eene daarop eenmaal en fchielyk volgende vinnige hette: geen groot gevaar is 'er in deeze ziekte, zo men maar by tyds en behoorlyk *discutientia* en *diaphoretica* gebruikt.

§. CCCLXIII. ZOMTYDS hebben 'er ook te groote verwydingen, zo wel in de *arteriæ* als in de *vena portæ*, of *aneurismata* en *varices* in de *hepar* plaats: 'er vallen ook te groote uitspanningen in de *vasa lymphatica* voor, welke *hydaides* genoemd worden.

*Aanmerking.*

DERGELYKE *aneurismata* in de *coeliaca dextra* heeft ook *Bianchus* in *Hypochondriaci*, die langen tyd aan een ten hoogften moeilijke klopping in dit vat gekweld waren geweest, in zyne *historia hepatis* aangetekent; en by *Morton*, *Vesalius* en *Guarinonius* kan men voorbeelden van *varices* in de takken der *vena portæ* aangehaald vinden; doch de *hydatides* der *hepar* komen menigvuldiger in *hydropici* voor, en fomtyds ontstaat 'er door het openberften der zelve fchielyk een *hydrops*.

§. CCCLXIV. DE ziekten, die haaren oorsprong uit een kwaalyk gestelde *hepar* hebben, zyn meest-al *chronici*, voornamentlyk de *hydrops*, dewelke meestentyds haare vaste zitplaats in dit *viscus* hebben, 't welk de ontledingen  
der

der *hydropici* ook bevestigen, als wanneer men de *hepar* meest-al groot, verhard, saamgerimpeld, en als gekookt, en ook met *hydatides* of liever groote blaazen bezet vindt.

*Aanmerking.*

DE vaten van de *hepar* geobstrueerd zynde, wordt de *secretio* van 't *sanguis* en *lympba*, welke in dit *viscus* groot is, en derzelver omloop door de *vasa lymphatica* belet, waarom derzelver vrije loop gestuit zynde, het *serum* op andere plaatsen, zo wel uiterste ledenmaaten, voornamentlyk de beenen, als tusfchen het *cutis musculi abdominis* en *peritonæum*, of ook tusfchen de verdubbeling van het *mesenterium*, zich neer zet, of fomtyds worden de *vasa lymphatica* in deeze deelen zo wonderlyk uitgezet dat zy barften.

§. CCCLXV. 'ER komen ook meestentyds hardnekkiger *febres intermittentes*, die niet uit de kwaade gesteldheid der lucht spruiten, voornamentlyk *quartanæ*, uit eenig ongemak in de *hepar* voort, wanneer de *hepar* of zelfs of wel zyn vaten geobstrueerd, en met bloed opgepropt zyn.

*Aanmerking*

DAAROM zyn de *febres quartanæ*, dewelke zonder onregelmatige of voorafgaande gesteltenis van lucht of tyden, de lichaamen aan-



vallen, moeilijker te geneezen, die ook zeer gemakkelyk in *hydrops* en *cachexia* overgaan, zo zy ontydig met *adstringentia* behandeld worden.

§. CCCLXVI. ONDER de ziekten, die uit een gebrek in de *hepar* ontstaan, moet men ook de *cachexia*, voornaamentlyk de *scorbutica* stellen, welke meestentyds uit een *obstructio* in de *lien*, en ook in de *vasa mesenterica* en *pancreas* voortkomen; want wanneer de *hepar* geobstrueerd en opgepropt is, dan worden gewoonlyk de naast aangelegene *viscera*, welke wegens haare vereeniging gemeenschap met de *vena portæ* hebben, tegelyk aangedaan, en voornamentlyk de *lien*, *pancreas* en *glandula mesenterica*.

#### Aanmerking.

DIT zeggen bevestigen voornamentlyk de ontledingen der lyken, wanneer men niets gemeenzamer ondervindt, als dat in *morbi chronici* beide deeze deelen, de *hepar* en *lien*, aan ongemakken, en meestal aan *obstructien* onderhevig zyn.

§. CCCLXVII. ONDER de Ziekten, die uit een gebrek in de *hepar* ontstaan, heeft ook de al te groote *fluxus hæmorrhoidum* plaats, en voornamelyk die, welke men gewoon is *fluxus hepaticus* te noemen, nademaal deeze meer uit de geopende *vasa* der *intestina tenuia* dan wel uit

uit de *hæmorrhoidales* vloeit, en alzo meer de opgeproptheid en *obstruëtio hepatis* ten grondslag heeft, waardoor de vrye omloop des bloeds, benevens zyn terugkomst belet wordt: daarom wordt zy niet onbekwaamlyk *fluxus hepaticus*, genaamd, en gelykerwys de *hæmorrhoidale* vloed meest op zekere tyden geschiedt, zo gebeurd integendeel de *fluxus hepaticus* menigvuldiger, en valt dagelyks voor en wordt lichtelyk door gemoeds-driften, beweeging des lichaams, of door het gebruik van geestryke voedfelen, en in 't gemeen door alle prikkelende en beweegende geneesmiddelen aangezet: dezelve wordt moeijelyk behandeld, en laat zich niet gemaklyk geneezen.

§. CCCLXVIII. HET *stillicidium narium* vloeit ook uit dezelfde bron voort in de gebreeken der *hepar*; want de *hepar* opgepropt zynde, wordt de *masa sanguinis* met meerder geweld en in een grootere kwantiteit gedwongen naar andere vaten en plaatzen, die meer open zyn, te loopen.

§. CCCLXIX. UIT deeze oorzaak, of wel het gebrek der *bilis*, voornamentlyk derzelve *inertia* en *defectus*, of ook uit de al te groote vloeijing van het zout *scherpe lymphatisch* vocht, naar de *glandulæ intestinales* komt ook de *diarrhœa biliosa* voort, en gaat dikwyls met snydingen gepaard, en is niet gemaklyk te geneezen, tenzy men acht geeve op het *affectus* der *hepar*.



§. CCCLXX. MEN moet niet vergeeten de *affectio hypochondriaca*, welke uit een kwetzuur of kwaade gesteldheid van de *hepar* en der ingewanden in den onderbuik ontstaat.

*Aanmerking.*

DE *affectio hypochondriaca* is wel een ziekte van den *ventriculus* en *intestina*, in welke de *tonus* en *motus peristalticus* van deeze zenuw-  
*Inversus*.achtige deelen ontrust en omgekeerd is, en van *spasmi* elendiglyk geplaagd worden, en niet alleen, dat zy deeze gevoelige zenuwachtige deelen doen lyden, maar zy doen zelfs de by  
*Nerveo-* en verafgeleegene zenuw-vliesachtige en het ge-  
*membra-* heele *systema nervorum* aan; echter zit de oor-  
*naceæ.* zaak van deeze *affectus* dikwyls in de *viscera*, *hepar*, *lien* en *pancreas*, door welke geobstrueerd zynde, zo wel de *humores biliosi* als *lymphatici*, tot de *digestio* der voedselen, *secretio* en *excretio alvi* dienende, bedorven worden, en een kwaade *diathesis* naar zich trekken, waardoor vervolgens de *digestio* geschonden, en de *tonus* der deelen bedorven wordt.

*Heelkundige Beschouwing.*

§. CCCLXXI. TE recht behoort men hier in aanmerking te neemende kwetzuuren der *hepar*, die doodlyk zyn, wanneer grootere vaten, of lie-  
 ver

ver grootere takken van de *vena portæ* afgesneeden zyn. De bloedstorting wordt namentlyk doodlyk, wanneer de krachten schielyk verlooren gaan, en het bloed in de holte van het *abdomen* stort, alwaar het rot, en niet gemaklyk uitgehaald kan worden. Maar wanneer in de *substantie* van de *hepar* zelfs alleenlyk kleindere takken gekwetst zyn, dan loopt het *uitgestorte* bloed *Extravasatus*. door de wond zelfs weg, of zakt ook door de *ductus biliarii* naar de *intestina*, en wordt als dan door den stoelgang geloost, omdat de takjes van van de *pori biliarii*, welke menigvuldig in de *hepar* zyn, ook doorgesneeden worden. Hier over dient men de Waarneeming van GLISSONIIUS na te leezen, welke hy aangetekend heeft in zyne *anatomia hepatis*, pag. 98.

§. CCCLXXII. Zo de kwetzuuren gesneeden worden, zyn zy gevaarlyker dan gestookene; want in het eerste geval kan het niet anders zyn, of 'er moeten veele vaten gekwetst worden: doch gestoken zynde kunnen 'er veel vaten vryloopen. Nog gevaarlyker zyn de kwetszuuren, die door een snaphaan met een kogel of schroot geladen, geschooten worden, wegens de groote kwetzing van het *parenchyma*, affnyding der vaten en kneuzingen der vezelen: wyl 'er dus gemakelyk een doodlyke *hæmorrhagia* en *sphacelus* volgt.

§. CCCLXXIII. DE grootere *kneuzing* der *Contusio*.



*hepar*, door een geweldige oorzaak van buiten, is wegens de verscheuring en verdraaijing der vaten, en daaruit voortvloeiende *extravasatie* der vochten, ook in de Heelkunde de grootste opmerking waardig, en niet zonder gevaar: omdat, zo men niet schielyk uitwendige *discutientia*, en inwendige *diaphoretica*, die in staat zyn het geklonterde bloed te kunnen *disfolveeren*, gebruikt, de kwaal, schoon ook kleinder en geneesbaar, naderhand ongeneeslyk wordt.

*Aanmerking.*

W y hebben hier van een voorbeeld gezien in een meisje van twaalf jaaren, dat door een zwaare val op de plaats, daar de *hepar* legt, niet alleen gekweld wierdt met een *profuvium alvi cruentum*, maar ook een *mictus sanguineus* met groote benauwdheid, verzelt met een *calor internus*: echter is zy hersteld door *infusa vulneraria*, *axungia humana recens*, en een poeder uit *sperma ceti*, uit een *solutio oculorum cancri*, de *antimonium diaphoreticum*, *nitrum* en *crocus* bestaande, en met een *catasplasma discutiens* uit wyn en *species nervinae aromaticae* saamgesteld.

§. CCCLXXIV. EEN *Apostema* valt wel zeldzaamer in de *hepar* voor, nochtans, wanneer

neer zy voorvalt, veroorzaakt zy en Heelmeester en Lyder veele moeilijkheeden, omdat deeze kwaal zeer lang duurt, en met veele *symptomata* verzeld gaat, en zeer zagtelyk behandeld wil worden.

*Aanmerking.*

ZODANIG *Apostema* heb ik waargenomen na een zwaare *contusie*, waarin de *masa perulenta*, zo wel door de *urina* als *alvus* met bloed vermengd geëvacueerd wierdt met flauwte, verlies van appetyt en scherpe pyn in het rechter *hypochondrium*, *febris lenta*, en pyn voor 't hart. Deeze Lyder is ook geneezen, maar eerst na verloop van byna een geheel half jaar, wyl hy niet anders dan alleen de zagtste wond- en gematigde *Balsamicque* heelmiddelen met *axungia humana* vermengd, verdraagen kon, en integendeel van alle scherpe middelen schade leedt.



## XIV. HOOFDSTUK.

VAN DE WEGEN EN BUIZEN, DIE  
DE GAL HEEFT, EN VAN DE  
NATUUR EN 'T GEBRUIK  
DER BILIS.

§. CCCLXXV. **D**E werking van de *hepar* be-  
staat alleenlyk in de af-  
*Secretio humoris Biliosi.* scheiding van het galachtig vocht, welk humor  
*Sulphurea resiniformis.* eenigzins dik en zwaar is, en uit een *glutineus*  
*Serum* en zwavelige bartsachtige zelfstandigheid,  
 en een *sal alcali* saamengesteld is, van het  
 bloed, 't geen door de *vena portæ* aangebragt  
 wordt, afgescheiden, en door byzondere  
*Ductus.* kleinder in grootere buizen, en eindelyk in de  
*Truncus.* *stam* en canaal, die men de *ductus hepaticus*  
 noemt, verzameld, en uit welke zy door de  
 gemeene *ductus choledochus* in het *intestinum duo-*  
*denum* overgevoerd wordt.

§. CCCLXXVI. DAARENBOVEN wordt  
*Rapsula.* dit zelfde humor in een byzonder *kasje*, dat  
*Vesicula fellea.* aan de *hepar* vast zit, namentlyk de galblaas of  
*cystis fellea* vergaderd, in het welk het als in een  
*Promptuarium.* bergplaats tot het gebruik bewaard wordt, en  
 ook door een byzondere *ductus*, welke men  
*cysticus* noemt, op deeze wys in het *intestinum*  
*duodenum* overgevoerd wordt.

§. CCCLXXVII.

§. CCCLXXVII. DE *ductus* zelfs en *canales biliarii*, die 'er in de *hepar* zyn, bestaan uit verscheide *rokken*, welke zy gemeen hebben met den *Tunicæ ductus cysticus* en *choledochus*, namentlyk uit een vat - vezel - spier - en zenuuwachtig *tendineus Vasculo-vlies*, en dit is wel het merkwaardigste, dat <sup>sa fibrosa</sup> de kleinste verdeelingen der takken uit de <sup>mulculo-</sup> *sa. plexus hepaticus* voor 't grootste gedeelte in deeze *tunicæ* eindigen.

§. CCCLXXVIII. UIT het samensteltfel dezer *ductus* blykt het, dat dezelve en met gevoel en *peristaltische* beweeging, dewelke in alle kanaalen en derzelve gestel, en voornamentlyk in de *intestina* plaats heeft, namentlyk verwyderende, en over en weder samen-trekkende, voorzien zyn, zekerlyk tot dat einde, opdat door deszelfs behulp de *Bilis* uit de nauwere naar de wydere wegen zoude kunnen bevorderd werden.

*Aaumerking.*

WYL deeze *ductus hepatici*, welke de gal voeren en uitvoeren, met een zo uitgelezen beweeging en gevoel voorzien zyn, blykt tans overvloediglyk de reden, waarom sterker *emetica* of ook *purgantia* deeze *ductus* zo wonderlyk *evacueeren*, en een groote kwantiteit *Bilis* uit dezelve doen vloeijen, namentlyk door de prikkeling, die door deeze door-dringender geneesmiddelen geschiedt tot der-zel-



zelve *tunicæ* overgevoerd wordt; en dus blykt ook, waarom 'er door een grooter toornigheid, buiten gewoonte een groote gedeelte der gal uit deeze *ductus* in het *duodenum* uitgestort wordt, wyl door deeze aandoening deeze *ductus* sterker samengedrongen en gedrukt worden. Vervolgens blykt hier ook uit, waarom 'er door een *cardialgia* of *spasmus ventriculi*, en niet minder schielyke oploophoudheid, een *cachexia icteritia* ontstaat, dewyl immers deeze *ductus* door een sterkere *spasmus* geconstringeerd zynde, de loop en uitgang der *bilis* naar het *duodenum* belet wordt, en zelfs door de *vasa lymphatica* naar de *masa sanguinis* terugt komt.

§. CCCLXXIX. DE *vesicula felle* zelfs bestaat uit het zelfde *membraneuse* maaksel, welke alle Hedendaagsche Ontleedkundige uit de reets aangetoonde vier *tunicæ* bevestigen saamengesteld te zyn, tot een klaar bewys, dat deeze *capsula* niet alleen de plaats vervult van een *receptaculum*, maar teffens met een zekere *samentrekkende en verwyderende beweeging* voorzien is, dewelke door verscheide oorzaaken verminderd en vermeerderd worden kan, en door welkers behulp de gal zelfs uit haare *bodem* voortgedreeven wordt naar deszelfs *hals*, en *ductus cysticus*, dewelke ten aanzien van de *fundus vesiculæ* veel hooger legt.

*Motus constrictorius & dilatatorius.*  
*Fundus.*  
*Cervix.*

§. CCCLXXX. ALLE Schryvers zyn niet van en een 't zelfde gevoelen wegens den oorsprong der

der *bilis* uit de *cystis fellea*; eenige zyn van oordeel, dat de *tunica* van deeze *capsula* klierachtig is, welke het *humor biliosus* van het bloed afscheidt. Andere meenen, dat de Gal door byzondere en eige buizen, *cystico-hepatici* genaam, daar verzameld wordt: weer andere stellen vast, dat zy door de *ductus hepaticus* in deeze blaas gevoerd wordt: wy door veele proefneemingen en de zaak zelfs overtuigd, stellen vast dat de Gal gedeeltlyk door den *ductus hepaticus*, gedeeltlyk ook door verscheide zeer kleine *ductuli biliarii* uit de Lever onmidlyk in de blaas uitloopende, welke schuins tusfchen haar vliezen eindigen, in dezelve gestort wordt.

*Aanmerking.*

WANT vooreerst zo men voorzichtig deeze *capsula* of *cystis fellea* van het *parenchyma* der *hepar* separeert, dan ziet men dat dat gedeelte, 't welk dieper in de *hepar* geïnsereerd werdt, zeer vochtig is, uit het welk men met de vingers *Mucosa* en geel gal en bitter vocht kan drukken, dergelyk men met het oog in dat gedeelte van de *hepar*, dat aan de *fundus vesicæ* zeer vastgehegt is, bemerken kan; hierom is 'er geen twyfel, of 'er gaan zeer fyne en meenigvuldige *ductus* uit de *hepar*, en worden in alle de *membranæ cystidis*, die in den *fundus*, leggen, ingeplant.

TEN tweeden, wanneer men in een hond de *bilis* uit de *vesica* perst, en de *ductus cysticus* toebindt, dan vloeit 'er nog veel gal in de blaas; vervolgens bevindt men, wanneer  
men



men de *ductus choledochus* opblaast, dat dan zo wel de *capsula* als de *ductus hepaticus* met lucht opgevuld wordt; of ook wanneer men de *ductus hepaticus* met wind opvult, dat dan dezelve voort gaat in de *cystis* en *ductus choledochus*, zodat de *communicatie* tusfchen den *ductus hepaticus* en *cysticus* klaar blykt. Doch zo wy nu eens overweegen, dat de *fundus vesicæ* en de *ductus hepaticus*, beneffens het *collum* van de *cystis* hooger leggen, zo is het zeer waarfchynlyk, dat 'er een groot gedeelte van de *bilis* uit de *ductus hepaticus* in de *vesica* vloeit, uit het welke zy naderhand, wanneer zy door de met fpyzen opgevult zynde *ventriculus*, of wel door deszelfs eigene *motus peristalticus* in het eerfte *intestinum* uitgeperst wordt.

Satura-  
tior.

DIT is aanmerkelyk, dat de gal in de *cystis fellea* dikker, zwaarder en bitterder is als die, welke onmiddelyk uit de Lever door de *ductus hepatici* in het *duodenum* vloeit, nadien dezelve dunder, vloeibaarder, en niet zo bitter is: zonder twyfel is de reden van dit *Phænomenon* deeze, dat het dunner en waterachtiger gedeelte van de *bilis* door de *vasa lymphatica* van de *vesica* afgefcheiden wordt, overmids laatere Ontleedkundige erkennen, dat 'er zeer veele *vasa lymphatica* in dezelve gevonden worden; en dat de gal zelfs door de *membranæ vesicæ* doorzygen kan, kan men hier uit opmaaken, omdat een gedeelte van 't *colon*, 't welk tegen deeze blaas legt, meestentyds met een

Transu-  
dare.

gee-

geele kleur van de doorzygende gal ge-  
verwd is.

§. CCCLXXXI. NAUWKEURIGE en latere  
Ontleedkundige hebben aangetekend, dat de  
hals der *vesica biliaria* uit een vezel-zenuw-  
achtige ring, en als 't ware uit *valvulae semiluna-*  
*res* bestaat: zie *M. N. C. C. Cent. V. en VI.*;  
welke klapvliezige en gedraaide weg te weeg *Valvulo-*  
brengt, dat de loop der gal naar *het twaalf vin* <sup>*sa.*</sup>  
*gerig gedarmte* bevorderd werdt, omdat na <sup>*Tortuosa.*</sup>  
*mentlyk* de bodem van de blaas afhellende <sup>*Duode-*</sup>  
loopt, en dit vocht anderzins zeer gemak-  
lyk naar de holte van de *vesica* terug zoude  
komen.

*Aanmerking.*

IN menschen-lyken hebben BAUHINUS en  
SPIGELIUS gevonden, dat de *ductus cysticus*  
*semilunaris* op de wyze van eene *cochlea* gemaakt  
en met veele ruwigheeden bezet is; welke  
engte veroorzaakt, dat de dikkere gal eens  
uit de *cystis* gevloeid zynde, niet gemaklyk  
wederom in dezelve zoude kunnen terug ko-  
men, door welke echter de *bilis hepatica* ge-  
maklyker loopt.

§. CCCLXXXII. DE *insertie* van den *ductus*  
*choledochus* in de buitenste en binnenste rok-  
ken van het *duodenum*, verdient ook haare op-  
merking, welke *insertie* zich zelfs tot eenige  
duimen uitstrekt, en eindelyk opent zich dee-  
ONTLEEDK. *Verz. I. verv. XVII.* G ze



Sphin-  
æer.

ze *ductus*, die ook met een ronde vezelachtige ring of *sluit-spier* voorzien is, in de holte van het *duodenum*.

*Aanmerking.*

DEEZE schuinse *insertie* van de *ductus* tus-  
schen de vliezen van het *duodenum* is oorzaak,  
waarom de gal, wanneer dit *intestinum* door  
een *spasmus* aangedaan, of met *flatus* al te zeer uit-  
gezet wordt, gemaklyk te rug kan komen  
door de *ductus choledochus* in de *ductus hepaticus*,  
en zelfs haar neerdaling naar beneden ge-  
heel belet wordt, en om die reden een *icteri-*  
*tia* zoude kunnen veroorzaaken. Dit is ook de  
reden, waarom men in gramfchap omtrent het  
*scrobiculum cordis* aan de rechter zyde, daar de  
*pylorus* en *duodenum* begint, een zekere famen-  
drukkende pyn gevoelt.

§. CCCLXXXIII. DE *ductus hepaticus* en ook  
de *cysticus*, benevens de *choledochus* zyn uit  
zeer vaste spier-zenuuwachtige rokken famen-  
gesteld, en by gevolg met een uitgeleeze ge-  
voel voorzien, nadien volgens de aantekening  
van VIEUSSENS in *Neurol.* p. 326. uit de *ner-*  
*vus intercostalis* met de *plexus hepaticus similuna-*  
*ris* zes vezels spruiten, welkers drie onderste  
en kleinste in de *vesicula fellea*, in de rokken van  
de *ductus choledochus*, *pylorus*, en in het *duodenum*  
ingeplant worden; en te weeg brengen, dat  
deeze deelen hun *tonus*, gevoel en *sterkte* groo-  
ter worden.

*Aan-*

*Aanmerking.*

WEGENS de fyndere gevoeligheid deezer *ductus*, komt die groote en verwoede pyn, welke uit het stilstaan of liever inhangen van een galsteen in deeze *ductus*, of *cysticus* of *choledochus* ontstaat, en dit is ook verder de reden waarom de *cystis fellea* door een grooter steen al te zeer uitgezet zwaare *spasmodique* toevallen, als ook pynen in de rechter zy, hette, benaauwdheeden en braakingen verwekt, gelyk de Waarneemingen in de Praktyk dit bevestigen.

§. CCCLXXXIV. WAT de nutheid der gal aanbelangt, welke daagelyks in dit groote en wyd uitgestrekte *viscus* in een groote menigte afgescheiden wordt, dezelve is uitstekend genoeg; want schoon de gal ten aanzien van deszelfs menging en *ingredienten*, uit welke zy bestaat, een vocht is, dat niet zo zeer met de vloeistoffen en vaste deelen onzes lichaams overeenkomt, maar liever onovereenkomstig is, en waarom het een *vuiligheid* genoemd werdt; niet te min echter is het zelve van 't grootste nut om de chyl making, *digestio* en stoelgang te bevorderen, en zelfs zo groot, dat geen dier gezond en fris zonder gal kan zyn.

*Aanmerking.*

DE Ontleedkundige Geneesheeren zyn gewoon om verscheidene reden vasttestellen,



dat de gal een uitstekend groot nut heeft, om de gezondheid in de dieren te bewaaren; 1) omdat in de waereld geen één dier te vinden is, dat geen gal in zich heeft; 2) omdat het niet naar het *intestinum rectum*, maar naar het *duodenum*, 't welk het eerst van den *ventriculus* komt, gevoerd wordt; 't geen een klaar bewys is, dat het daar eene byzondere nuttigheid moet doen: 3) omdat dat wyd uitgestrekte *viscus* der *hepar*, 't geen in geen één dier ontbreekt, byna van geen ander gebruik is, dan om de gal af te scheiden: 4) omdat 'er dagelyks een groote kwantiteit van dit vocht in de Lever afgescheiden, en naar het *duodenum* gebragt wordt: 5) omdat de gal door een dubbelde buis, *cysticus* en *hepaticus*, naar het *duodenum* gevoerd wordt, en 't geen nog 't grootste is, omdat het in een byzondere *ontfanger*, namentlyk de *vesicula* bewaard wordt, zo 'er misfchien ten opzichte van de kwantiteit van de vocht in de scheiplaats der Lever ontbreekt of van natuur veraardt.

Recepta-  
culum.

§. CCCLXXXV. MEN kan wel zo nauwkeurig niet bepaalen, hoe veel gal 'er daagelyks in de Lever afgescheiden wordt, doch echter kan men het meer of min uit sommige proefneemingen gissen en opmaaken.

*Aanmerking.*

DE gal-buizen, namentlyk de *hepaticus* en *cysticus*, die groot genoeg zyn en samen de aanmer-

mer-

merkelyke *ductus choledochus* maaken, toonen duidelyk aan, dat 'er geen kleine, maar zelfs een groote kwantiteit gal naar de *masa* der *chyl* vloeit.

§. CCCLXXXVI. DE hooger en zwaarder geele kleur der drek, door den stoeigang geloost, welke van de gal ontstaat, toont ook duidelyk derzelve groote hoeveelheid aan: vervolgens kan men door deeze volgende proef duidelyk bevestigen, dat de *canales biliarii* veel oncen van dit vocht inhouden; namentlyk wanneer men uit de *ductus chyliferi* en de *cystis fellea* van een gezond mensch, en die een geweldige dood gestorven is, door een herhaalde opspuiting met laauw water, dat eerst nauwkeurig gewoogen is, de gal reinigt en uitwascht, en men daarna dan dat water met de gal vermengd wederom weegt, dan zal men gemaklyk kunnen ontdekken, hoeveel gal 'er in de geheele Lever zit: dus heeft BIANCHI zes oncen gal gevonden.

§. CCCLXXXVII. HET galachtig vocht bestaat uit twee *hoofdstoffen*, namentlyk, 1) uit *Elementen* een taay slymig onsmakelyk, en 2) uit een *ta.*  
*hars-szwavel en alcalis principium.*

DE harsachtige eigenschap der gal kent *Resino-*  
men daaruit, omdat de verdikte gal sterk vlam *sum, sul-*  
vat, en door behulp van brandewyn haare *phureum*  
*alcali-*  
*num.* slymigheid achtergelaten hebbende smelt, en gedistilleerd zynde een stinkende *brandende* *Inflam-*  
olie geeft. *mabile.*



## Aanmerking.

THANS blykt de reden, waarom menſchen, die warm bloed bezitten, en in 't gemeen *Cholerici*. galachtige genoemd worden, wanneer zy het lichaam ſterk beweegen en heete zwavelachtige ſpyzen nuttigen en ſterke dranken drinken, meer en warmer zwalverachtige gal krygen.

§. CCCLXXXVIII. HET *principium reſinoſum* der gal verſchilt veel van de harſen, die uit het *regnum vegetabile* ontleend worden, omdat *Acidum*. die met een zuur vermengd zyn; doch dit heeft geen plaats in deeze harsachtigheid van de gal, alzo het meer met een *altali*-zout vermengd is. Daarenboven ſmelten de harſen der *vegetabilia* in geen ander dan *geeſtig Schei-* vocht, maar nooit in water; doch de verdikte *Men-* gal ſmelt niet alleen in de *beste overgehaulde* *Spiritus* brandewyn, maar ook in water.

§. CCCLXXXIX. DE gal heeft een groote *Elementum ſali-* overvloed van een zuiver zoutige *hoofſtof*, 't welk daaruit ook blykt, omdat het met *stroop* van *violen* vermengd zynde een groene kleur *Syrupus* krygt, en door een *ſterk zuur*, gelyk de *olie* van *vitriool*, en het *ſterk water* zyn, *opborrelt*, en eindelyk omdat het *gediſtilleerd* zynde een *ſpi-* *ritus alcalinus* geeft. Ten laaſten wordt deſzelfs *zeepachtige* en *alcaliſe* kracht door haare af- *veegende* en de *ſlymige vette zelfſtandheid* ſmel-

ten-

tende en reinigende of *afwischende* kracht klaar *Abster-*  
beweezen. *gens.*

§. CCCXC. TEN opzichten van deszelfs  
bars- en zwavelachtig zeer smeltend en zuiver *Risino-*  
zoutachtig principium, strekt de gal tot het *sum sul-*  
beste en voor veele ziekten bekwaam *phureum*  
houdend geneesmiddel in het dierlyk lichaam; *solubile*  
*& alcali-*  
daarenboven begunstigt zy zeer de *chylicatio*, *Midici-*  
*digestie* en ook de *secretio chyli* en *excretio sor-*  
*dium*, en niet minder houdt zy de *peristaltische* be-  
weeging der ingewanden in order, gezond en  
fris. *na preser-*  
*vatoria.*

*Aanmerking.*

DE nuttigheid der gal, welke zy in de  
*primæ viæ* doet, wegens deszelfs *principium*  
*sulphureum alcalinum*, waarmede zy voorzien  
is, is zeer groot: 1) verdeelt zy schielyk  
de vette deelen der voedzelen, welke door  
het zuur van de maag niet gedissolveerd worden,  
gelyk een eenvoudig *Scheivocht* in het *duodenum* *Homoge-*  
en de daar aan vastzittende *intestina*: 2) *neum*  
matig en verbryzelt zy de zuure of scherpe *Men-*  
*struum*.  
chyl, die uit den boezem der maag komt, en  
verandert hetzelfde in een onsmakelyke na-  
tuur; 3) reinigt zy de *ruuwe korst*, welke *Crusta*  
een doorzygtuig en vouwen maakt, en opent *villosa*.  
de mondjes der melkvaten, opdat de chyl in *Colato-*  
zyn loop en voortgang door de *vasa lac-* *Orificia.*  
tea niet belet worde. 4) Prikkelt en hist zy



de zenuuwachtige vliezen der *intestina* aan, opdat de *motus peristalticus* zoude bevorderd en vermeerderd worden, door welkers behulp de afscheiding der *chylus* en stoelgang het best volbragt wordt.

§. CCCXCI. DAT de gal, die ten aanzien van haare kwantiteit, loop, en plaats wel gesteld en gematigd zynde, als het heilzaamst geneesmiddel voor de menschen is, blykt ook

*Affectio- nes chro- nicæ.* daaruit, omdat tegen de *langdurige ziekten*, opproppingen in de ingewanden, verminderde  
*Secretio- nes.* afscheidingen en uitloozingen, ingewand-ziekten, gelyk *diarrhæa*, *colica*, *flatulentiae* of *alvi con-*  
*Excretio- nes.* *strictiones nimiae*, dat soort van geneesmidde-  
*Defectus.* len, welke het gebrek der gal vervullen, en een gelyksoortige natuur, vermenging en kracht met dezelve bezitten, gelyk de bittere middelen, zeer bekwaam zyn om deeze ongemakken voor te komen.

### Ziektekundige Beschouwing.

§. CCCXCII. 't GETAL der ziekten, die uit de gal door een gebrek of in de *hoeveelheid* of *hoedanigheid* of in derzelve aard, of beweging voortkomen, is zeer groot.

*Tempe- ries.*

### Aanmerking.

*Cholera.*  
*Diar-*  
*rhæa.*

WANT daaruit ontstaat het *bort*, *buikloopen*,

pen, roodeloopen, maag-pynen, gal-koortsen, an-Dysente-  
derendaagse koortsen, geduurige braakingen, co-<sup>riae.</sup>  
lyken, buïksnydingen, levervloeden, geele en zwar-<sup>Cardial-</sup>  
te geelzugt, en zwaare *symptomata* uit een steen<sup>gie.</sup>  
in de gal-blaas, pynen in het rechter *hypochon-*<sup>Febres</sup>  
*drium* met koorts en *bik*, waaruit ook *cachexia*,<sup>biliosae.</sup>  
*hydrops*, en bedorvenheid in de chyl ontstaan.<sup>Tertia-</sup>

§. CCCXCIII. EN wanneer al te veel en<sup>Ventris</sup>  
scherpe gal in het *duodenum* blyft stil staan, en<sup>tormina.</sup>  
daarby een groote meenigte bedorve voedsel<sup>Fluxus</sup>  
komt, voornamentlyk van gistende zuure<sup>hepatici.</sup>  
dingen, dan wordt 'er een zo overtollige groo-<sup>Icteria.</sup>  
te menigte te weeg gebragt, dat 'er, doordien  
de *tunicæ* geprikkeld en geerodeerd worden,  
*dysenteriae cholerae*, somtyds verzeld gaande  
met een *ontsteking* deezer deelen, uit voortko-<sup>Singul-</sup>  
men.<sup>tus.</sup>

§. CCCXCIV. Zo de scherpte der gal zo  
scherpbytende is, dan ontstaan 'er *diarrhoeæ*,<sup>Corrosi-</sup>  
welke zeer gemeen zyn aan die geen, die ligt<sup>va.</sup>  
toornig worden.

§. CCCXCV. UIT de door gramschap uit-  
gestorte en voornamentlyk scherpe en onge-  
temperde gal in het *duodenum*, komen dikwyls  
*cardialgiæ* voort, wanneer de onderste ope-  
ning van den *ventriculus* aangedaan wordt; daar  
uit ontstaan de gevaarlykste ontstekingen in  
het *duodenum* en de maag, vooral, wanneer  
iemand volgens de gemeene mode *braakmidde-*  
*len* na een gramschap inneemt, om de gal te<sup>Emotica.</sup>  
ontlasten



§. CCCXCVI. WANNEER de gal een weinig overvloediger en buiten gewoonte fcherp zynde, de *tunicæ* van het *duodenum*, tusfchen welke zy haar loop heeft, aanraakt, dan wordt een gedeelte van de *ductus choledochus*, ja zelfs de geheele *ductus* met *spasmus* aengedaan en faamen gedrukt, en dan komt de gal, doordien haar loop en beweeging naar de *intestina* belet is, te rug door de *vafa lymphatica*, naar de bloedvaten, en dus komt 'er fchielyk een *cachexia ifteritia* uit voort.

*Aanmerking.*

*Icterus.* DERGELYKE fchielyke *geelzugt* wordt niet zelden in een *cardialgia* veroorzaakt, in *alle-daagfe*, *anderedaagfe* en *gal-koortfen*, door het ingeeven van een *purgans* of ook *venynen*, omdat dit de aard en eigenschap van deeze dingen is, dat zy den *ventriculus* een *spasmus* aanbren-  
*Febres continuæ, tertianæ & biliofa.* gen. Zo 'er een zuur vocht bykomt, en met de gal vermengd wordt, dan gefchiedt 'er eene zeer warme *opbruizing*, en 'er klimmen zeer warme dampen op, dewelke tot den *ventriculus* en *æfophagus* gebragt zynde, een zeer groote hette doen gevoelen, en dus wordt het zuur of hette in de maag veroorzaakt.  
*Ebullitio.*  
*Soda.*

*Defectus.* §. CCCXCVII. U I T het *gebrek* aan gal, welke uit de verminderde affcheiding van dezelve, en uit gebrek van zwavelachtige deelen in het bloed voortkomt, ontftaan veel *morbi chro-*

*chronici*, voornamentlyk *cachexia*, *leucophlegmatia*, *scorbutus viscerum*, *infarctus*, *obstructio*, en daaruit *hydrops*.

*Aanmerking.*

WANT zo de gal in de *intestina* ontbreekt, dan komen 'er veele zuur en slymagtige rauwigheeden, welke in de bloedvaten overgebragt zynde, gelegendheid geeven tot *obstructiones*, *infarctus*, *concretiones polyposæ* & *calculosæ*, wegens de traagheid en stolling, die zy in de vloeistoffen te weeg brengen.

§. CCCXCVIII. UIT gebrek en traagheid der gal, komt ook de traage afgang en hardlyvigheid, omdat de gal een natuurlyk *laxans* is, 't geen de darmen prikkelt, om de loozing door den stoelgang schielyker te doen geschieden, en zy verandert het zuur der voedzelen, 't geen een samentrekkende kracht heeft, voornamentlyk met aardachtige deelen vermengd zynde, in een slap zout, en onschadelyk prikkelend middel; want by de beoeffenaars der Geneeskunst is de proefneming bekend, dat de *salia neutra* van een uitstekend gebruik zyn om de stoelgang te bevorderen.

§. CCCXCIX. DE ontbreekende gal is oorzaak, dat 'er wormen groeijen, voornamentlyk in *phlegmatici*, kinderen, en die genen welke dikwyls zoete en zuuragtige vruchten, melk *Fructus horrei.* en meelagtige dingen eeten.

*Aan-*



## Aanmerking.

*Tempe-ries.* DE aard en menging der gal wordt bedorven, wanneer de *drek*, welke door andere *Sordes excrementitiæ.* *emunctoria* geloost moet worden, met de gal vermengd wordt; en dit geschiedt meestentyds, *Perspiratio.* wanneer de *doorwaasfening* belet en de pisafscheiding verminderd is, of ook wanneer de fappen van het lichaam door een zekere ziekte, gelyk *scorbutus*, *lues venerea* en *febres*, zeer vervuild en onrein geworden zyn, waardoor geschiedt, dat men de gal in de *cystis fellea* dikwyls groen, zwart, inktachtig, *preiagtig* en blauwagtig vindt, of ook wanneer 'er eene te groote kwantiteit water-en wey-deelen plaats heeft, gelyk gewoonlyk in *cachectici* en *hydropici* geschiedt, wit, onsmakelyk, wateragtig en slymig wordt: doch zeer dikwyls verandert ook de natuurlyke gal haar kleur door de dingen, die in de darmen hangen, zo zy buiten gewoonte met een *pontise fcherpheid* begaaft zyn: dan krygt immers de gal een blauwagtige kleur, welke ook gewoonlyk tot den *drek* overgaat, voornamentlyk in de lichaamen der kinderen, wegens de snydingen, die de *corrosive* gal in deeze kleine voorwerpen veroorzaakt, en gelyk meestentyds geschiedt, *Convulsiones epilepticae.* een voorlooper is van *vallende ziekten*.  
 §. CCCC. De gal kan door beweeging, gebrek, en hoedanigheid, dat is, *aard zondigen*, wegens de

de door de belette doorwaasfeming te rug gehoudene zout- zwavelige deelen binnen in het lichaam; want deeze gaan naar de gal, en maaken dezelve *corrosif*, zodat zy den aard van vergift krygen.

§. CCCCI. DE meefte van de *epidimicque* ziek- tens, voornamentlyk *febres*, *dolores*, *spasmi* en *alvi defectiones* komen van de bedorven ongetemperde en fcherp gewordene gal voort, wegens de belette afscheiding en uitloozing.

*Aanmerking.*

WANNEER wy de voortteeling van de *morbi epidemici* befchouwen, welke gewoonlyk in de zomer ontftaan, gelyk de gal-, heete, aanhou- *Febres* dende, anderendaagfe en derderdaagfe koortfen, in *biliosæ* de herfst *diarrhoæ*, *dysenteria*, verzeld met *Arden- tes.* snydingen in den buik, welke langer duuren. *Tertianæ* de kwaadaartiger worden, voornamentlyk *continuæ.* voor zo ver het de koortfen aanbelangt, dee- *Intermit- tentes.*

ze zelfs worden van de ongefchikte en meest van de ongelyke gefteltenis der tyden, of zo het een jaargety in 't andere verandert, by voorbeeld, de winter in herfst, de herfst in winter, de lente in zomer, de zomer in herfst, en zo vervolgens, of wanneer 'er op zekere dagen een groote hette heerscht, waarop eenige dagen lang een al te groote vochtigheid, een zeer betrokken of regenag- tige lucht volgt, of ook wanneer 'er een groo-



te hette plaats heeft op of na den middag, en naderhant 'er een natte en koude nagt volgt, of wanneer op eenen dag, gelyk meermaalen in den herfst geschiedt, het weer fchielyk verandert, zodat dan koude, dan hette, dan regen, dan klaar, dan betrokken weer is, zo wordt de doorwaasfeming, welke de gezondste en heilzaamste van alle *excretiones* is, zeer verminderd, en de *tonus* van het *vel* zelfs, 't welk een algemeen *emunctorium* van het lichaam is, wordt in dergelyke gesteltenis van tyden zeer ontrust en bedorven, en hieruit komen verscheide stoffen, en *excrementitiæ* in het bloed, welke naderhant naar de vochten en van daar naar de gal overgevoerd zynde, de *grasfeerende* ziekten voortbrengen.

§. CCCCII. DES GELYKS komen ook ziekten voort, wanneer de afgescheidene gal naar andere *organa secretorea* overgebracht wordt; dus gebeurt het zeer dikwyls, dat het galagtig vocht, wanneer deszelfs afscheiding in de Lever belet wordt, overgevoerd en afgescheiden wordt door *spogklieren*, ook door de *zeef* van de pis, namentlyk de nieren, en vervolgens door de *pori* en buisjes, die onder de huid liggen.

*Glandulae salivales.*  
*Cribrum.*

### *Aanmerking.*

WANNEER het naar de spogklieren van den mond gevoerd wordt, dan hangt hier af

af de bedorve bittere smaak der spyzen , 't welk niet zelden in die geenen voorvalt, die daaraan uit een anderendaagse of ook uit een gal-koorts onderhevig zyn , en gemeenlyk te onregt toegeschreeven wordt aan de galagtige dampen, die uit de maag opvliegen. De pis van menschen, die aan geelzucht onderhevig zyn, bevestigt, dat de uitvloeiende gal tegelyk met de pis geloost wordt, welke van een zwaare bruine uit den geelen kleur is, en het linnen als de gal verfd: doch dat door *tubuli subcutanei* het galagtig vocht in een *cachexia icteritia* afgescheiden wordt, toont de geele kleur, ja zelfs veroorzaaken in sommige deelen, de door de *pori* van de huid doorzweetende dikkere gal-deeltjes, die geele vlakken, welke het aangezicht verleeleken, welke niet onbekwaamlyk *hepaticæ* genoemd worden, omdat zy door de belette afscheiding der gal in de Lever ontstaan. Vervolgens is ook aan Chirygyns en Doctoren bekend, dat uit de zweeren en wonden der deelen niet zelden een geele en eenigzins bittere etter vloeit.

### *Heelkundige Beschouwing.*

§. CCCCI. DAT de kwetzuuren van de *vesica fellea* niet alleenlyk, maar ook de zwaarer kwetzuuren van den *ductus*, welke de gal voeren, ten eenenmaal doodlyk te agten zyn, be-



bevestigen ook op het sterkste, de *M. N. C. Dec. II. Anno X. obs. 160.* alhoewel de dood niet schielyk op deeze kwetzuuren volgt, maar eindelyk by vervolg van tyd: het galagtig vocht namentlyk in de holte van het *abdomen* gevoerd, verrot, en besmet door haare verrotting de naast aangelegene deelen voornamentlyk zenuwachtige en de *tunicæ* der darmen, en dus ontstaat 'er een *rotkoorts*; *Febris putrida.* maar op de kwetzuuren van de *ductus biliarii*, voornamentlyk der *choledochus*, volgt mees- tentyds een *inflammatie* met een doodlyke koorts, en daarom brengen zy in korten tyd, of den lyderen om, of zo de dood langer uitgerekt wordt, dan gaat 'er een langzamer rotkoorts voor, welke uit de bederving der deelen ontstaan is.

*Ruptio.* §. CCCCIV. DE *opberfing* ook van de *cystis fellea*, welke of door deszelfs al te *Turges-* groote opzwellling wegens de meenigvuldige en *centia.* groote toevloed der gal, of door een geweldige *vomit*us veroorzaakt wordt, moet ook doodlyk erkend worden, waarvan BIERLINGIUS *obs. Lib. X. C. I.* en ook Faber in *additam. ad M. N. C. Dec. II. Ann. IIX. p. 466.* een dergelyk voorbeeld aanhaalen.

# XV. HOOFDSTUK.

## VAN DE NIEREN.

§. CCCC.V. **D**E Nieren zyn twee ingewan-<sup>Renes.</sup> den, de gedaante van boonen hebbende, vyf of zes vinger breed lang, drie breed, en één dik, in de rechter en linker zyde, omtrent de *lendenen* gelegen, <sup>Lumbi.</sup> en door de natuur uit verscheide soort van vaten samengesteld, om het zoute *serum* van het bloed af te scheiden, en door te doen zygen.

§. CCCC.VI. DE Nieren zyn onder het *middenrif* gelegen, onder de onderste *valsche* <sup>Dia-</sup> *ribben*, omtrent het eerste *welvelbeen* der *lende-* <sup>phragma.</sup> *nen*, en zyn aan den *penszak* door vezelen vast- <sup>Costæ</sup> *gehecht*, en worden van buiten met de *dwar-* <sup>spuriæ.</sup> *se spier* overdekt; aan de binnekant is hun de *musculus psoas* digte bygevoegd, en worden <sup>Perito-</sup> *vereenigt* met de *nier-klieren* en *nier-vaten*. <sup>naum.</sup> <sup>Muscu-</sup> <sup>lus trans-</sup> <sup>versalis.</sup> <sup>Renes</sup> <sup>succen-</sup> <sup>turiati.</sup> <sup>Vasa</sup> <sup>emulgen-</sup> <sup>tia.</sup>

### Aanmerking.

't Is aanmerkelyk, dat de rechter nier meestentyds laager legt als de linker, (\*) zonder

(\*) Dikwyls heeft ook het tegendeel plaats, gelyk men by EUSTACHIUS, zo wel in zyne *opuscula* als in zyn Tafelen zien kan.



der twyfel, opdat de *bepar* een gemaklyker legging en plaatszing zoude hebben.

§. CCCCVII. DE legging en famenhegting deezer deelen, namentlyk der Nieren, is zodanig, dat derzelver werking, te weeten de *Secretio* *afscheiding* en *uitloozing*, eenigzins door de *Excretio* weeging der naast gelegene deelen bevorderd zou kunnen worden.

*Aanmerking.*

WANT 'er is geen twyfel, of die geduuri-ge beweeging van het *diaphragma* in de in- en uitademing, wanneer het dan opklimt, en dan weer naar beneden drukt, en van de onder aan gehegte en 'er aan vast zittende deelen, bevordert zeer de werking van de lever, milt, maag, en zelfs die der Nieren, dewyl zyne drukking en geduurige beweeging zeer veel tot de terugkomst van 't bloed door de vaten, en de afscheiding der vochten helpt.

§. CCCCVIII. DE Nieren zyn ook vereenigd en faamgehegd aan het *intestinum colon*, 't welk aan de rechterzyde over de nier heen loopt; *Flexura.* doch de *bocht* van dit gedarmte in de linkerzyde geschiedt digte by de Nier.

*Aanmerking.*

HIERUIT kan men reets in de Ziektekundige Beschouwing de reden op maaken, waarom  
men

men de *pyn in het colon* dikwyls voor *graveel* *Dolor co-*  
 aanziet, en de *dolor nephriticus* met een *colicus* *licus.*  
 vermengt; dus ook waarom een ontsteking in *Nephri-*  
 dit *intestinum* de *pyn* door een *steen* veroor- *Calculus;*  
 zaakt vermeerdert, en zelfs uitbreidt, voorna-  
 mentlyk in het linker gedeelte: verders kan  
 men hieruit de reden ook opmaaken, waarom  
 zeer dikwyls een onmenschlyke *pyn* door  
 een *calculus* veroorzaakt wordende, den gehee-  
 len omtrek der ingewanden mede aandoet, 't  
 welk meestentyds geschiedt, wanneer de *steen*  
 uit de Nieren bewoogen begint te worden, en  
 door de *pisvoerders* een uitgang zoekt. *Urete-*

§. CCCCIX. DE Nieren leggen tusfchen de *res.*  
*verdubbeling* van den *penszak*, welk bekleedzel *Duplica-*  
 zeer vet en met byzondere vaten voorzien *tura.*  
 zynde, aande lendenen, en derzelver wervel  
 beenderen vastgehegt is.

*Aanmerking.*

HIER ter plaatze moet men aanmerken,  
 dat niet alleen de Nieren, maar ook de *pis-Urete-*  
*voerders* en de *pisblaas* zelfs, en dat dus het *res.*  
 geheele toefstel der *viscera* en *ductus*, die de *Vesica*  
*urinaris*, onder de verdubbeling van het  
 penszaks-vlies verborgen legt, en in het zelve  
 beslooten is, zodat wanneer men 'er een  
 pypje in steekt, en met wind opblaast, de  
 verdubbeling van het *peritonæum* in alle zyne



deelen zeer gemaklyk voor 't gezicht zich opdoed.

§. CCCCX. HET famenftel der Nieren en ander *doorzygtuigen*, beftaat enkel uit vaten, nadien zy geheel faamgefteld zyn uit *arteriæ* en *venæ emulgentes*, en eindelyk uit zeer menigvuldige vliesagtige kanaalen, die de pis afcheiden en weg voeren.

*Aanmerking.*

BEIDE de Nieren ontfangen van de *aorta descendens* een tak, welke naderhant wederom in andere veele kleinere takken overgaan, en eindelyk in de allerkleinſte gekromde takjes, die het gezicht ontfnappen, welke door de geheele zelfftandigheid der Nieren verdeeld worden, en door over en weder by elkander famen te komen, in een ontfanger uitloopen, uit welke laafte naderhand de kleindere terug komende *venæ* en ook de kleinſte zy-kanaalen, die de van het Slag-aderlyke bloed afgefcheidene pis ontfangen, voortſpruiten.

OVER deeze *vasculosa ſtructura* der Nieren kan men RUYSCH naleezen in zyn *Theſ. Anat.* welke de netſte afbeeldingen gemaakt heeft van de *vaſa renalia*, die met rood vocht opgeſpooten zyn, en zig dus voor 't gezicht klaar opdoen.

§. CCCCXI.

§. CCCCXI. DE *pispypjes* in de Nieren, *Fistulae* wanneer zy vereenigd zyn, maaken *peersgewy-urinosa*. ze veel *boekige* lichaamen, en eindigen eindelyk *Pyrami-* meestentyds in twaalf vliesachtige lichaamen, *dalia*. welke *tepeltjes* genoemd worden: in deeze ko-*Polygo-* men *schuins* en van alle kanten veele by een *na*. verzamelde openingen der *pisvoerende pypjes*, *Fistulae* zo wel van binnen als van buiten, en uit de *urinife-* *ræ*. *fistulae uriniferæ* druppelt het *serum urinosum* in een groote vliesachtige holte, 't welk met den naam van *Bekken* genoemd wordt. *Pelvis*.

*Aanmerking.*

DIT maakfel en samenstel der Nieren heeft EUSTACHIUS het eerst van allen, en daarna BELLINUS wel afgetekend.

§. CCCCXII. DE elf of twaalf vliesachtige kanaalen, uit den omtrek der *papillæ* voortkomende, en de uitzypelende pis opvangende, loopen in drie groote takken, welke by een verzameld in een groot *bekken*, 't welk ver-*Pelvis*. der voort gaat, en in een vlies-zenuw-spierachtig sterk kanaal, en met verscheide vaten en zenuwen voorzien, eindigt, 't welk *pisvoer-* *Ureter*. der genaamd wordt, en 't welk de pis naar de *pisblaas* zelfs voert.

§. CCCCXIII. UIT het *pelvis*, 't welk de *rinaria*. *boezem* of *inham* van de *pisvoerder* is, loopt *Infundi-* deeze in de *rug* eerst naar beneden in een ge-*bulum*. lyke rechte weg, doch daarna geboogen tus-*Dorsum*.



fchen de verdubbeling van het *peritonæum*, en wordt in het agterfte gedeelte van de *vesica*, 't geen op verfcheide plaatfen een ongelyke vlakke heeft, op een afstand van byna drie  
*Cervix.* vingeren van den onderfte *bals geinfereerd*, en  
*Tunica.* de buitenfte rok doorgeboord hebbende, loopt zy ter wydte van een pink fchuins tusfchen deeze en de binnenfte rok, en opent zich zelfs in de holte van de blaas, zekerlyk tot geen ander einde, als om daar te beletten, dat de pis niet weder terugkomt naar den pisvoerder.

§. CCCCXIV. D E pisvoerders zyn kanaalen, die uit verfcheide rokken bestaan, namentlyk uit den buitenfte, van het *peritonæum* voortkomende, en een *fpiers*- en *zenuwachtig* vlies, *Musculo-fanervea.* van binnen met een klierachtig bekleedzel overdekt, en ook met zenuwtakjes, dië uit de *plexus renalis* voortspruiten, en *Vafa ve-nofa.* *aderen* voorzien zynde; waarom de pis niet alleen door derzelver zwaarte en gewigt naar beneden in de *vesica* loopt, maar ook door de over en weer gaande famentrekkende en verwyderende beweeging deezer kanaalen, welke gemakkelyk *psristalticq* genoemd kan werden, daarnatoe gevoerd wordt; doch deeze kanaalen zyn niet te vergeefs door de natuur zo lang gemaakt; wyl het, namentlyk uit de *werktuigkunde*, bekend is, dat de drukking der vloeistoffen het grootfte is volgens de *cylindricque* hoogte, en dat door een kanaal van vier voeten,

ten, 't welke een *middelyn* van een duim in *Diameter* zyne breedte heeft, met water opgevuld<sup>ter</sup> zynde, en omtrent drie ponden water in zich bevat, twintig pond waters in de hoogte kan opgeheeven worden; derhalven belet de weerstand van de pis in dit kanaal, namentlyk de *Ureter*, dat de pis niet gemaklyk uit het *cavum vesicæ* in de *Ureter* kan opklimmen.

§. CCCCXV. DAT de *uretheres* zeer gevoelig zyn, blykt, wanneer 'er een *steen* in de *Calculus* zelve zit, welke of de *zenuuw-rokken* prikkelen. *Tunicæ nervæ*. de door haare ongelykheid, of door haare grootte dezelve te veel uitzettende, wreede pynen veroorzaakt.

§. CCCCXVI. DE Nieren hebben geen ander gebruik, dan dat zy de pis doorzygen; omdat zy niets anders dan *zeeven* en *doorzygende* *Cribra*, *werktuigen* van zoute wye zyn, 't welk onder *Colatoria*. den naam van pis voorkomt; dewyl immers het *Serum* bloed, door de kracht van 't hart door de *falsum*. *pis-Slag-aderen* voortgedreeven wordt in de *Arteriæ* zelfstandigheid der Nieren, die alleen uit *emulgentes*. *tes*. ten bestaat, zo wordthet dunner waterachtiger en zoute gedeelte door de pisbuisjes, die een kleindere middelyn hebben, in de uiteindens der *Slag-aderen* van het bloed afgescheiden, *Arteriæ*. en vloeit na het achterlaten van het dikker bloed terug, 't welk door de *aderen*, die een *Venæ*. grooter *diameter* hebben, naar het ander bloed gevoerd wordt.



*Aanmerking.**Tubuli  
arteriosi.*

DAT 'er een doorgang uit de *Slag-aderlyke pypjes* in de *pis-pypjes* der Nieren, en uit deez in het bekken zelfs en *uretheres* plaats heeft, kan men ook uit deeze eene proef zeer gemaklyk opmaaken, waardoor men de *venæ emulgentes* eerst toegebonden hebbende met behulp van een spuit met gecouleerd water de *arteria emulgens* opspuit, 't welk gedaan zynde, zo wordt niet alleen het lichaam der Nieren opgespooten en uitgezet, maar zelfs wordt dit vocht uit de Nieren in de *uretheres* overgebracht. Echter moet men deeze voorzorg gebruiken, dat men Nieren van een versch geslagt beest neeme. Uit deeze proef blykt ook duidelyk de volharding en aaneenschakeling d'r bloedvoerende vaten, met de andere bloedvoerende zelfs, welke gemeenschap belet zynde zo blykt, dat hieruit veele Nier-ziekten kunnen voortspruiten.

§. CCCCXVII. DEWYL dan de Nieren alleen dienen tot doorzyging, zo blykt, dat veele Hedendaagsche Ontleedkundige, welke een byzonder *fermentecrend præcipitans* in de *urina*, of ook een zekere *attractio* in de Nieren stelden, zeer gedwaald hebben; hier is alleen de werktuigkundige afscheiding genoeg doende, dewyl het gedeelte van het vloeibaarder  
door

door de *vasa sanguifera* afgescheiden wordt door nauwere pypjes.

§. CCCCXVIII. AAN het boven einde der Nieren leggen twee lichaamen van een verscheide gedaante, meestentyds echter *ovaal*, zaamgedrukt, en grys of geel van kleur, van binnen hol, welke *nierklieren* of *capsulae atrabilia-* *Renes*  
*riae* genoemd worden, welkers gebruik tot nog *succen-*  
toe zeer onbekend is. *turiati.*

§. CCCCXIX. HET samenstel deezer deelen is zonderling, namentlyk klierachtig, zaamgepakt en van binnen hol, welke met een geelachtig en eenigzins zoet vocht vervult is; 'er doen zich ook van binnen veele openingen en gaatjes op, welke de oorsprongen van de *ductus excretorii* schynen te zyn, schoon dezelfde tot nog toe niet ontdekt zyn: deeze deelen hebben haare Slag-aderen, aderen, zenuw- en *watervaten*, welke door *Nuck* be- *Vasa*  
schreeven zyn. *lymphatic.*

§. CCCCXX. 'ER zyn onder de Geneesheeren verschillende gevoelens over het gebruik deezer *capsulae*; de meeste zyn van gedagten, dat het vocht, 't welk door de openingen der *pore* dringt in het aderlyk bloed, en van de Nieren terug komt, dat dat vocht, (zegge ik), 't welk deeze *capsulae* afscheiden, een *zuiver zout* en *verdunnende* kracht *Alcalina.*  
heeft, dat namentlyk zy dit, wanneer het *Atten-*  
daar van zyne waterachtige vloeibaarheid be- *uans.*  
roofd is, door haare *alcalise* kracht vloeibaar-



der kunnen maaken; echter heeft men noch de *alcalife* natuur van dit vocht ondekt, noch de wegen gevonden, door welke het met het terug komende bloed, door de *venæ emulgentes* gemeenschap heeft.

§. CCCCXXI. *Foetus.* DEZE Waarneeming is opmerkens-waardig, dat in een ongebooren kind deeze deelen zwaarder en grooter zyn, als in volwasfene; waarom zy fomtyds zo groot waren als de Nieren zelfs: en daarom is 't zeer waarfchynlyk, dat zy in een ongebooren kind van een byzonder gebruik zyn.

#### *Aanmerking.*

DIT gevoelen komt ons waarfchynlyk voor, dat het in de *renes succenturiati* afgefcheidene vocht, zonder twyfel door de binnenfte openingen in de *vasa lymphatica* overgaat, waarvan men daar een groot gedeelte vindt. Deeze brengen naderhant de *lymphæ*, welke door het vocht in de *renes succenturiati* fyner en dunner gemaakt is, over naar de *capsula lumbaris*, opdat de *lymphæ* vloeibaarder zouden worden, om te beter door den *ductus thoracicus* te kunnen loopen.

#### *Ziektekundige Beschouwing.*

§. CCCCXXII. *Mictus cruentus.* ONDER de ziekten der Nieren fteekt de *bloedwatering* uit, welke ontftaat uit de al te groote uitzetting der *vasa*

*sa arteriosa*, en derzelver opening in de pispypjes, die de zelfstandigheid der Nieren uitmaaken.

*Aanmerking.*

WANNEER volgens beloop der natuur het *serum* in de Nieren van het bloed afgescheiden wordt, dan vloeit alleenlyk het waterachtig gedeelte van 't bloed door de naauwe kanaalen en pispypjes, achterlaatende het dikker bloed, 't welk door de *venæ* terug vloeit; doch zo de openingen der *arteriae*, uit welke de *pisbuizen* ontstaan, door al te dik en veel bloed verwyderd worden, dan loopt dikwyls het bloed in de pispypjes, die tot de afscheiding geschikt zyn, en het wordt dus door de *uretheres* in de blaas zelfs gebragt; om welke reden deeze kwaal gemeen is aan bloed-*Plethorici.* *urinosi.* *ryken*, voornamentlyk in een hooge ouderdom, wanneer de gewoone *hæmorrhoidale* vloed ophoudt, en 'er of een grootere beweeging, of ontroering in het bloed, door het inzwelgen van sterken drank voor afgegaan is.

§. CCCCXXIII. WANNEER het geklonterd bloed in een *miçtus cruentus* stilstaat in de *uretheres*, en den ingang derzelver in de *vesica* stopt, dan geschiedt 'er niet alleen een opstopping van de pis, maar 'er ontstaat ook een verwoede pyn omtrent het *pubes*, en na de dood bevindt men de *uretheres* zelfs wonderlyk verwyd, zodat zy naar een groote worst gelyken: dit gebeurt *Fracti-* ook, *men.*



ook, wanneer 'er een steen vast gepakt zit in de *uretheres*, welke schuins door de rokken van de *vesica* loopen.

§. CCCCXXIV. GEEN ingewand is meer aan steenachtige samengroeijingen onderhevig, dan het lichaam der Nieren, om die reden, dat het *serum*, 't geen zeer opgevuld is met aardachtige, voornamentlyk zoutachtige en *tartarische* deelen, welke ligtelyk saamengroeijen, daar ter plaatse afgescheiden wordt, en welke deelen ook wegens de groote belette vloeijing en loop der *urina* in de zelfstandigheid der *canaliculi* van de Nieren, voornamentlyk in die pypjes, die het bekken uitmaken, gemaklyk verdikt worden, en tot harde en ongelyke lichaaamen samengroeijen, voornamentlyk, wanneer 'er veel taay slymen en zandige stof met de pis vermengd is.

*Aanmerking.*

Door geen een *viscus* van het lichaam worden zo overeenkomstig en overvloediglyk de *microcosmica salia neutra fixiora sulphurea* door gekleinst en afgescheiden, als door de kanaalachtige zelfstandigheid der Nieren, en, omdat dergelyke zouten, voornamentlyk met puntjes voorzien zynde, gemaklyk in één loopen, byzonderlyk, wanneer zy stilstaan, of langer op eene plaats blyven, zo is het geen won-

wonder, dat de Nieren zeer onderhevig zyn aan steengroeiing.

§. CCCCXXV. 'ER komt ook zeer gemaklyk een steen, wanneer de zelfstandigheid der Nieren gekwetst is; gelykerwys wanneer zy *magteloos* zyn, dewyl wegens de groote slapheid van 't bloed, de omloop van 't zelve traager door dit gedeelte geschiedt, en de pis langer in de pisvaten vertoeft; of ook wel, wanneer de *pypachtige* zelfstandigheid door een *Tubulosa* ontsteeking of *invreeting* verscheurd of gekwetst *Erosio*. is; want dan staat het bloed en de pis stil, en derzelve omloop door de *venæ* wordt belet.

§. CCCCXXVI. 't Is eene aanmerkelyke ondervinding in de praktyk, dat de linker nier meer aan steenen en ook andere ongemakken onderhevig is, als de rechter: dit schynt hier van de reden te zyn, dat in het rechter gedeelte de Nier onder de *hepar* legt, door welkers warmte zy gekoesterd wordt; zodat daar de vochten zo gemaklyk niet kunnen stremmen en dus vlocibaarder blyven; ten anderen geschiedt ook in de linker zyde, omtrent de legging van de Nier, de groote *flexura coli*, in welke dikwyls winden stil staan, en dit gedeelte wonderlyk uitzetten, zodat het lichaam der Nier gedrukt wordt, door welke drukking de omloop van 't bloed eensdeels moeiljeker geschiedt, anderdeels de steenen  
zelfs,



zelfs, die in de zelfstandigheid der Nieren zitten, tot de uit- of voortgang aangezet worden.

§. CCCCXXVII. Zo lang de steen haare vaste zit-plaats in de Nieren zelfs behoudt, zo lang wordt 'er geen scherpe en zwaare pijn veroorzaakt, maar zoras dezelve bewoogen begint te worden, of in 't *pelvis* neer zakt, of ook door de *uretheres* gaat, dan ontstaat 'er een verwoede en byna ondraaglyke pijn, welke te gelyk de naast gelegene zenuuwen en *musculus Psoas* aandoende niet alleenlyk het *femur* ontfellen, *vomit* en *nausea*, maar ook groote saametrekkende en bezwaarende pijn in deeze zelfde zyde met een koude in de uiterste deelen, optrekking van de *testiculus*, en een ten eenemaale ophouding der pis, be-  
*Attrac-* sloote lyf, en woedende snydingen in het ab-  
*tio.* dommen vezelt gaande, veroorzaakt.  
*Suppres-*  
*sio.*  
*Strictura*  
*alvi.*

§. CCCCXXVIII. De Nieren zyn *viscera*, welke zo een uitgeleeze gevoel niet hebben, omdat zy uit *membranæ musculo-nerveæ* bestaan, welke het eigentlyk werktuig van 't gevoel uitmaaken; maar de piskanaalen der Nieren zyn uit dunne vliezen, die minder zenuuwen en vezelen hebben, saamengesteld, zodat 'er geen moeiljke gewaarwording geschiedt, schoon wanneer zy door de aldaar afgescheide-  
*Infundi-* ne steenen grootelyks uitgerekt worden: doch  
*bulum.* omdat het *pelvis*, 't welk de plaats van de boezem der *uretheres* vervult, en de aan hetzelfde

gehechte *uretheres* uit zeer sterke zenuw- en spierachtige vliezen bestaan, zo blykt de reden duidelyk, waarom 'er ook uit een steen, wanneer dezelve naar deeze plaatfen overgevoerd is, een zwaare pyn ontstaat.

§. CCCCXXIX. ONDER de ziekten der Nieren, welke in derzelver zelfstandigheid ontstaan, is onder de alle voornaamste de *ontste-* *Inflam-*  
*king* te stellen, welke door de *stilstand* van *matio.*  
't bloed in de kleinste *arteriæ* ontspruit; uit deeze *Stasis.*  
komt naderhant een gezwel, roodheid, hette, met vermeerderde polslag voort, welke ziekte *graveelzucht* genoemd wordt; deeze kwaal *Nephri-*  
valt zo dikwyls niet voor als men in 't gemeen *tis.*  
denkt.

§. CCCCXXX. DE *inflammatie* wordt dikwyls vervangen door een *absces*, welke zich zomtyds over de geheele zelfstandigheid der Nier verspreidt en dezelve verteert; hierom bevestigen de Ontleedingen, dat in die geenen, welke aan een Nier *teering* gestorven *Tabes.*  
zyn, de geheele Nier verteerd is in een rottige stof, welke in *kasjes* opgeslooten geweest *Sacculi.*  
is, achterlatende kleine voetstappen van het samenstel der Nieren.

*Aanmerking.*

EENE voorafgaande vaste hette, en roodheid in het gedeelte der lendenen, met een stinkende en rottige pis, langzame *heftige* hette,  
te,



te, en uitteering des lichaams, zyn de kentee-kenen van *absces*, en deeze kwaal is gewoon een weinig langer te duuren.

*Ulcus.* §. CCCCXXXI. NA een *inflammatie* volgt ook fomtyds een *zweer*, welke meestentyds met een groote *samengroeiing* van *steen*en ge-  
paard gaat; want de Nier-buisjes, welke de pis voeren, *vérscheurd* zynde, dan loopt 'er de *urina* uit, die vol met *tartarise* *samengroeiende* zouten is, en een groote meenigte van deeze *stof* uitlaat, uit welke *saamgegroeid* zynde *steen*en voortkomen.

§. CCCCXXXII. DAT 'er wormen in de zelfstandigheid der Nieren, voornamentlyk wanneer dezelve verrot zyn, huisvesten, verhaalen MOEBIUS *Physiol. cap. 17.* en SENNERTUS in *Praxi part. 3. sect. 1.*

*Atonia.* §. CCCCXXXIII. DE *diabetes* of pisvloed heeft ook plaats onder de Nier-ziektens: dee-  
*Paraly-* ze is een al te groote *affcheiding* van de pis, zo namentlyk, dat 'er meer pis geloost wordt als 'er vochten ingenoomen zyn. Zy ontstaat  
*sis.* uit de groote *slapheid* der vaten en Nier-vezelen, of liever *lambeid* derzelven; hierom worden de vaten te sterk uitgezet, en wegens haare verlorene *tonus*, scheidt zich al het vocht van 't bloed af, en dus wordt  
*Serum.* het bloed wonderlyk van zyn *wey* beroofd.

*Aanmerking.*

DEEZE kwaal is wel een van de zeldzaamste, welke namentlyk uit de verlamdheid der nieren zelfs voortspruit; echter ondervindt men dikwyls in de Praëtyk, dat in sommige en ook *heete* <sup>*Acuti.*</sup> ziekten meer vocht door de pis geloost wordt, als 'er drank ingenoomen is, wanneer de oorzaak der kwaal in de *crasis* en het samenstel des bloeds zelfs zit, welke natuurlyk bestaat in de innerlykste vereeniging van het *serum* en de *crasis* van 't bloed: wanneer derhalven deeze vereeniging door de vermenging van andere vochten bedorven wordt, of ook wanneer het bloed traager voortvloeit, zo scheidt het *serum* zich in heete ziekten van het bloed af, en de loozing van een groote meenigte en witte pis voorspellen meestentys een doodlyke uitkomst, ja zelfs een aanstaande *phrenitis*.

§. CCCCXXXIV. DE *renes* krygen ook *knoest*-<sup>*Scirrhi.*</sup> *gezwollen*, gelykerwys men hier van voorbeelden leest in de *M. N. C. Dec. II. An. V. Obs. 67. Anno IIX. obs. 159.*

*Aanmerking.*

*Scirrhi* ontstaan of in de *klieren*, of ook in *Glandulae* de ingewanden, welke uit ontallyke vaatjes <sup>*lae.*</sup> samengeweeven zyn, en spruiten uit een taaije aardachtige stof, die zeer vast in de kleinste

ONTLEEDK. *Verz. I. verv. XIX.* C vaat-



vaatjes gepakt zit, en een opstopping in deeze vaten gewoon is voorttebrengen; dewyl derhalven de zelfstandigheid en het famenstelzel der Nieren alleen uit vaten bestaat, is het ook geen wonder, dat zy aan deeze ongemakken onderhevig zyn.

§. CCCCXXXV. DE Nieren lyden ook *spasmus*, welke zeer dikwyls met de *affectus spasmodici hypochondriaci* en *hysterici* gepaart gaat, en dan wordt 'er eene klaare waterige pis geloost.

*Aanmerking.*

EEN zeker kenteken van een grooter inwendigen *spasmus* is, wanneer de pis, die natuurlyk een Oranje kleur heeft, verandert en als gemeen water uitgeloost wordt; nadeemaal ook de *spasmi* zelfs, welke *affectus* zyn der zenuwachtige deelen, voornamentlyk de slag-aderlyke Nier-pypjes, naar welke uit het *par oëtavum* en *intercostale*, benevens na derzel-

*Tunica.* ver rokken, zenuwen gaan, samendrukken, en de openingen derzelven naauwer maaken, zodat alleen het dunne waterachtig gedeelte van het dikker zout-zalpeterachtig afvloeit.

§. CCCCXXXVI. DE *suppressio* der pis, of de verminderde vloed derzelve, welke onder den naam van *dysuria* voorkomt, heeft meer oorzaaken; of namentlyk drukt een zwaare *spasmus* de *uretheres* te saamen, zodat zy

geen

geen vloeistof ontfangen of doorlaaten, of 'er heeft een taaije *tartarise masfa*, of een vaste steen in het *pelvis* plaats of hangt in de *uretheres*; of de ingang van de *urether* in de *vesica* wordt door geklonterd bloed of een andere styyve *masfa* toegeslooten.

*Aanmerking.*

'ER zyn nog andere oorzaaken, waaruit de *dysuria* ontstaat, welke niet uit een gebrek in de Nieren of *uretheres* voortvloeit, maar uit de *urethra* en *vesica urinaria*.

XVI. HOOFDSTUK.

VAN DE PISBLAAS.

§.CCCCXXXVII. **D**E pisblaas is een enkel *Vesica* vliesachtig *viscus*, in de *urinaria*. holte van het *schaambeene*, 't welk *bekken* ge- *Pubis.* noemt wordt, geleegen om de pis uit de *Pelvis.* *pisvoeders* te ontfangen, en om het zelve door de *Pisleider* te loozen.

§. CCCCXXXVIII. DE *vesica* ligt tusfchen de verdubbelingen van den *penszak*, in welk de *Duplic* zelve beschermt en veilig legt, en wordt van *tura* *Perito-* voren door middel van het *peritonæum* met de *nai.* *schaambeenderen* vast: in vrouwen is de *Ossa Pu-* zelve ook van achteren vast met de *va-bis.* *gina uteri*; in mannen met het *intestinum rec-*



*tum*: door tusfchenkomst van de *urethra* is dezelve ook vast met de *genitalia*.

*Aanmerking.*

*Umbilicus.* In 't gemeen wordt ook de vereeniging van de *vesica* vast gestelt met de *navel*, door middel van de *arteriæ umbilicales*, welke als haar steunzels gehouden worden, opdat zy niet naar beneden zoude zakken: maar de zaak wel beschouwd zynde, zo bevindt men dat de *arteriæ umbilicales* naar de zyde der *vesica* loopen; doch liever moet men een zekere vereeniging vaststellen met de *umbilicus*, door middel van het *peritonæum*, in welkers *duplicatuur* de blaas van onderen verborgen ligt, waarom ook in een *suppressio urinæ*, wanneer de blaas zich niet famentrekt, en aan een zekere *slapheid* onderhevig is, het gemeen niet zonder vrucht gewoon is niet alleen op de *umbilicus*, maar ook op het *regio pubis* pisdryvende middelen te leggen, gelyk *cepæ tostæ*, *oleum juniperi*, *spiritus therebinthinæ*: zy legt ook zo zeer onder de *duplicatura peritonæi* verborgen, dat men schoon men het *abdomen* opengefneeden heeft, de pisblaas, wanneer zy ledig is, nauwlyks zien kan, voornamentlyk wanneer iemand in de Ontleedkunde niet eervaren is; zo men de *duplicatura* opblaast, dan wordt de blaas wonderlyk uitgerekt.

§. CCCCXXXIX. De blaas heeft een langwer-

werpig-ronde gedaante; het bovenste gedeelte heeft een breedere oppervlakte, en wordt de *bodem* genoemd; het onderste is meer lang-*Fundus* werpig, nauwer, en wordt de *hals* of *cervix* *Collum* genoemd: in derzelver holte kan in volwasfene omtrent een pond vocht, in sommige meerder.

§. CCCCXL. DE *vesica* is een deel, 't geen enkel bestaat uit vliezen, die echter van verscheidene maakzels zyn: voor eerst wegens de *duplicatura peritonæi*, onder welke zy verborgen legt, en eigentlyk geen vlies is dat de *vesica* uit maakt, noemen wy het buitenste, onder het welke bolletjes en celletjes met vet, doch minder en dunder vervuld, verborgen leggen; het tweede is het *spierachtige*, 't welk uit dwarse en schuinse *Muscularis* vlees-vezels bestaat, welke fynder en teerder in het lichaam der blaas, doch sterker in den hals, en daar in een bondeltje verzameld zynde, en in 't rond loopende de *sluitspier* uitmaaken, door welkers middel de opening geflooten wordt; het derde en onderste vlies is het *zenuwachtige*, doch uit veelvuldige *mucose* *Nervæ* klieren bestaande, welke meest omtrent den hals in het onderste gedeelte der blaas gezien worden.

§. CCCCXLI. DERHALVEN is de *vesica* een zeer gevoelig en beweegbaar deel, namentlyk met een eigene *veerachtige* *Elasticus* *famentrek-* kende en verwyderende beweging voorzien,



dewelke van het spierachtig vlies afhangt, welkers vezelen die eigenschap en kracht bezitten, dat zy zeer verwyd kunnen worden, en na de verwyding door haar ingefchapene kracht wederom zich famentrekken, en in haare vorige plaats en stand herftellen.

*Expul-  
trix.*

Door middel van dit vlies overwint en opent de pis, niet alleen door haare zwaarte en gewicht de *spincter* van de blaas, en loopt uit de *urethra*, maar wordt ook teffens door de *uitdryvende* kragt van dit vlies uitgedreven: hierdoor gefchiedt het, dat dezelve na een al te lang duurende ophouding der pis niet gemaklyk wederom faamgetrokken wordt, wegens haar te groote uitfpanning, en de uitgang der pis, fchoon de *fpbincter* tegen wil en dank open is, belet wordt.

§. CCCCXLII. HET zenuwachtig vlies heeft ook een zeer groot gevoel, 't welk veel tot die famettrekkende beweeging toebrenge, omdat zo dit door de fcherpheid der pis gekwetst, of door de zwaarte van een fteen in de blaas, of derzelve ruuwigheid afgefleeten wordt, 'er dan een fcherp gevoel ontftaat.

*Glandu-  
lofa.*

DOCH opdat de fcherpheid der pis dit vlies geduuriglyk niet befchadigen en kwetzen zoude, is 'er nog een ander *muceus* vlies, namentlyk het *klierachtige*, 't welk een glad en zagt vocht loost, waardoor de fcherpheid getem-

temperd , en het zenuwachtig vlies ook beschermd wordt.

§. CCCCXLIII. IN mannen is de *sphincter vesicae* sterk door vezelen vast gehegt aan het *intestinum rectum*: hierom geschiedt het, dat by een *stranguria*, 't welk een scherpe pijn is , voortkomende uit een moeilijke prikkeling , of *sa-Irritatio*. mentrekking of opkrulling van de *sphincter vesicae* en *urethrae*, 'er een *tenesmus* of geduurige *Crispatura*. pooging om af te gaan gevoegd wordt; en dat integendeel in een *tenesmus* de *vesica* tot de pisloofing aangezet wordt: maar in vrouwen , omdat de *vagina uteri* vast vereenigd is met de *cervix vesicae*, gebeurt het daarom, dat in de laatste dagen der zwangerheid, wanneer het kind neerzakt in de holte van het *pubes*, de zwangere vrouwen dan tot een meenigvuldige waterloozing aangezet worden: vervolgens geschiedt 'er ook in de *fluor albus*, voornamentlyk *venerische*, een prikkeling met een zekere pijn, en indien zy een steen in de blaas hebben, zo storten de klieren , welke van buiten tegen de *urethra* aanleggen , door de pijn, welke zy lyden, een zeker *mucus* uit.

§. CCCCXLIV. DE pis wordt door de *urethra* geloost, 't welk een kegelswyze vlies *Cylindricus*. achtig kanaal is , welkers lengte in vrouwen weinig grooter dan twee duim-breed is ; doch in mannen is dezelve veel langer , nademaal zy wel 14 duim-breed beflaat.



§. CCCCXLV. DE *urethra* is vereenigd met de *cervix* van de blaas zelfs, en strekt zich in de mannen tot aan 't einde van de *glans* uit, *Ductus.* doch derzelver *buis* loopt in mannen in 't geheel niet regt, maar met een kromte, dan daalt zy neer en dan alweer klimt zy op, kromt zich en daalt weer naar beneden, en drukt de afbeelding van een S uit, waarom ook de inbrenging van de *catheter* zo ongemaklyk voor onervaarene is.

*Aanmerking.*

*Commis-* Zo ras de *urethra* boven het laage beenachtig gedeelte van de *samenvoeging* van het *pubis* is, *sura.* dan klimt zy tot de bovenste plaats van het *os pubis*, en van daar gaat zy wederom naar beneden, derhalven is de *buis* geheel geboogen; doch in de vrouwen is deeze *ductus* regt en kort, waarom men ook in dezelve de *catheter* gemaklyker kan inbrengen, om de *steen* te onderzoeken, of de *waterloozing* te hulp te komen.

§. CCCCXLVI. IN vrouwen wordt de *urethra* gemaklyker dan in mannen verwyd; hierom geschiedt het, dat men door het verwyden van dit kanaal in vrouwen, een *steen* uit de *pisblaas* haalen kan; 't welk minder in mannen geschiedt, alwaar deeze *ductus* wel 12 vinger-breed lang, en veel nauwer en gevoeliger is.

§. CCCCXLVII.

§. CCCCXLVII. DE *insertie* der *uretheres* in de *vesica urinaria* is aanmerkens - waardig , welke namentlyk geschiedt in het laagste en onderste gedeelte van de blaas , omtrent de zyden van den hals , en deeze *ductus* loopen wel in een schuine kromte eerst door het buitenste vlies , gaan daarna door het spier- en zenuwachtige heen , en loopen op geen andere manier in de *vesica* , als de *ductus choledochus* in het *duodenum* : doch van binnen hangt voor deeze openingen een los vliesje , welkers gebruik hier is , dat zo wanneer de pisblaas vol is , zy de openingen sluit , en dus belet dat de pis niet weder te rug kan koomen.

*Aanmerking.*

EN dit is ook de reden , waarom de *urethra* opgeblaazen zynde de wind zeer gemaklyk in de *vesica* , doch niet in de *uretheres* doorgaat.

§. CCCCXLVIII. DE bloedvaten , welke naar de *vesica* loopen , zo wel slag-aderlyke als aderlyke , komen gedeeltelyk uit de *hypogastricæ* , gedeeltelyk uit de *hæmorrhoidales* , en in vrouwen uit de *spermaticæ* voort , en loopen met een verschillende en krommende kruiping hier en daar van daan naar de vliezen , geheel anders als het gewoonlyk in de *viscera* of andere deelen geschiedt : de *vesica* krygt haar gevoel van de takjes van het *par intercostale* en van de zenuwen , die uit os het *sacrum* voortkomen.



§. CCCCXLIX. ONDER de verdigtfels mag men te regt ftellen, dat zekere *ductus* uit den *Ventriculus* en *intestina* de waterachtige zelfftandigheid van de *chyl* naar de blaas zoude *Serositas*. voeren, of dat de *wey* door de *pori intestinales* en de *meatus* van het verdubbelde penszaksvlies, en daarna door verfchillende gedaante hebbende *pori*, die binnen in de blaas haare openingen hebben, zouden neerlooopen; namentlyk door een korteren weg als door de omloop des bloeds of *uretheres*.

### *Ziektekundige Beschouwing.*

*Ende-  
mius.*

§. CCCCL. DE blaas met derzelver veelvuldige hier aan vast gehegte deelen is ook aan gebreken en ziekten onderhevig, onder welke de daar in famengroeijende fteen de voornaamfte plaats bekleedt, welke dikwyls de Lyders lange jaaren achter één elendig pynigt, en foltert en op fommige plaatfen als 't ware een *landziekte* is; voornamentlyk in *Zwitserland*, *Duitsland*, *Neêrland*, en de kinderen zyn hiervan niet bevryd. Haar beginzels zyn zeer dikwyls fteenachtige famengroeijingen, welke uit de nieren hiernatoe gebragt en niet geloost zynde geworden, naderhand de pis vervult met een *tartaris* en zanderig *principium* en troebel geworden zynde, zeer de generatie van deeze fteenen bevordert: een *diaeta lactea* en het misbruik van zuure dingen, en ook wei-

weinig drinken, en het gebruik van kalkachge wateren brengt hier ook veel toe.

§. CCCCLI. 'ER worden fomtyds hier, doch echter zeldzamer, wormen voortgebragt, waar over men na kan leezen, *M. N. C. Des. I. Ann. IX. & X. obs. 113. Schenckius Lib. XIII. de vesica obs. 139.*

*Aanmerking.*

W y willen dit gevoelen over de voortee-ling der wormen in de blaas niet geheel be-  
twisten, nochtans weten wy by ondervinding,  
dat deeze kleine wormptjes (by ons maaijen  
genaamt,) te gelyk met de pis in de waterpot  
gevallen, op nauwkeuriger onderzoek der  
zaak, uit het *intestinum rectum* voortko-  
men, waaruit zy na buiten te voorschyn ko-  
mende in de *labia pudendorum* door de pis nader-  
hant afgeveegd worden.

§. CCCCLII. B y de blaas-ziektens moet men  
ook deszelfs *ontvelling* tellen, van de Ouden *Excoria-*  
*scabies vesicæ* genaamt, en welke ontstaat door<sup>tio.</sup>  
de scherpe of sterk *corrosive* met ruuwe *tartarise*  
zouten vervulde pis, of, 't welk wel meest  
geschiedt, zyn oorsprong heeft van de be-  
dorven zaadachtige *lymphæ* in de *lues venerea*,  
die zelfs het slymige binnenste vlies en der-  
zelve klieren *erodeerd*. De kentekenen hier-  
van zyn de *pruritus* in het *pubes*, *ardor gravis*  
*urinæ* met een schilverachtig zetzelsel, en hette  
en



en famentrekkende pyn in de uitloozing der pis.

§. CCCCLIII. DE pynlyke heete dröppels-  
wyze waterloozing komt onder den naam  
van *stranguria* voor, en is een ongemak 't  
geen zeer dikwyls voorvalt, en uit veele  
oorzaaken voortspruit, meest gemeen aan die  
geenen, die een steen in de blaas of nieren  
hebben; en is ook meer eigen aan oude lie-  
den, dan aan anderen; zy ontstaat ook uit  
ongewoone drank, die minder van zyn zuur  
gezuiverd is, door veel wyn drinken, voor-  
namentlyk zo het lichaam ontydig aan koude  
bloot staat, s'nagts of s'morgens vroeg koud  
water drinkt, omdat dus de doorwaasfeming  
belet zynde, de scherpe zout-zwavelachtige  
deelen, welke door de huid uitwaasfemen, in  
het lichaam blyven, en na de *vesica* gevoerd  
worden; doch meest is het een *symptoma* van  
een kwaadaartige druipt, en ook van een ul-  
cus in de nieren of blaas.

Gonor-  
rhea  
maligna.

§. CCCCLIV. DE *dysuria*, of moeiljkheid  
in 't water maaken, heeft ook veele oorzaaken;  
zy ontstaat namentlyk of uit verstopte *urethe-  
res*, of uit een steen, of geklonterd bloed na  
een *miētus cruentus*, of zy geschiedt ook, wan-  
neer de *sphincter* van de *vesica* zelfs of door een  
steen of een taaije kalkachtige stof, of een klier-  
gezwel toegestopt wordt, of ook wel is een  
*spasmus*, die de *sphincter* samendrukt in grootere  
*spasmodici affectus*, gewoonlyk de oorzaak

Toph-  
acea.

van

van dit ongemak, waaruit een *symptoma* van een *colica convulsiva nervosa* gewoon is te volgen; of de oorzaak van dit ongemak heeft zyn plaats in de *urethra* door de aldaar famengroeiende *kliertjes*, gelyk dikwyls in een *lues* <sup>*Caruncule.*</sup> *venerea* en *gonorrhœa* gebeurt, of wanneer eene daar zittende steen geen uitgang heeft.

§. CCCCLV. De moeite om 't water op te houden geschiedt of door de kwetsuur van de *sphincter*, of door deszelfs affnyding in het uit- <sup>*Incontin-*</sup> haalen van de steen uit de blaas, of ook door een *lamheid*; waarom in oude lieden, en die met lamheid of *beroerdheid* geraakt zyn, of ster- <sup>*nentia*</sup> <sup>*urinae.*</sup> <sup>*Paraly-*</sup> <sup>*sis.*</sup> kere *hartvang* aangedaan worden, of zo zy op <sup>*Apo-*</sup> <sup>*plexia.*</sup> <sup>*Syncope.*</sup> deeze plaatzen iets dat zeer koud is leggen, of ook door een ongelukkige of moeilijke *verlossing*, deeze kwaal haar oorsprong kan <sup>*Partus,*</sup> hebben.

§. CCCCLVI. HET bloed-wateren heeft ook verscheidene oorzaken, want of heeft 'er een ongemak, van 't welk wy boven gehandeld hebben, in de nieren plaats, of de met bloed geverfde pis komt uit de opgevreetene <sup>*Erosi.*</sup> *uretheres* voort, of 't welk meermaalen geschiedt, uit den *belette hæmorrhoidale* vloed, voornament- <sup>*Suppres-*</sup> <sup>*sis.*</sup> lyk in den hoogen ouderdom, en zo zy niet lang aan deeze vloeijing gewoon zyn geweest; want 'er loopt tuschen de vliezen der blaas een zekere tak van de *venæ hæmorrhoidales*, welk door te groote uitzetting geopend zynde het bloed in deszelfs holte uitstort.

*Aan-*



*Aanmerking.*

*Mitio sanguinea.* DERGELYKE Waarneemingen van een bloedloozing door een belette *hæmorrhoidale* vloed ontstaan, kan men leezen by *Hoechstetter*, *Dec. I. Ann. IIX. obs. 144.*

*Heelkundige Beschouwing.*

§. CCCCLVII. DE *dysuria* of *totale suppressio urinæ* geschiedt niet zelden van het uitgestorte en in de holte van het *pelvis* neerzak-  
kend bloed, als wanneer het door haare drukking de uitgang der pis belet.

*Incontinentia urinæ.* DE kwetzuuren van de blaas zyn wel niet doodelyk, maar worden te regt onder de ongeneeslyke gesteld; want zy laten een moeite om het water te kunnen ophouden, en een meenigte vuiligheid na, als wanneer de pis een andere plaats in het *abdomen* zoekt, en daar in uitloost.

*Causticus.* §. CCCCVIII. WANNEER 'er *carunculæ* in de *urethra* groeijen, dan moet men dezelve met een byzonder daartoe geschikt werktuig afbranden, of met een eenig *bytend* poeder wegneemen, echter met die voorzorg, dat men het gezonde gedeelte der *urethra* niet beschadige.

## XVII. HOOFDSTUK.

### VAN DE MANLYKE TEEL- DEELEN.

§. CCCCLVIX. **D**e Manlyke Teel-deelen *Partes* worden te regt in vier *genitales* ordens verdeeld; 1.) in die, welke het zaat be- *veriles.* reiden; 2.) in die, welke het aanbrengen, *Semen.* 3.) in die, welke het bereide zaat bewaaren, en ten 4.) in die, welke het uitwerpen.

§. CCCCLX. DE zaad bereidende deelen zyn *Praepa-* de *testes* (getuigen) of ballen, daarom dus ge- *rautes.* naamd omdat zy de manlykheid vertoonen; zy zyn *Virili-* twee in getal, en hangen wegens de groote *Vasa* lengte der zaadvaten buiten den onderbuik, on- *sperma-* der aan den wortel aan deroede. *tica.* *Abdo-*

§. CCCCLXI. DE *testes* zyn van buiten en *men.* binnen bekleed: onder derzelver bekleedzelen *Radix* heeft het *scrotum* de eerste plaats, 't welk *Penis.* uit een *cuticula*, *cutis* en *membrana musculosa*, 't geen uit veele vliesvezelen samengevlogten is, bestaat, en *dartos* genoemd wordt, en dit is wel de voornaamste oorzaak, dat dit zakje zich zelve te samentrekt; want het is bekend, dat het *scrotum* merkelyk verwyd en ook samengetrokken kan worden.

Aan-



*Aanmerking.*

*Hernia.* MEN wordt in een *breuk* een groote verwyding van dit zakje-gewaar, 't welk fomtyds zo een groot gedeelte van het *intestinum ileum* in zich bevat, dat het grooter dan een hoofd is: *Hernia aquosa.* desgelyk in een *waterbreuk*, 't welk een zeer *Ascitici.* gemeen *symptoma* in *waterzugtige* is; vervolgens ook door aangebragte koude van buiten, uit dewelke het blykt, dat dit vlies meestendee- *Fibræ-* len uit *veerachtige vezelen* bestaat, waarom het *lastice.* van die natuur en aard is, dat het zich naar een groote verwyding van zelfs in zyn voorigen stand herstelt.

§. CCCCLXII. ALDAAR is het vel zeer dun, en van vet beroofd, opdat het des te gemaklyker uitgespannen en samengetrokken zoude kunnen werden: 't is ook wegens de on- *Propagi-* tallyke *takjes* der zenuwtjes, welke uit het *os* *nes.* *sacrum* naar dit gedeelte gaat, boven andere deelen met een teder ongemeen en uitsteekend gevoel voorzien.

*Aanmerking.*

DIT vlies is met een zo fyn gevoel begaafd, *Spiritus* dat de *overgehaalde brandewyn* en gedistilleerde *hini rec-* olie 'er opgelegd zynde, een zeer groote het- *tificatus.* te en pyn veroorzaakt, en dat de *puistjes* die *Pustulae* daar voortkomen, meestentyds met een groote *Puuri-* te pyn en *jeukte* verzeld gaan. *zals.*

§. CCCCLXIII.

§. CCCCLXIII. DE *balzak* wordt in een *Scrotum*. rechter en linker verdeeld, door een midden-linie, welke men *futura* noemt: deeze moet men, gelyk *Verheyen* wel opmerkt, in het snyden wegens de daar te samenloopende vaten vermyden: van binnen in den omtrek van deeze linie ontstaat een dun *fchot*, 't welk uit de *Septum*. verdubbeling van het *balszaks vlies* gemaakt *Membrana dartos*. wordt: dit scheidt het rechter gedeelte van het linker, en is door *Ruisch* uitgevonden: dit *fchot* belet het water in een *hydrocele* zo gemaklyk uit de eene na de andere zyde te loopen, en maakt ook dat in breuken het uitgezakte *intestinum* maar aan eene kant blyft.

§. CCCCLXIV. HET *balzaks-vlies* is ook voorzien zo wel van slag-aderen, als aderen, welke van de *hypogastricae* en *Iliacae externae* voortkoomen, en welke in *plethorici* groot genoeg gevonden worden, wegens de ongemaklykere terugvloeiing van het bloed door de *venae*.

§. CCCCLXV. ONDER de binnenste bekleedzelen der *testes* komt voor eerst het roode *Erythral-vlies* voor, dus genaamd, om deszelfs *throides tunica*. roode kleur, 't welke de *zaat-bereidende-vaaten* *Vasa* als in eenkrans in een vlegt, en uit de *opfchortende spier* voortgebragt wordt. *præparantia*.

§. CCCCLXVI. DE *opfchortende spier* komt *Musculus Cremaster*. van het onderfte gedeelte van de *spina osfis ilei*, en loopt van vooren fchuins naar beneden, en wordt met spiervezelen vastgehegt aan den voorfte neergaande rand van het *os Ibeum* naar



het *os pubis*, van waar dezelve voorwaarts, en schuins naar beneden gaande zich uitstrekt, en de voorste zyden van de *tunica vaginalis* omvat, welke holle spier niet alleen de *tunica vaginalis*, maar ook de *testis* zelfs opligt, vasthoudt, samendrukt en uitperst.

*Tunica vaginalis.* §. CCCCLXVII. HET tweede vlies wordt het *schedevlies* genoemd, omdat het de zaadvaten en den bal als een scheede omvat, welk vlies met de *cremaster* samen te weeg brengen, dat de *testis* door haare al te groote zwaarte niet naar beneden zakt.

*Tunica albuginea.* §. CCCCLXVIII. HET derde wordt het witte vlies genoemd, en is een eigentlijk vlies der *testes*, sterk, zeer zenuuwachtig en de zachte zelfstandigheid der *testis* omvattende: van *Lævis.* buiten is het glad en met water doortrokken, *Aspera.* doch van binnen *ruw*; dit vlies is by uitstek gevoelig, omdat het uit onnoemelyke kleine zenuwen saamgevlogten is.

*Vasa lymphatica.* §. CCCCLXIX. IN het bovenste gedeelte van dit vlies hegten zich de bloed- en *water-vaten* en zenuwen, welke uitspruitzeltjes en takjes naar binnen in de *testis* loopen.

§. CCCCLXX. DE zenuwen komen uit de *nervus intercostalis* en het *par vagum* voort, gedeeltelyk uit de Lendenen en het *os sacrum*, en loopen naar deeze vliezen, waarom 'er een groote overeenkomst en samenspanning tusfchen de *testis* en de bovenste deelen plaats heeft.

*Aanmerking.*

DIT heeft *Hippocrates* zelfs opgemerkt, welke in zyne *aphorismi* zegt: dat de opgezwollen *testis* een drooge hoest veroorzaakt: en het is in de *praetyk* bekend, dat koud op de *testis* gelegde *stovingen* een zekere ont-<sup>*Epithema*</sup>roering in het gantsche lichaam veroorzaken, ja zelfs, dat het gemeen op deeze wyze dronke lieden nugteren maakt.

§. CCCCLXXI. TEN laatste is het bekend, dat een groote kneuzing in deeze deelen het geheele zenuwgestel aandoet, *animi deliquium* en ook zeer groote *anxietates* kan veroorzaken door de pijn, welke daar te weeg gebragt wordt, en 't geen nog het zwaarst is, dat zy *tremores* en *convulsiones* kan veroorzaken.

§. CCCCLXXII. SOMMIGE stooven het *scrotum* beneffens de *testis* met warme speceryachtige wyn, om de ter nedergeflaagene kragten wederom op te wekken.

§. CCCCLXXIII. DE zelfstandigheid der *testes* bestaat niet, gelykerwys de Ouden van gedagten waren, uit *klieren*, maar enkel uit on-<sup>*Glandulae*</sup>tallyke kleine vaten, en in malkander gedraaide en gevlogte *buisjes*.

*Aanmerking.*

GREWIUS zegt, dat hy de vaten van eene



*testis* tot twintig ellen uitgerekt heeft, en *Bel-  
linus* in zyn *Opuscul. Anatom.* bevestigt, dat hy  
de vaatjes, uit welke de *testes* bestaan, tot der-  
tig *Florentynsche* ellen uitgetrokken heeft: men  
kan deeze uitrekking gemaklyk navolgen,  
zo men de *testis* eenige dagen in azyn laat wee-  
ken, nadat men van te vooren van dezelve  
de *tunica albuginea* afgescheiden heeft, en men  
dan met een natte spons schudt of beweegt,  
dan wordt de *testis* in onnoemlyke kanaaltjes  
gerefolveerd.

§. CCCCLXXIV. DERHALVEN bestaat de  
zelfstandigheid en het famenstelzel der *testis* niet  
uit *glandulae*, maar enkel en alleen uit kleine ka-  
naalen, en dit zelve famenstelzel leert ons  
vooral deszelfs gebruik en werking, welke  
daarin bestaat, dat door haare ontallyke  
takken van bloed-vaten en derzelver groote  
openingen niet alleen het dunste, maar ook by-  
na het *spiritueuse* gedeelte van de *lympa* van het  
bloed afgescheiden wordt, en door de geduu-  
rige *Attritus*. rige *Conquas-* vryving, voortdryving en *schudding*, de-  
wyl het door zeer lange kanaalen loopt, *ver-*  
*satio.* kleinsd, verdund en als 't ware in een *spiri-*  
*Subtili-* tueus schuim veranderd wordt.  
*sare.*

*Aanmerking.*

DE *testes* zyn byna van het zelfde vatach-  
*Cortex* tig famenstelzel als de *schors der barsenen*, 't  
*cerebri.* welk ook wegens de engte der vaten niet dan  
het

het dunste en even aangeroerde vloeibaare gedeelte van het bloed toelaat en afscheidt, en door haare gedurig vryvende beweeging verder bearbeidt, opdat naderhant het fynste vocht door de *buisjes* der zenuwen gevoerd zynde, tot de volvoering der beweeging en gevoel in het gansche lichaam zouden strekken, om welke reden 'er een groote overeenkomst en medelydzaamheid tusfchen het *cerebrum* en de *testis* plaats heeft, en zelfs zo groot, dat wanneer 'er een al te groote kwantiteit *semen* afgescheiden en uitgeschooten wordt, de *functiones animales* zeer belet, 't geheugen en verstand verminderd, en het gevoel verzwakt en vernietigd worden.

§. CCCCLXXV. DERHALVEN is het *semen* van een dier niets anders dan een wel uitgekookt waterachtig fap van het bloed, 't geen door naauwe en ontallyke buizen en de geduurig vryvende beweegingen der *testis* tot den hoogften graad van fynheid gebragt is.

§. CCCCLXXVI. SOMMIGE heedendaagfche *Autcuren* hebben dit gevoelen van het *semen*, en zoeken dit door *microscopia* te bevestigen, namentlyk dat het zelve uit onnoemlyke kleine levendige diertjes bestaat, in welke reets de eerfte beginzels van een toekomstend lichaam zyn, welke diertjes in dit *humor* zwemmen, waarover men de waar-en proefnemingen van *Leuwenboek* kan naleezen.

§. CCCCLXXVII. DE vaten, welke het



bloed naar en van de *testes* voeren, is men gewoon *spermatica* te noemen; de *arteriæ* hebben *Truncus.* haaren oorsprong uit den *stam* van de groote *arteria* (*aërta*) drie vinger breed onder de *arteriæ emulgentes*, doch de rechter komt dieper *Dextra.* voort; de *rechter vena* komt voort uit de *holle Vena ca-* *ader*, onder de rechter *renalis* of rechter *vena Sinistra.* *emulgens*; de *slinker* uit de linker *vena emulgens*, *Ductus* en deeze maaken veele bogten en gezwollen of *varicosi.* *krampaderige buizen*, en gaan door het gemeene verdubbelde penszaks-vlies als in een scheede, en loopen boven de *musculi psoas* en de *urethères*, totdat zy tot de plaats van haare uitgang *Unguen.* in de *liezen* gekoomen zyn, vanwaar zy vervolgens niet in een rechte maar schuinse weg, door de *tendines musculorum abdominis* nederwaarts naar het *scrotum* klimmen.

#### Aanmerking.

DE voorzichtige natuur heeft zeer wyze-lyk te weeggebragt, dat de *vasa spermatica* niet recht maar schuins naar het *scrotum* liepen, opdat de *uitzakking* en neerdaling van *Pro-* *lapsus.* het *intestinum ileum*, en bygevolg de breuken, zouden belet worden; want de plaats, daar zy samenloopen, is zeer hoog in de *musculus transversus*; en de andere, daar zy doorloopen, is laager in de *obliquus descendens*, wyl zy naar deeze *Annu-* *lus.* gaan door de ovale ring in de eerste vezel-draaden van de *tendo* van de *musculus obliquus* de.

*descendens* daarna gaat deeze streng, beneffens haar ingeslooten vaten naar beneden over het *os pubis*, en wordt tot in het *scrotum* zelfs overgebracht.

§. CCCCLXXVIII. DE *arteria spermatica* geeft veele takjes, welke het bloed van het *pyramiedswyze* lichaam, of het *epididymis*, door waare *anastomoses* terug brengen in de *vena spermatica*.

§. CCCCLXXIX. OMTREND de *vasa spermatica* is het aanmerklyk, dat de *venæ* en *arteriæ* door *anastomoses* zeer vast met elkander vereenigd zyn, om welke reden niet alleen door opblaazing de wind, maar ook met behulp van een spuit, het ingespootene vocht in de *arteria spermatica* te gelyk voortvloeit en doorgaat tot in de *vena* (\*).

§. CCCCLXXX. DE *arteria seminalis* digte by de *testis* genaderd zynde, verspreidt eenige takjes naar het onderste en binnenste gedeelte van het *epididymis*, en ook andere naar het zenuuwachtig vlies der *testis*, en de kanaalachtige zelfstandigheid van de *testis* zelfs, als wanneer zy door den geheelen omtrek der *testis* verspreid worden, door welke alleenlyk het

(\*) Doch dat dit niet van de *anastomoses* der Slagaderen met de aderen afhangt, kan men in de *Physiologia* of *Natuurkundige Ontleding van het menschelyk lichaam*, by de Drukker deezer gedrukt, bladz. 583. en ook by de GRAAF zien.



het dunste ongekleurde gedeelte van het vocht  
aangebragt wordt: die *arteriæ*, welke door het  
zenuuwachtig vlies gaan, verdeelen zich in  
*Vasa ca-* onnoemlyke takken en *baair-vaatjes*, welke  
*pillaria.* de geheele *testis* beslaan, en mischien met on-  
tallyke mondjes haar vocht in naar de ordere  
of rang gelegene grootere vaten, en in een  
aan de *epididymis* vastzittend en in 't midden  
eindigend grooter kanaal uitstorten.

*Copus* §. CCCCLXXXI. Het *pyramiedswyze* opge-  
*pyrami-* zwolle of teere lichaam, 't geen uit de zyde der  
*dale, va-* testes voortkomt, is met onnoemlyke met  
*ricosum* elkander *communiceerende venæ*, die als een  
*vel pam* net maaken, voorzien, en eindigen ten laatsten  
*pinifor-* in een *vena*, waardoor 'er de bekwaamste  
*me.* gelegendheid is om het bloed in deeze kleine  
*Dorsum.* adertjes te verspreiden.  
*Rete.*

§. CCCCLXXXII. D E vaten, welke het in  
de *testis* bereide zaad wegvoeren, eindigen in  
de *epididymydes* of *prostatâ*, en storten haar vocht  
in deszelfs holle kanaalen: derzelver maakzel  
is echter maar een aanhoudende hol *cylindrisch*  
vat, op veelvuldige wyze gekronkeld, op de *testes*  
*Ejacula-* leggende en in een *uitwerp-vat* eindigende, 't  
*torium.* welke wederom opklimmende, boven het *os*  
*pubis* heen in het *pelvis* daalt, en het achter-  
ste gedeelte van den hals der *vesica* naderende  
in de *vesiculæ seminales* eindigt.

§. CCCCLXXXIII. D A T de *testes* en *epididy-*  
*mides* met onnoemlyke *vascula lymphatica* voor-  
zien zyn, hebben naauwkeurige Ontleedkun-  
di-

dige met hunne oogen beschouwd, waardoor buiten twyfel dat waterachtig vocht, 't welk overvloedig is in het *semen*, van de zelfstandigheid van de *testes* terug gebragt wordt, opdat het *semen* meer bereid en taaijer zoude zyn, niet beroofd naamentlyk van deszelfs veelvuldige *spiritus*; en het is zeer waarschijnlijk, dat door deeze vaten ook het *semen* zelfs, of grootelyks deszelfs fynste gedeelte ook in die geenen, in welke geen uitloozing plaats heeft, opgeslorpt wordt, en in het *corpus pyramidale*, als 't welk bloedig is, vermengd wordt, en waaruit de geheele *oeconomia* onzes lichaams verandert.

*Aanmerking.*

DIT verdient voornamentlyk zyne opmerking, dat by de het beginnend of toenemend voortteelend vermogen, welke in de genoegsame afscheiding van het *semen* bestaat, 'er een groote verandering in de mannen gebeurt: als de baard begint te groeijen, wordt de stem grof, en alle de deelen des lichaams worden fterk en groeijen aan: het tegendeel ziet men in *gelubden*; van welke verandering men geen andere reden kan geeven, dan dat de *spiritueuse substantie* van het *semen* met de sappen van ons lichaam wederom vermengd wordt, voornamentlyk in die, welke aan *venus* geen offerhande doen, en dat een

*Eunuchi.*



*Spiri-  
tuascentia.*

verwarming als van een *spiritueus elixir* de beweging en geestrykheid aan dezelve geeft.

§. CCCCLXXXIV. DIT moet men aanmerken, dat 'er veele kleine zenuuwtjes met de *fabrica* der *testes* gepaard gaan, die uit het zenuuwachtig net van den onderbuik te gelyk met de *vasa spermatica* in de *tunica nervea* ingedrukt zyn, en daar in verdwynen: desgelyks gaan 'er ook sommige uit de *lumbares* naar deeze deelen, welkers gebruik niet anders schynt te zyn, dan dat zy het fynste vocht, 't geen zy in zich bevatten, in het zaadachtig vocht doen invloeijen, opdat het zelve daardoor een groo-tere fynheid zoude verkrygen.

§. CCCCLXXXV. DE aanbrenge vaten brengen het in de vatachtige zelfstandigheid van de *testes* bereide zaat in de *vesiculæ seminales*, welke van achteren vast vereenigd zyn aan den hals der blaas door vliezen.

*Aanmerking.*

DAT de *vesiculæ seminales* met de *vasa deferentia* gemeenschap hebben, blykt ook genoeg daaruit, dat wanneer men met een pyp de *vasa deferentia* opblaast, ook de *vesiculæ seminales* opgeblaazen worden, en 't geen nog meer verwondering baart, dat men het gantsche gestel der *vasa lymphatica* door konstige opblaazing, namentlyk de *vasa deferentia*, zichbaar kan maaken.

§. CCCCLXXXVI.

§. CCCCLXXXVI. DE *vesiculæ seminales*, of zaad-blaasjes, zyn volgens de beschryving van *Leal Lealis*, niets anders dan *blinde darmpjes*, *Intest-* die bochten, groeven en holtens uitmaaken, in <sup>nula</sup> *cæca*. welke het *vas ejaculatorium*, 't geen van lang- famerhand breeder, holachtig en daarna we- der naauwer wordt, wanneer het omgeboo- gen in een rechten loop in deeze *intestinula* gaat naar zyn wydste bodem en van daar we- derom in een ander *uitwerpend kanaal*, 't geen *Emisso-* aan het vorige met *scherpe puntige boeken* vast- <sup>rius.</sup> gehegt, en met geen *vesicula* voorzien is; *Anguli* <sup>acuti.</sup> welke beide kanaalen *emisforii* met de *urethra* vereenigd met een *angulus obtusus* in een *cana-* *lis emisforius* eindigen, die in de *urethra* zich opent, doch deeze *vesiculæ* zyn door een vliesachtig vlies met elkanderen saamge- vlogten.

§. CCCCLXXXVII. DOCH de *vesiculæ* ont- lasten zich in het begin van de *urethra* door de *mondjes* of buizen, gelyk 'er ook teffens *Oscu-* een *caruncula* is, welke men *haane-kop* noemt: <sup>lum.</sup> *Caput* aan ieder zyde van het *caput gallinaginis* loo- <sup>gallina-</sup> *ginis. pen de twee evengenoemde buisjes, en door deeze *caruncula* wordt de geduurige *affluxus se-* *minis* belet; maar wanneer men deeze *vesicula* drukt, dan ziet men aanstonds in het begin van de *urethra* het *semen* door die *mondjes* vloeijen.*

§. CCCCLXXXVIII. HET zaad wordt bui- ten de *testis* ook nog in twee klierachtige  
li.



lichaamen afgescheiden, welke *prostatæ* genoemd worden, en die onmiddelyk aan de *urethra* en het onderfte gedeelte van den hals der blaas vastzitten; doch dit vocht is eenigzins taaijer, gelyk wit van een ey, en gelykt meer naar wey, en is als een *vehiculum* van *spiritueuse semen*, dan dat het met een *seminale* kragt voorzien is.

§. CCCCLXXXIX. DE *prostatæ* zyn een *Glandu-* foort van *vaatachtig: klieren*, en hebben de *lae con-* grootte van een kleine noot: elk heeft voor 't *glomera-* minste zeven *vascula secretoria*, welke het *tæ.* vocht omtrent de *crista galli* in de *urethra* brengen, en hebben zulke wyde openingen, dat men 'er varkens borstels in kan fteeken. Sommige der Ontleedkundigen zyn van oordeel, *Valvulae.* dat deeze *ductus* met *klapoliezen* voorzien zyn, welke beletten dat dit vocht zo gemaklyk tegen wil en dank, en onverwagt uitloopt.

§. CCCCXC. BEHALVEN deeze grootere *prostatæ* worden 'ernog twee kleine gevonden, die naauwlyks de grootte van een erwt hebben, en welke naast aan de grooten leggen, en onlangs eerst van *Couper* ontdekt zyn: zy fchynen benevens de grootere *prostatæ* dit gebruik te hebben, dat zy namentlyk een ze- *Lympha-* ker eenigzins dikker *waterachtig* vocht affchei- *ticus.* den, welke het *spiritueuse* gedeelte van het zaad, dat uit de *vesiculæ* naar de *urethra* vloeit, omvat, en als met een bekleedzel bedekt, om dat het eensdeels niet aanftonds vervliegen

zou-

zouden, en anderdeels ook opdat het onder zodanig *vehiculum* des te gemaklyker in de holte van de *Lyfmoeder* voortgedreeven zoude *Uterus* kunnen worden.

*Ziektekundige Beschouwing.*

§. CCCCXCI. ONDER de ziekten der deelen, die tot de voortteeling strekken in het manlyk geslacht; is 1.) de al te groote *uitspanning* van het *scrotum*, 't welke door *Expansio* een *hernia intestinalis* of *enterocele* van een aanmerkelijke grootte gebeurt, welke dikwyls de grootte van een menschen hoofd overtreft; door welke al te groote uitspanning het *panniculus carnosus membri* zelfs terug getrokken wordt, opdat deszelfs uitspanning zo groot niet zoude zyn.

§. CCCCXCII. 2.) DE *waterbreuk* of opspanning van het uitgestorte water in het *scrotum*, 't welk of uit de geborstte water-vaatjes geschiedt, of in een *waterzucht* uit de holte van het *abdomen* neerzakt, en tusfchen het *scrotum* en de *tunica vaginalis* zit; zelden wordt deeze zonder *sectio* weggenoomen, 't welk nochtans in *ascitici* niet buiten gevaar is.

§. CCCCXCIII. 3.) DE *jeuking* van het *scrotum* met zeer heete uitberstende *puisjes* is een kwaal, die niet zelden aan oude lieden, *scorbutici* of met de *lues venerea* besmet zynde overkomt.

§. CCCCXCIV.



§. CCCCXCIV. 4.) DE *inflammatio scroti* en de daar uit voortkomende *sphacelatio*, welke op kwetzuuren en zwaare *contusien* volgt of in *scorbutici* of *cachectici* ontstaat. Somtyds komt zy ook in kleine kinderen na een *erysipelas scroti* voor.

*Aanmerking.*

HET is aanmerkenswaardig, dat het door een *sphaceleuse* bederving verteerde *scrotum* gewoon is wederom aan te groeijen, 't welk wy eenige reizen gezien hebben, en van *Hildanus* ook opgemerkt is.

§. CCCCXCV. ONDER de Ziektens, waar mede de *testes* aangetast worden, heeft byna derzelve *tumor* de eerste plaats, welke dikwyls groot genoeg is en zo groot als een vuist, verzelt met een hevige scherpe pyn, en welke uit verscheidene oorzaken voortkomt: behalven de uiterlyke zo kan de kwaalyk geneezene *lues venerea* of terug gedrevene *bubones venerei* stof en oorzaak van deeze *tumores* zyn: somtyds worden ook met dit zelve *cachectico-scorbutici*, *hypochondriaci* gekweld, wanneer de *dyscrasia* van 't bloed, en de vochten al te lymig en taay zyn, en de *lymphæ seminalis* door omwegen en kleine kanaaltjes in de *testes* een gebrek krygt, *glutineus* wordt en langfamer voortloopt.

*Viscidus.  
Mæandri.*

§. CCCCXCVI. DE *scirrhus testium*, daar een verzuimde en niet aanstonds in 't begin terug ver-

verdreven *tumor* eindelyk in overgaat; want door langdurendheid des tyds hangen de vochten zo vast en opgepakt in die zeer kleine vaten, dat zy een steen in hardigheid gelyken, en dit ongemak kan naauwlyks geneezen worden, tenzy men door affnyding de *testis* wegneemt.

§. CCCCXCVII. SOMETYDS worden de *testes* ook *geinflammeerd*, 't welk nochtans zelden van een inwendige oorzaak geschiedt, maar meest door een *contusie* of groote kwetzing van buiten veroorzaakt wordt; niet zelden eindigt zy in *absces*, waarby een *febris fatis acuta* en *continua* komt, over welke zaak men Waarneemingen kan vinden in *M. N. C.*

§. CCCCXCVIII. DE *tumor* van de *vasa spermatica* gebeurt dikwyls in kinderen, en ook by oude lieden, en komt daaruit voort, omdat het bloed traager door de *venæ* terug komt; want wegens derzelve *perpendiculaire* legging, en kromme saamgevouwe bochten, welke deeze *venæ* maaken, zo klimt en loopt het bloed langzamer voort; wanneer deeze *tumor* grooter wordt, en ook het lichaam van de *testis* aantrekt, dan noemt men het een *hernia varicosa*; In con-  
 deeze valt zeer dikwyls voor in bloedryke *me-* sensum  
*lancholici*, en die geenen, die een zittend leven trahere.  
 lyden, als ook die een onbehoorlyke levens manier hebben en geen aderlaatingen laten doen.

§. CCCCXCIX. DE *hernia carnosa* of liever *fun-*



*fungosa* komt ook voort, doordat de *testis* of liever derzelve vaten kwaalyk gesteld zyn, *Tunicae.* wanneer het *succus lymphaticus* tusfchen de *vliezen* der *testis* of *epididymides* ftilstaande en faamgegroeit in een *fungus caro* overgaat, 't welk fomtyds in een kwaadaardige *zweer* ver-aart, als wanneer 'er ook maar een eenig hulpmiddel overfchiedt, namentlyk door het zelve af te fnyden.

*Tumor.* §. D. EEN *hernia inguinalis* is een gezwel in *Inguen.* de *liezen* boven het *scrotum*, alwaar de *vasa spermatica* naar het zelve neerdaalen door de *tendines* der onder-buik fpieren, 't geen door een al te fterk uitgespannen *lamella* van het *peritonæum* veroorzaakt wordt, onder het welk de vaten loopen, door een gedeelte van het daarzittende *intestinum ilei*, en dus wordt voornaamelyk in de teere en kinderlyke leeftyd deeze *hernia* zeer gemaklyk geneezen.

§. DI. 'ER ontftaat een *hernia intestinalis*, wanneer 'er nog een grootere verwyding en uitfpanning in de *tendineufe* fpierrachtige zelf-ftandigheid en in het *peritonæum* zelfs gefchiedt, waaronder de *vasa spermatica* heen loopen, waardoor 'er een grooter gedeelte van het *ileum* in den bodem van het *scrotum* zakt, en door deeze toeneemende verwyding daalt byna de helft van de *intestina* buiten het *abdomen*, zodat het *scrotum*, wanneer fomtyds ook de fpierrachtige *tendines* aan ftukken breeken, de grootte van een manshoofd heeft. Men kan de

de grootte van deeze breuk beletten door be-  
 hoorlyke *breukbanden*, en ook zelden wordt <sup>Subli-</sup>  
 deeze breuk geneezen door het snyden, wan- <sup>gacula.</sup>  
 neer het ongemak lang geduurd heeft; echter  
 moet men deeze *operatie* doen, en met zekere  
*konstgreepen* volvoeren, om niet genoodzaakt <sup>Enchei-</sup>  
 te zyn de *testis* uit te snyden, of den patient <sup>refes.</sup>  
 aan één zyde te *ontmannen*. <sup>Castrare.</sup>

§. DII. ONDER de ziekten, die in de *zaad-* <sup>Semen</sup>  
*bereidende* deelen voorkomen, heeft byna de <sup>confi-</sup>  
 eerste plaats de *pollutio nocturna*, een niet on- <sup>cientes.</sup>  
 gewoon ongemak, en 't geen voornamentlyk  
 dikwyls in ongetrouwde voorvalt, wanneer  
 zy op hun rug leggen, en een *opbruizing* en <sup>Ebullitio.</sup>  
*drift* in 't bloed der deelen van den onder- <sup>Orgas-</sup>  
 buik hebben, wegens het zittend leven, het <sup>mus.</sup>  
 gebruik van sterken drank en geile gedachten  
 of droomen: het zelve ontstaat van het groot  
 verlies der *tonus* van de *vesiculæ seminales*,  
 wanneer zy of eerst al te *magtelos* zyn, <sup>Atonia</sup>  
 zodat daar het opgepropte *semen* stilstaat, en <sup>laborare.</sup>  
 deeze *vesiculæ* opvult; daarna worden zy door de  
 al te groote kwantiteit en uitzetting van het  
*semen*, wanneer zy te sterk uitgespannen wor-  
 den, geprikkeld en aangezet, om zich sterker  
 samen te trekken; waardoor dan het *semen*  
 voortgedreeven wordt.

§. DIII. DE *gonorrhoea benigna* is een geduu-  
 rig toenemende en *onwillige* zaadloozing, en <sup>Pollu-</sup>  
 die over dag ook geschiedt, wegens de groo- <sup>tio.</sup>  
 tere uitspanning der *vasa spermatica* en *vesiculæ*



*seminales*, waarom het zaad buiten dat 'er een uitwendige oorzaak by komt, ook uitloopt.

§. DIV. 'ER is nog een andere *gonorrhoea*, die men een *kwaadaartige druipert* noemt: deze is ook een onwillige zaad-vloeijing in wakende menschen; doch deze ontstaat meest uit de *invreeting* en verzweering der *visculæ seminales*, doch voornamentlyk der *prostatæ*, wanneer het aldaar zynde *water*, 't geen door een venerische besmetting aangedaan is, bedorven wordt, en een verrottende aard krygt, waaruit veelmaals verrot en etterachtig *semen* met verscheide kleuren en dikwyls met bloed beverfd loopt.

## XVII. HOOFDSTUK.

### VAN DE MANLYKE ROEDE.

Mem- §. DV. DE *Manlyke roede* heeft zyn  
brum vi- plaats in het voorste gedeelte  
rile. van den onderbuik, opdat de vereeniging tusfchen man en vrouw gemaklyker zoude kunnen geschieden; deszelfs zenuw-en *tendineuse wortels* hegten zich zelfs zeer vast in de banden van het *os pubis*.

Radices.

Liga-  
menta.

§. DVI. TEN aanzien van andere dieren, is het zelve in den mensch zo lang niet, omdat de menschen niet gelyk de beesten zich van agteren met elkander vermengen, maar over

over en weder elkander omhelzen: het is in de manlyke jaaren een span of maat van twaalf vingeren breedte lang, en heeft een *plat-Teres. ronde* gedaante, behalven in het bovenste gedeelte, 't welke de *rug* genoemd wordt, alwaar *Dorsum* het eenigzins breeder is.

§. DVII. TEN opzichten van de zelfstandigheid, is zy noch beenachtig, gelyk in een hond of wolf, noch niet altyd *styf*, want dan *Rigidus.* zoude zy een groot beletzel en ongemak veroorzaaken, noch *kraakbeenig*, want dan zoude *Cartilagineus.* het zelve niet uitgezet kunnen worden, noch zenuuwachtig, omdat het niet opgeblaazen zoude kunnen worden, noch het zelve bestaat ook uit een vleezige zelfstandigheid, maar heeft een geheel byzonder gestel en maakfel, hoedanig men in geene deele van 't lichaam vindt. Het bestaat namentlyk uit drie holle en *caverneuse* buizen, twee grooter en een kleinder, 't geen onlangs door *Ruyfch* ontdekt is: deeze *folliculi* wierden van de Oude *corpora nervosa*, of zenuuwachtige lichaaamen genoemd, welkers derde of kleinste onder de *urethra* verborgen leggende, voor 't grootste gedeelte het lichaam van de *glans* uitmaakt.

*Aanmerking.*

DEEZE *corpora cavernosa* komen voort van het onderste gedeelte van de *schaambeenderen*, *Ossa pubis.* en worden met een eigen vlies bekleed en maa-



ken het voornaamste gedeelte van de roede uit, 't welke na vooren onder de kroon van de *glans* langzaam verminderende, en de binnenste zelfstandigheid der *glans* uitmaakende, eindigt.

§. DVIII. De *corpora nervosa* of *cavernosa* zyn hol, of worden samengesteld uit onnoemelyke *Cellulae blaasjes*, omdat wanneer men met een pypje de *penis* met wind opvuld, deeze blaasjes zeer opgeblaazen worden. Zy worden natuurlyk met bloed vervuld, en door deszelfs toevloeiing worden zy uitgezet, 't welk in de oprechting der *roede* geschiedt: als het bloed uitgedrukt wordt, of dat het zelve naar de vaten te rug gaat, dan worden zy wederom flap.

*Penis.*

§. DIX. Tot deeze *cavernulae* gaan ook zeer veele aderen en slag-aderen: deeze komen uit de *coeliacæ internæ* en verdeelen zich in onnoemelyke haar-aderen, welke vereenigd zynde, eindelyk de kleine aderen voortbrengen: in deeze echter zyn onnoemelyke holle celletjes, welke met elkander *communiqueeren*, die zich alle ontlasten in een groote *venæ*, die door de *dorsum penis* loopt, en wel omtrent de *prostatæ* in twee takken verdeeld wordt, welke eindelyk in de *venæ* van het *corpus cavernosum minus* leggen tegen de *musculi acceleratores*.

*Aanmerking.*

'ER leggen *klapviezen* tegen de *venæ*, wel- *Valvulae*  
ke beletten, dat het bloed minder uit de tak-  
ken naar den stromk of grootere tak gemak-  
lyk voortgaat: doch de vaten, die in het  
*dorsum penis* leggen, houden deeze order en  
legging, dat de *venæ* in 't midden, de ze-  
nuw, welke uit de *plexus pelvis*, en de *nervus*  
*cruralis*, en het *ultimum par* voortkomt, en de  
*arteria* aan de zyden leggen.

§. DX. HET uitsteekend gedeelte van de  
*glans* noemt men *Corona*, alwaar zeer veele  
kleine *glandulae* zyn, waardoor het geschiedt,  
dat de kwaardaardige *venerische besmetting*, *Miasma*.  
welke in eene vuile vereeniging zeer gemak-  
lyk in deeze kliertjes dringt, een zeer moei-  
jelyke *exulceratie* veroorzaakt.

§. DXI. DE *glans* wordt met een *capsula*  
bedekt, 't welk men *præputium* noemt, 't geen  
uit een verdubbeling van het *cutis* bestaat:  
het zelve eindigt in het begin van de *corpo-*  
*ra nervosa*, en wordt door middel van een band,  
welke *frenulum* genoemd wordt, met de *glans*  
vastgehegt.

§. DXII. MEN vindt in de *roede* twee paar *Penis*.  
spieren; het eerste paar heeft zyn oorsprong  
van het *Heupbeen*, welkers *fibræ* in het dikkere *Ocoxen-*  
zenuwachtige vlees van de manlyke roede *dicis*.  
eindigen, en veel tot de opregting van *Erectio*.  
de roede helpen, waarom zy ook *musculi erec-*



*tores* genoemd worden : het tweede kleinder paar komt van de *Sphincter ani*, en deeze twee spieren van binnen met elkander vereenigd zynde, loopen schuins in het onderste gedeelte van de *urethra*, en eindigen beide in de *membrana* van de *corpora crassa*, en worden daarom *verwyders* der *urethra* genoemd. (\*)

*Aanmerking.*

DE Graaf, welke het best van allen over de deelen, die tot de voortzeling dienen, geschreeven heeft, zegt te regt, dat deeze spieren in geene deelen de opregting en opzwellling der *penis* te weeg brengen, wyl deeze niet zo zeer van de uitspanning der spieren, als wel van de grootere aan- en invloeiing van het bloed in de *corpora Cavernosa*, en van deszelfs ophouding afhangen; doch echter is 'er geen twyfel of zy brengen *indirect* ook iets toe tot deszelfs uitzetting, omdat namentlyk, wanneer de spieren uitgespannen en als opgeblazen zyn, de bloedvaten te samen gedrukt worden, welke saamgedrukt zynde, keert het bloed niet schielyk te rug, maar eenigzins stil-

(\*) Of men kan volgens de hedendaagse manier deeze twee paar spieren in *Erectores* en *Acceleratores* verdeelen: de *erectores* zyn die, welke op de *corpora cavernosa, majora* werken, en de *acceleratores*, die als boven by Hofman, *dilatatores urethrae* genoemd worden, werken op het *corpus cavernosum minus*.

stiltblyvende staan, zet de *penis* uit: 't is ook niet waar, dat de spieren korter wordende, de *urethra* verwyden, maar veel eer drukken zy deeze toe, en maaken dezelve naauwer: want wanneer de spieren van den buik dikker, en uitgespannen worden, 't geen in de *vermenging* geschiedt, dan wordt de *Ure Coitus. thra* samen gedrukt, welke saamgedrukt zynde het *semen* uitwerpt. (\*)

§. DXIII. DE *urethra* bestaat uit twee vliezen, welkers eene en binnenste zeer dun, gevoelig is, waarmede ook de *glans* bedekt wordt: het ander en buitenste is vleefiger en uit dwarsche *fibræ* saam gevlochten, 't welke veel helpt tot de uitwerping des zaads en pis.

§. DXIV. DE *urethra* bestaat ook uit een hol *ligchaam*, waar tusfchen vliezen leggen, *Corpus* welk *lichaam* tusfchen het einde van de *pro-cavernosum. stata* en de vereeniging van de *corpora nervosa* zeer dik is, en daarna dunder wordt; daarna wordt het binnen in de *penis* wederom dikker, en buigt zich naar buiten, en in het midden van de *urethra* laat zy een opening

(\*) Men kan de aanmerkingen over dit gevoelen van de Graaf, in deeze aangehaalt, en over verschillende gevoelens en dwaalingen van anderen wegens de oprechting der *penis* in de *Annotationes Academicæ* Cap. XVIII Lib 2. van den hoog beroemde en onsterflyken B. S. ALBINUS leezen.



ning in de *glans*, welkers buitenste sponsachtige oppervlakte zy maakt.

§. DXV. DE *urethra* ontfangt in deszelfs holte het in de *Glandulæ Cowperianæ* bereide witte taaije vogt, voornamentlyk wanneer het lid flap is, namentlyk opdat het zenuwachtige vlies zelfs tegen de fcherpheid der pis beschermt en beveiligt wordt.

§. DXVI. DE buitenste oppervlakte der *glans* wordt met een zeer dun vlies bekleed, waar onder de zenuwachtige en zeer gevoelige *Tepeltjes* verborgen leggen, welke de wel-  
*Papillæ.* lust vermeerderen, waaronder eindelyk een wonderlyk *celluleus vlies* verborgen legt, waar over men RUÏSCH kan nazien in *Theſaur. Anatom.* P. X. p. 43.

§. DXVII. ALLE de deelen van de *penis* zyn van een zeer gevoelige aard, waarom deeze zelfde deelen in 't geheel geen fcherpe, warme, geestryke vlugge dingen, gelyk de olien van ſpeceryen, of den overgehaalde brandewyn, verdraagen kunnen, maar waardoor integendeel een groote pyn veroorzaakt wordt.

### Genees- en Heelkundige Beschouwing.

§. DXVIII. I.) HET waterachtig ge-  
*Turou aquosus.* zwel van het *Scrotum* en *membrum virile* verdient onze beschouwing, 't welk van een verbaasde grootte is, wegens het verzamelde water

ter tusfchen de verdubbeling der vliezen, of *cutis* en het binnenfte vlies, 't welk zeer dikwils een moeylyk *symptoma* in *hypochondiaci* gewoon is te zyn, omdat het niet zelden de uitloozing der pis belet.

§. DXIX. 2.) DE *inflammatio scroti*, welke ligt in *Sphacelus* overgaat, voornamentlyk in *Cachectici* en *hydropici* door het onverzigtig verrigten van de *Paracenthesis*.

§. DXX. 3.) DE zeer heete of brandende *pustulae inflammatoriae*, welke niet alleenlyk in het *scrotum*, maar ook in de *penis* voorvallen, en zyn in die geene, die door een *Lues venerea* besmet zyn, niet zonder gevaar, en moeylyk te geneezen, wanneer de lighaamen tevens fcheurbuikig en *cachectisch* zyn, en fchynt ook gewoonlyk een voortbrengzel te zyn van een *venerifche* besmetting, welkers grootfte kracht bestaat in de *lympa* tot een rotachtig *stremfel*, dat zeer *corrosif* is, te veranderen. *Coagulum.*

§. DXXI. DE *inflammatio penis* komt vervolgens ook uit een *vuile vermenging*, en is niet zonder pyn en gevaar, fomtyds gaat de *Impurus concubitus.* zelve in *abces* en *exulceratie* over.

§. DXXII. DE onfteking der *glans*, die met een wreede pyn en dikwils een *erosio* gepaart gaat, en waarby zich, zoo men de kwaal niet voorkomt, een *Sphaceleuse* bederving voegt, en gewoonlyk, de vrugt of gevolg van een *vuile vermenging*, en wordt ook *cancer penis* of een *Sinker* genoemd.



*Pustulo-  
sa erosio.*

§. DXXIII. 4.) DE *puistagtige* en stinkende verrottende *invreeting*, veroorzaakt worden de door het taaije *stremfel*, de plaats bestaande, welke 'er is tusfchen het *præputium* en de *eminentia glandis*, wegens het zeer groot getal van de kleine kliertjes, die rontom het onderste gedeelte der *glans* leggen, en welke plaats door het *fermentum ulcerosum* en *venereum* geërodeert is.

*Mcm-  
brum.*

§. DXXIV. 5.) BESLAAT ook de geheele *roede* een aanmerkelyk gezwel met pyn, ontsteeking en roodheid, 't welk desgelyks in de met de *Lues venerea* besmette niet zelden gebeurt.

*Excres-  
centia.*

*Caro car-  
nosa.*

§. DXXV. DE *uitwasfen* van sponsagtig of zelfs *wild vleesch*, *ganglia*, vratten, harde *veeeltheden*, en die in door *Lues venerea* besmette lichaaamen, en tegelyk in *scorbutici* en voornamentlyk *onreine* in verrotting overgaan, wanneer de *kwikmiddelen* niet behoorlyk toege diend en deeze niet minder kwaalyk behandelt zyn, vallen voornamentlyk in de deelen van de *roede* of *corpora nervosa* van de *urethra* gewoonlyk voor, en gaan met de zwaarste *symptomata* verzelt; alzo zy door *invreeting* en *verteering* de vaten dier deelen openen, de vogten beweegen, en den vryen loop der pis door de *urethra* beletten, en hier en daar *fistuleuse* en *calleuse* kanaalen veroorzaaken, waardoor de pis met den *etter* uitloopt.

*Febor*

§. DXXVI. 'ER groeijen ook niet zelden

*brat-*

vratten of *fungeuse* uitwasfen in de *urethra* zelfs, *Verrucæ*, die door het beletten van den vryen invloed der pis groote moeyelykheeden veroorzaaken, en niet dan voorzichtig en ongemaklyk weggenomen of met brandyzers afgebrand kunnen worden.

§. DXXVII. DE *Rigiditas penis* of pynlyke uitspanning, die geen vermaak ter weereld aanbrengt, geschiedt in een *Lues venerea*, of in een fcheurbuyk door een *spasmus* in de *tunicæ*, welke de *corpora nervosa* bekleeden, waaruit wegens de krampagtige zamentrekking de teruggang van het bloed door de *venæ* belet wordt, en dus blyft de roede opgeblaazen.

§. DXXVIII. 'ER komen ons verscheide ongemakken in het *præputium* voor, onder welke men eerst de *phimosis* moet stellen, dat is de belette aftrekking van het *præputium* van de *glans*, welke geschiedt of wegens de zaame-trekking of vernauwing, of wegens een groot gezwel der *glans*, of wegens de uit zich-zelfs al te sterke vereeniging van het *præputium* met het *frenulum* onder de *glans*, gelyk HIL-DANUS met voorbeelden bevestigt *Cent. III.*

§. DXXIX. DE *paraphimosis* is een ontblooting van de *glans* door het afgetrokken *præputium*, zodat het niet wederom terug over het zelve kan getrokken worden, en gebeurt dikwils door een geweldige opspanning waardoor dat het *præputium* met groot geweld van het *frenulum* losgebrooken, of door een *inflammatie*  
op-



*Ulcuscu-  
la puru-  
lent.*

opgezwollen of met *vuile zweertjes* bezet is.

*Liqui-  
dum ner-  
veum.*

§. DXXX. DE *defectus Erektionis*, die een onvermoogen aanbrengt, ontstaat of uit een *paralyfis* der spieren, die de roede opregten, of wegens den minderen aanvloed des bloeds wegens de al te sterk saamengedrukte vaten, of om dat 'er geen *zenuwnogt* invloeit, en dit ongemak komt meest de kragtelozen menschen over, die of door ouderdom of ziekte verzwakt zyn, voornamentlyk *Cachectici*.

*Impoten-  
tia.*

§. DXXXI. Nog een ander soort van onvermoogen komt 'er van uitwendige oorzaken voort, namentlyk, wanneer de *corpora nervosa*, en de spieren der roede door kankeragtige verzweeringen en *glanglia* verteert zyn, wanneer ter oorzaken van pynelyke *spasmi* de roede naar boven omgekruld, of door het verkorten der spieren naar beneden omgeboogen wordt.

§. DXXXII. DE *satyriasis*, of geduurige *Venerische* aanhitzing, heeft zyn oorsprong uit het zeer scherpe *semen*, waardoor de *Vesiculæ seminale* en de *ductus genitales* sterk geprikkeld worden, waardoor somtyds 'er een ontydige en schielyke uitschieting van zaad plaats heeft, voornaamentlyk in ongevoeliger en onvermogene menschen, welk ongemak ook gewoonlyk een onvermogen om voor te teelen naar zich sleept.

§. DXXXIII. DE *hoemorrhagia penis* is wel een zeldzaam ongemak, echter ondervindt men

men het zelve in bloedryke menschen, en wanneer de *hæmorrhoidale* vloed opgestopt is, en waarom het bloed of uit het *orificium* der *urethra* of ook uit de *extremities* van het *præputium* loopt.

§. DXXXIV. DE kwetzuuren, die de roede toegebracht worden, laten zich zo gemakkelijk niet geneezen, eensdeels wegens de sponsagtige zelfstandigheid der *corpora nervosa*, en anderzins wegens de wydere bloedvaten, die aan gevaarlyke bloedstortingen onderhevig zyn. De opstopping der pis, die uit een daar zittende steen veroorzaakt wordt, is gevaarlyk, zo zy niet door de kunst weggenomen *Suctio* wordt, 't welke of door zuiging of opblaazing *Inflatio* der *penis*, en drukking of ook door voorzigtig snyden, geschiedt.

## XIX. H O O F D S T U K.

### VAN DE VROUWLYKE TEELDEELEN.

§. DXXXV. DEZE onderscheidt men gewoonlyk in uit- en in- *Uterus*. wendige deelen: waaronder de *Lyfmoeder* de voornaamste plaats heeft, welke in het hol legt, dat men *Bekken* noemt, 't welk in *Pelvis*. vrouwen breeder dan in mannen is; want in vrouwen gaat het *os sacrum* meer buitenwaarts, en het *os coccygis* komt meer agterwaarts terug, en de *osfa innominata* staan verder van malkanderen, en desgelyks loopen ook



ook de onderste randen van 't *os pubis* meer naar buiten.

§. DXXXVI. DE *uterus* legt tusfchen het *intestinum rectum*, 't welk van agteren, en tusfchen de *vesica urinaria*, die van vooren geplaatst is, waaruit het bekende spreekwoord voortkomt: *inter stercus et urinam hominem nasci*, dat de mensch tusfchen den drek en pis voortgebracht wordt.

*Aanmerking.*

*Exte-  
nuari.* 't Is aanmerklyk, dat, fchoon de *uterus* ter tyde van de zwangerheid verwonderlyk uitgezet wordt, nochtans deszelfs dikte niet *verminderd* wordt, om deeze reden, omdat byna alles in deezen ftaat buiten gewoonte door den grooteren toevloed van vogten uitgespannen zy, 't welke na de verlosfing, en ook in maagden niet gefchiedt.

*Vagina.* §. DXXXVII. DE *uterus* heeft een peersgelyke gedaante; deszelfs bodem is breeder, de hals naauwer, en legt naast aan de *fchede*: ten aanzien van deszelfs grootte zo is zy in maagden weinig grooter dan een middelmatige peer, maar in zwangere vrouwen wordt zy veel grooter, en in de eerfte maanden komt zy zeer na aan de grootte van de pisblaas: doch daarna wordt zy by vervolg van tyd wegens de vergrooting van de *nageboorte* en van het kind zeer uitgezet, en krygt een zeer groote holte.

§. DXXXVIII.

*Secundi-  
nae.*

DXXXVIII. IN oude wyven wordt zy zoodanig faamengetrokken , dat in deszelfs holte byna geen boon kan leggen.

DXXXIX. DE holte van den hals is langwerpig , en zeer vernaauwd , en heeft van binnen een opening die na beneden ziet: 't zelve bestaat uit een zeer vastfaamen gepakt weefzel , in maagden kan men 'er naauwlyks een pen insteeken , doch in baarende wordt het verwonderlyk uitgespannen.

§. DXL. DE *uterus* bestaat byna geheel uit een vatagtig ylies en een vezelagtige zelfstandigheid , die zeer gemaklyk uitgerekte kan worden en *elastiek* is.

*Aanmerking.*

'ER is byna in het gantsche lichaam geen deel , dat uit zo groote *elastike* vezelen en vliezen , en vaten bestaat , en die zo zeer uitgerekte en zaamen kunnen getrokken worden , dan de *lyfmoeder*: want het is verwonderlyk en byna ongelooflyk , dat een zo klein lichaam door een kind , of fomtyds door twee- of drielingen , en door derzelve *nageboorte* *Uterus.* zo zeer uitgezet kunnen worden , dat zy gemaklyk daarin leggen kunnen: doch na de verlossing trekt zy zich wederom zoodanig faamen , dat zy dikwils in korten tyd haare vorige gedaante en grootte wederkrygt. *Secundi-næ.*

§. DXLI. DE *uterus* krygt *Slagaderen* uit de *Arteria*;  
*Sper-*



*Spermaticæ* en *Hypogastricæ*, en de menigvuldige *iliacæ internæ*, welke verwonderlyk met veele *Anastomoses* onder malkanderen in de gedaante van een *plexus reticularis* vereenigd zyn, welke door den geheelen omtrek en de deelen der lyfmoeder loopen.

§. DXLII. Waarby nog komen de slagaderen, die uit den tak, namentlyk de *iliaca externa*, welke in een *arcus* of bogt naar boven omgeboogen zynde door de liezen boven uit de *dijen* na het *pelvis* gaan, en aan de zyde leggen.

*Aanmerking.*

DE *vasa spermatica* loopen niet alleenlyk naar het *eyernest*, maar daalen ook door de *vleermuisvlerk* gelykende banden na den bodem der Lyfmoeder, doch de *vasa Hypogastrica* voeren meest het bloed na het binnenste gedeelte der *uterus* en deszelfs *bals* en *scheede*.

DE wederzydse *Anastomoses* en vereeniging deezer vaten, en bygevolg derzelver onderlinge *communicatie* blykt ook daaruit, dat, wanneer men de *vasa spermatica* opblaast, niet alleen de geheele zelfstandigheid van de Lyfmoeder, maar ook zelfs de *vasa hypogastrica* opgeblaazen worden; en dus gaat ook de ingeblaaze wind over en weder uit de *hypogastricæ* in de *spermatica* over, en zet dezelve uit.

§. DXLIII. DE aderen, welke dezelfde

oor-

oorsprong hebben, namentlyk of de *spermaticeæ* of de *hypogastricæ*, vereenigen zich ook onderling met elkander, zodat de eene opgeblaazen zynde, de overige ook opgeblaazen worden, en het bloed uit de eene door alle de overige terug kan komen.

*Aanmerking.*

OMTRENT de zelfstandigheid van de lyfmoeder is dit opmerkenswaardig, dat de vaten zich door dit gedeelte krom geboogen en gedraait, en op de wyze van wyngaardsranken ver- *Pampini-*  
spreiden, waardoor het bloed aldaar traager *formis.*  
omloopt, opdat de vaten door de menigvuldiger en traager invloeiing van het bloed uitgezet en verwyd zouden kunnen werden.

§. DXLIV. DE zeer menigvuldige gedraaide buiging der vaten van de lyfmoeder brengt te weeg, dat het bloed in de lichaa-  
men der Vrouwen, welke zeer onderhevig  
zyn om het in grooter menigte voorttebrengen,  
een zekeren *omweg* zoude neemen, en omdat *Diverti-*  
de grootere *bykomst* van bloed deeze vaten *culum.*  
meer dan andere verwyd, en ook de klein- *Affusio.*  
deren, welke naar de *fundus uteri* loopen, al te  
veel opvult, en bygevolg uitzet, waardoor  
het geschiedt, dat het bloed zelfs alle maan-  
den in de holte van de *uterus* loopt, en des-  
zelfs opening glad en losgemaakt wordt en het  
bloed uitloopt, en dus het bloed tot zeer  
ONTLEEDK. *Verz. I. verv. XXII.* F groot



groot nut voor de vrouwen verminderd wordt.

*Aanmerking.*

WEGENS deeze buiging en slangsgewyze looping der vaten kan derhalven het aanvloeiend bloed, dat naar de lyfmoeder loopt, en het daarna toegevloeide bloed zeer moeijelyk door de perpendiculaire weg te rug keeren, waaruit wegens den traageren loop, de vaten der lyfmoeder uitgezet, en eindelyk geopend worden; want men heeft door ontleedkundige ondervinding bevestigd gevonden, dat *Menses* ten tyde, dat de *stonden* vloeijen, de *uterus* zeer opgezwollen en uitgezet is.

§. DXLV. Tot het voortbrengen van meerder bloed in vrouwen als mannen, fchynt derzeiver flap en sponsachtig gestel der vaten en vezelen veel toe te brengen; want alle vaten, zowel *sanguifera*, *lymphatica*, en *adiposa*, als alle de vliezen, zyn in vrouwen flapper; waarom ook niet alleen wegens de flappere afmentrekking en weerstand het bloed en de vogten langzaamer voortloopen, maar ook de doorwaasfeming minder, en de warmte en polslag zo groot niet zyn; hierom werden de vogten, die in de mannen door de groote beweging en warmte *gerefolveerd* worden, opgehoopt, en dus worden de holligheeden, bloedvaten, en celletjes gemaklyk met vogten en bloed opgevuld, en daarom ondervindt men

men ook meer vet in vrouwen, dan wel in mannen; en met een woord, de vrouwen zyn bloedryker dan de mannen, en wegens deeze bloedrykheid zyn zy ook meer onderhevig aan ziekten, die hier uit voortspruiten, dan de mannen zelfs, 't geen ons ook de opstopping der maandelyksche stonden klaar toont.

§. DXLVI. AAN den bodem der lyfmoeder zyn twee *Kegel-wyze* gedraayde kanaalen vastgehegt, welke wegens derzelver gedaante *Trompetten*, en omdat zy door FALLOPIUS ontdekt zyn, *Tubæ Fallopianæ* genoemd worden. Zy zyn omtrent zes vingerbreed lang, en derzelver eene eynde is zeer naauw, en heeft zyn opening in de holte der lyfmoeder, en men kan 'er een dunne pen insteeken; doch het ander einde, 't welk in 't *abdomen* zich opent, is wyder, en met veele *franges* als spiertjes vercierd, en dit hegt zich aan het *eyernest*. Dat door deeze *tubæ* de eytjes uit het naar de *uterus* overgevoerd worden, is een gemeen gevoelen, en wordt door de ondervinding grootelyks bevestigd, alzo men zeer dikwils in de holligheid deezer *tubæ* een eytje gevonden heeft.

§. DXLVII. Zy bestaan uit twee vliezen, welkers buitenste met het *peritonæum*, 't binnenste met de zelfstandigheid der lyfmoeder vereenigd is, en is in menschen met veel vogt bezet, doch in dieren heeft het veel *cellulæ*, welke in viervoetige dieren de



*Cornua uteri.* derhoorns , en in vogelen *eyerleiders* genoemd worden.

*Oviductus.*

§. DXLVIII. De twee *eyernesten* worden door middel van sterke *banden* met de *lyfmoe-*  
*Ligamenta.* der vereenigd; de *ovaria* zyn *ronde* lichaamen , die een ongelyke oppervlakte hebben en in een sterk vlies beslooten zitten , welke haare vaten ontfangen van de *Arteriæ spermaticæ* en ook *hypogastricæ* , welke , eer zy in de *ovaria* gaan , dusdanig vereenigd worden , dat zy een vat als een net zaam gevlogten schynen te maaken ; men ziet daar ook veele *vasa Lymphatica* , en vindt daar zeer dikwyls veelvuldige *hytadides* , en deeze *eyernesten* bestaan enkel uit vezelen , vliezen , vaten en zenuwen , die onder elkanderen gevlogten zyn , en onder het vlies vindt men meer of min *ronde* blaasjes , die met een witachtig vogt vervuld zyn , 't welk door kooking op het vuur , gelykerwys het wit van een ey , hard wordt ; en deeze *ve-*  
*Calix.* *ficulæ* zyn met haar *buitenste* bekleedzel aan de eindens der kleinste vaten vastgehegt.

§. DXLIX. 't Is tot nog toe een vast gevoelen geweest , dat deeze blaasjes waarlyk eitjes waren , waarin in de eerste beginzelen van een kind beslooten zyn , welke door het *manlyk* zaat opwasfen , en het vlies van het  
*Spiritus geniturae virilis.* *eyernest* uitzetten , van waar zy na agterlating van eenige littekendjes afgescheiden zynde , van de spierachtige franjes der *Tubæ fallopiantæ* overgenoomen worden , uit welke *Tubæ* door  
be-

bemiddeling van de spierachtige vezelen zy langzaamerhand naar de holte der lyfmoeder voortgedreeven worden.

§. DL. ZOMMIGE hedendaagsche Auteurs hebben dit eyernest in twyfel willen trekken, en wel om deeze redenen, omdat de *tubæ Fallopianæ* in geene deelen met het *ovarium* vereenigd worden, maar dat deszelfs *extremitäten* twee vingerbreed langer zyn; ten anderen, omdat die lichaamen, welke eyernes-ten genoemd worden, met een sterk zenuwachtig vlies bekleed zyn, welke men niet begrypen kan, hoe het mooglyk is dat zonder pyn, ontsteeking, of verscheuring der spieren afgescheiden en het eitje uit het zelve gaan kan, en de verlaatene plaats zo schielyk geneezen worden.

§. DLI. TEN derden, schoon 'er veelvuldige *vesiculæ* in die lichaamen leggen, wanneer derzelver getal door kooking tot één gegroeit is, nochtans is ook de geheele omtrek en de hier aan vast zittende deelen, voornamentlyk de buitenste vol met dergelyke blaasjes; hierom ziet men in de *alæ vespertilionum*, *ligamenta rotunda*, desgelyks op de *vasa spermatica*, en in het buitenste vlies der lyfmoeder dikwyls een groot getal van dergelyke blaasjes, welkers vogt men door 't vuur ook kan doen zamen stollen en verdikken.

§. DLII. TEN vierden schynt liever het werk van deeze lichaamen te zyn, dat zy



tot een ftut en ftleunzel verftrekken voor de *vasa spermatica*, welke in een groot getal naar de *uterus* zelfs gaan, en daar haar bloed inftorten, en het zelve wederom terug voeren, en dus vervult zy als 't ware de plaats van 't *mesenterium*, en voldoet dezelve werking als het *mesenterium*.

§. DLIII. TEN vyfden, men kan wel in 't geheel niet ontkennen, dat men fomtyds een eytje of zelfs wel de *foetus* in de kanaalen of *tubæ* gevonden heeft, doch echter moet men toeftaan, dat het eytje uit de *uterus* veel gemaklyker naar de holte van deeze kanaalen, omdat zy zich in de *uterus* openen, kan gaan, dan dat zy hier na toegebragt worden uit de *Ovaria*, welke in 't geheel geene vereeniging hebben met de *tubæ*.

§. DLIV. TEN zesden moet men de vaten, welke naar het *ovarium* gaan met minder regt *spermatica* noemen, omdat het namentlyk zo een groot getal, en zo veel aanvoering van bloed niet nodig heeft, en alleenlyk maar ftrekke om deeze eytjes met vogt te vervullen en die te besproeijen; daarom is het noodzaaklyk, dat zy tot een ander gebruik ftrekken; doch in mannen is het geheel anders met deeze vaten gelegen, welke, omdat zy overvloedige ftof tot af-fcheiding van het zaatachtig vogt verfchaffen, hierom te regt *zaat-bereidende* of *spermatica* genoemd worden.

§. DLV.

§. DLV. TEN zevenden kan men ook geenzins gemaklyk begrypen en uitleggen; op wat manier de geestryke zelfstandigheid van het voortteelende manlyke zaad door de lyfmoeder zelfs, die zeer dik is, en niet door andere wegen, die in 't geheel geene gemeenschap of vereeniging met die zoogenaamde eyernesten hebben, in zyn volle, en weinig verminderde of veranderde kragt kan doordringen, en het eytje, dat tusfchen deszelfs vliezen beslooten is, bevrugten.

§. DLVI. MEN moet derhalven een ander *ovarium* zoeken, 't welk aan deeze ongemakken niet onderhevig is, en 't geen ook door den Alwyzen Maaker van ons lichaam binnen in de *uterus* zelfs, en wel omtrent haar binnenste hals, in alle jonge vrouwelyke voorwerpen, en die tot de bevrugting bekwaam zyn, gewrogt is.

§. DLVII. NA het afscheiden van de dunste *Tunica* ziet men duidelyk, dat hier en daar niet alleen een enkel blaasje zit, maar men ziet dezelve overal in een zeer groot getal taksgewys verspreid, en met haare *calices* aan de vezelen der lyfmoeder vastzitten.

*Aanmerking.*

DEEZE *Vesiculæ* zyn reets lang ook van anderen waargenoomen, doch zy zyn voor *Hydatides* aangezien, en namentlyk van de GRAAF



Steri-  
litas.

en MORGAGNE voor klieren gehouden, die een taay vocht afscheiden: maar veel beter is het te stellen, dat de samenstelling deezer blaasjes het waare *ovarium* uitmaakt, van welk gevoelen het eerst de ontleedkundige Heer NABOTH, een Leipziger geweest is, welke in zyne *Disfertatie* over de *onvruchtbaarheid* te Leipfig in 't Jaar 1707 in het Latyn gedrukt, dit zyn gevoelen met zeer fraaye bewysredenen bevestigt; want zo het eens *Hydatides* waren, dan zoude men dezelve ook niet in alle volwasfene, gezonde en welvaarende voorwerpen vinden, noch dezelve ook op eene zekere bepaalde plaats, alwaar zy in een zekere order leggen, kunnen zien. Desgelyks worden zy min overeenkomstig voor een vocht afscheidende *glandulae* gehouden, wyl 'er een groot onderscheid plaats heeft tusfchen klieren, die een verzameling van vaten zyn, en tusfchen blaasjes die met vocht vervuld zyn.

### *Ziektekundige beschouwing.*

§. DLVIII. ONDER de ziekten, die uit een ongemak in de binnenste Teeldeelen ontstaan, hebben byna de eerste plaats de *affectus acuti*, onder welke men vooreerst moet stellen de *inflammatio* der lyfmoeder en omleggende deelen, welke nooit zonder koorts, en ontsteltenis van alle de beweging van het lichaamlyk gestel geschiedt, en welke men kent

kent uit de pyn, hette in den omtrek van het *pubes*, en waarop meestentyds volgt dat een gewoone uitloozing van bloed, en vooral in *kraamvrouwen*, die men *kraamzuivering* noemt, *Puer-* opgestopt of gestuit word wegens veelvul-<sup>*peræ.*</sup> dige oorzaaken, meestentyds door dat men kou-<sup>*Lochia-*</sup> de vat, of ook door gemoedsbeweging, voor-<sup>*is.*</sup> namentlyk schrik, en deeze is niet zonder gevaar, zo een Geneesheer dezelve niet aanstonds met behoorlyke geneesmiddelen te hulp komt; van welk soort de aderlating op de voet, en *Diaphoretica fixiora* met *nitrosa* vermengd, en ook *infusa diluentia* en *resolventia* zyn.

§. DLIX. 2.) DE *Absces* in de *uterus*, welke meestentyds ontstaat uit een kwaalyk geneezene *inflammatie*, of ook uit een schielyke opstopping van het *sanguis menstruus*, veroorzaakt of door gemoedsbewegingen of *adstringentia medicamenta*, of door het ontfangen van een al te scherpe koude; zy gebeurt meest in lichaa- men van een sponsachtig, sapachtig, en bloedryk gestel, en men kent dezelve aan de etterachtige uitvloeijing; nochtans komt dit ongemak zelden voor, en hierop volgt meestentyds een doodelyke *uitteering* en uit *hectica* *Hectica.* *droogende koorts.*

§. DLX. 3.) EEN *verzweering* in de *uterus*, *Exulce-* wanneer 'er geduurig een stinkende stof uit-<sup>*ratio.*</sup> loopt, en deeze heeft zyn oorsprong, of uit een *scorbutische* scherpte in het *serum*, of mees-



tentyds in een onzuivere vermenging uit het verrotte *virulente corrosive miasma*, 't geen door de vaten van klieren der lyfmoeder overgenomen is: maar dan zyn 'er andere kwaadere *symptomata* mede vermengd, en 'er is te gelyk ook een *erosio* met pyn en hette in de buitenste deelen by; 'er volgen ook zweeren uit een kwaalyk behandelde *inflammatie*, of 'er vallen ook *abscessen* voor na een moeilijke verlossing en kinderbaaring, voornamentlyk wanneer men verzuimd heeft *evacueerende* en bloedzuiverende middelen te gebruiken.

§. DLXI. 4.) DE *scirrbus uteri* of derzelver gezwel, 't geen zo hard als steen is, waarvan men dergelyke gevallen kan leezen in *M. N. C. Dec. III. Anno VII. en IIX. Obs. 152. Dec. I Anno IV. en V. Obs. 56. Dec. I Anno IX. Obs. 126.* Dezelve ontstaat dikwyls na een *inflammatie*, of door een onverzichtig gebruik van *adstringentia*, of ook door koude van buiten; zy haalt een ongeneeslyke onvruchtbaarheid naar zich, en krenkt ten eenemaal de gezondheid. (\*)

*Tumor sanguineus viscidus.*

§. DLXII. 5.) EEN groot bloedryk gezwel in de lyfmoeder, namentlyk van het taaije bloed, met welke de vaten opgepropt en vervult zyn, en dit gezwel wordt somtyds zo groot

(\*) RUYSCH haalt een voorbeeld aan van een *scirrbus*, die met een groot gedeelte uit de *Pudenda* hong in *obs. Chir. 7.*

groot, dat het na een bevruchting gelykt; by vervolg van tyd echter, en door het gebruik van behoorlyke geneesmiddelen, vermindert dit gezwel, en gaat weg. Ik heb diergelyke gevallen zien ontstaan door het ontydig gebruik van *adstringeerende middelen* in een <sup>*Præposterus.*</sup> al te groote vloeijing der stonden.

§. DLXIII. 6.) 'ER vallen dikwyls groote <sup>*Stagnationes*</sup> stilstanden van water voor en gezwollen in de <sup>*aquarium.*</sup> *ovaria*, en de deelen, die tegen de *uterus* leggen, welke door de ten hoogste moeilijke terugkomst van het bloed door de *venæ uteri* en ook de *spermaticæ* en het stilstaan in de vaten, die zeer gedraaid of geboogen zyn, ontstaan, terwyl de *lymphæ* zich in de *vasa Lymphatica* afzondert, welke zeer uitgerekte zynde, groote blaazen veroorzaaken, welke de Geneesheeren *Hydatides* noemen, en openbarstende de holte van den buik met een groote meenigte water vervullen: by de Italianen wordt deeze ziekte *Hydrops uteri* genoemd, waarvan men voorbeelden kan leezen by FALLOPIUS, TULP, welke omtrent de *tubæ Fallopianæ* gezwollen van een aanmerkelyke grootte gevonden hebben; desgelyks in M. N. C. Dec. II. Anno 2 obs. 195. Anno IX. obs. 196. by HARDER observ. 87. NUCK in *Anatomicis curiosis*: wanneer het water door de poreuse *substantie* der lyfmoeder zyn uitgang kan vinden, gelyk somtyds gebeurt, dan is deeze ziekte geneeslyk.

§. DLXIV.



§. DLXIV. 7.) DE *ruptura uteri*, die ook niet zeldenvoorvalt in vrouwen, die eens moeilijke verlost hebben, of die in dezelve gestorven zyn. Dus heb ik drie voorbeelden gezien in vrouwen, die zonder te verlossen onder het baaren gestorven waren, in welke men na het openen der buik de lyfmoeder opengeborsten vondt, door welke de helft van 't lichaam van 't kind met de beenen in de holte van den buik lag; men kan dergelyke voorbeelden by TULP en elders leezen.

*Proci-  
dencia  
Uteri.*

§. DLXV. 8.) DE *uitzakking der lyfmoeder*, dewelke tweevoudig is, de eene zeer dikwyls en de andere zeldzaamer, ja allerzeldtzaamst: de eerste geschiedt, wanneer de *ruige rok* van de schede der lyfmoeder, en met dezelve de hals en binnenste opening der lyfmoeder nederzakt, en naar beneden hangt: de tweede geschiedt, wanneer de bodem van de lyfmoeder als een *bandschoen* omgekeerd wordt, gelykerwys men voorbeelden leest by RUYSCH in *obs. Anatom.* DIEMERBROEK en MANGET in onvoorzichtig behandelde kraamvrouwen, wanneer de *nageboorte* vaster aan de lyfmoeder gegroeit zy, en de Vroedvrouwen dezelve met geweld willen afhaalen.

*Tunica  
ru-  
gosa.*

*Chiro-  
theca.*

*Secun-  
dina.*

*Occlusio.  
nativa.  
Asciti-  
tia.*

§. DLXVI. 9.) DE tegennatuurelyke *toesluiting* of naauwte der lyfmoeder, welke of *aangebooren* of *veroorzaakt* is: in de aangeboorene sluit een dik vlies de *scheede*, of ook de binnenste opening der lyfmoeder, 't geen het  
zaad

zaad niet toelaat, of fomtyds de uitgang der stonden belet, en dan kan ze door opening of snyding geneezen worden: doch de veroorzaakte ontstaat meestentyds door een hard kraakbeenig gezwel, dat tusfchen de vliezen der *vagina* groeit, 't welk ook oorzaak van onvruchtbaarheid is, omdat het *femen* in de *uterus* niet kan komen. Somtyds groeijen en vereenigen zich ook derzelver kanten en zyden faamen, omdat de bekleedzelen der *vagina* verteerd en verzworen zyn.

§. DLXVII. 10.) DE onvruchtbaarheid, 't *Sterilitas* welk een zeer gemeene kwaal is, die de vrouwen, fchoon anderzins gezond en welvarende aantast, welkers oorzaaken echter niet een, maar veelvuldig zyn, doch voornamentlyk, behalven de onbehoorlyke gefteltenis der stonden, en *scirrhus uteri*, hier van de oorzaak de al te groote flapheid derzelver omtrent de binnenfte opening der *uterus* of deszelfs *sphincter*, welke dezelve *resolueerende* en flapmakende belet, dat het *femen* niet behoorlyk ingefchooten en ingehouden kan worden; weshalven ook zeer dikwyls die geene onvruchtbaar zyn, welke de *witte vloed* hebben (men kan het aangedaane deel befmeeren met den *Fluor albus*. *Balsamus Peruvianus*): 'er is nog dikwyls een andere oorzaak van de onvruchtbaarheid, namentlyk de al te groote vettigheid, of liever dikte der lyfmoeder, waardoor niet alleen deszelfs uitspanning belet wordt, maar daarom



om geschiedt het ook, dat het manlyk voorteelend zaad niet kan doordringen, en naar de eyernesten gaan.

§. DLXVIII. II.) ONDER de ziekten der *Molæ*. lyfmoeder kan men ook de *vleesige misdragten* tellen, welke tweederley zyn: de eene zyn buiten de lyfmoeder, en deszelfs holte of deszelfs vaten, en hangen of zitten alleen vast aan het buitenste en bovenste gedeelte der *uterus*, en zyn niets anders, dan vleesige of sponsachtige klompen en uitwasfen in een byzonder vliesachtig zakje beslooten, hebbende dikwyls een aanmerkelyke grootte, en worden gemeenlyk *molæ nutritionis* genoemd. Doch het ander foort wordt meest in de vaten der lyfmoeder voortgebracht, en deeze zyn niets anders, dan bloedige samengroeijingen der vezelen en vliezen of zekere *propachtige verdikkingen*, en hebben ook de gedaante van een vleeschklomp, en weegen niet veel zwaarder dan een half pond: deeze is men gewoon met de benaaming van *molæ generationis* te benoemen.

§. DLXIX. (12.) ONDER de gebreken der lyfmoeder moet men ook te recht de *Abortus*. *kraam* tellen, of de al te fchielyke uitwerping uit de *uterus* voor dat de vrucht ryp is: dit ongemak heeft veele oorzaken; want het zelve *Remotio*. geschiedt dooreen zekere *convulsive te rug trekking* van den bodem der lyfmoeder, of door den beletten omloop van het bloed door de vaten der lyfmoeder, en gebrek aan voedsel voor

voor het kind: zy heeft tot haare *causa occasionalis* een hevige gemoedsbeweeging, van schrik voornamentlyk en toorn, enz.: desgelyks zeer sterke *Purgantia*, *Emetica*, of ook *Venena*, welke ingenoomen zynde in de lyfmoeder *spasmi* en *convulsiones* kunnen veroorzaaken; en intusfchen zyn gevoeliger personen aan deeze ongemakken ook meer onderhevig: of de voornaamste oorzaaken van een *abortus* zyn het in de vaten stilstaande bloed wegens de daar inzittende *molæ* of *concretiones polyposæ*, welke dewyl zy de vrye te rug komst van het bloed beletten, onmatige bloedstortingen veroorzaaken, welke meestentyds voorloopers van een miskraam zyn: daarom wordt ten derden de vrucht wegens gebrek aan voedsel uitgedreeven: 'er is immers in het geheele vrouwelyke lichaam geen deel te vinden, 't welk zo zeer aan *Tumores varicosi* onderhevig is, als de *uterus* zelfs, voornamentlyk wegens de gedraaide en omgeboogene vaten, welke naardien zy den vryen doorloop van het bloed beletten, niet alleen tot de uitspanningen der vaten, maar ook zeer veel tot de *polyposa concretio* toebrengen.

§. DLXX. 13.) ONDER de ziekten, welke haare oorsprong uit een kwaade gesteldheid der *uterus* ontleenen, heeft de ongeregelde vloeijing der stonden byna de eerste plaats, welke niet min oorzaak en oorsprong tot zwaare *spastici affectus*, als *cachaxia* verschaft, waar- mede

*Inordinatus fluxus mensium.*



mede de vrouwelyke kunne dikwyls groote-lyks geplaagd wordt. Doch deeze gebreken der stonden bestaan of in eene totaale uitvloeijing derzelve, of in eene niet genoegzaame kwantiteit, of in eene opstopping geduurende eenige maanden, of in dezer onmatige en geweldige of ook in de te dikwyls voorvallende uitstorting: alle welke ongemakken alleen te wyten zyn aan de belette vryeren omloop van 't bloed door de vaten der lyfmoeder; dewyl 'er of in de jonge jaaren wegens de naauwte der vaten geen genoegzaame kwantiteit bloed naar dit gedeelte gebragt kan worden, of ook wanneer 'er zelfs gebrek aan bloed is, of wanneer de vat-en spierachtige zelfstandigheid der lyfmoeder zelfs door *spasmus* sterk saamen getrokken is, 't welk zeer dikwyls door een onverwagte schrik omtrent den tyd der maandstonden geschiedt, door het onvoorzichtig gebruik van *adstringerende* geneesmiddelen, door een groote kouvatting in de onderste deelen van den onderbuik; of hier van is ook de oorzaak al te groote dikheid in het bloed, en traage beweging, gelykerwys meestentyds in een zittend leven geschiedt, en het misbruik in zuure en koude spyzen: maar zo de al te groote vloeijing meermaalen voorvalt, en *langduurig* is, dan is zy meestentyds haaren oorsprong verschuldigt aan de *uitgerekte* zelfstandigheid der lyfmoeder, of aan het stilstaan van geronnen bloed,

of

*Chroni-  
cus.*

*Varicosa.*

of propachtige samengroeiingen van 't bloed in de *venæ*.

§. DLXXI. 14.) DE *opstying*, welke *passio hysterica* genoemd wordt, en zeer gemeen in vrouwen is, bestaat meest in een geweldige *spasmus* in het zenuwgestel, voornamentlyk van de maag en darmen, en derzelve daarop volgende *slapheid*, welke *Atonia. flatulencia.* winden veroorzaakt, met zeer zwaare *symp-tomata* verzelt gaat, en meestentyds haar vaste oorzaak in niet behoorlyke voortvloeijende stonden heeft.

§. DLXXII. 15.) DE totale *uitstorting* der *Eman- stonden* geschiedt in bejaarde vrouwen omtrent *stio.* het vyftigste jaar, meestentyds wanneer hier de vloeijing in 't geheel ophoudt, en geschiedt meest om die oorzaak, omdat in hooger ouderdom de vezelen hard en dik, en de buisjes der lyfmoeder, welke het bloed voeren, vernauwd of liever toegeslooten worden, zodat het bloed niet meerder in een zo groote menigte als te voren door dit *viscus* gebragt kan worden.



## TWEEDE AFDEELING

*Van het midden van den Buik.*

## I. HOOFDSTUK.

*Van het middenrif.*

Septum  
interme-  
dium  
transver-  
sum.  
Thorax.  
Tendi-  
nosa.

§. DLXXIII. **H**ET *Diaphragma* wordt of middenshot of middenrif genoemd, omdat het de borst of den middenbuik in tweeën verdeelt, en van den ondersten buik of onderbuik afscheidt, en is een spier en peesachtig deel, naar de borst toe bol, en naar den onderbuik hol, welkers voorste deel hoger, doch achterste gedeelte laager is.

§. DLXXIV. HET *diaphragma* bestaat uit twee (\*) spieren, namentlyk bovenste en onderste; de bovenste is *orbiculair*, dun van zelfstandigheid, en uit spiervezelen bestaande, die van den omtrek naar het *middel-punt* loopen, alwaar in 't midden de *tendines* saamenloopen, en het *tendineuse* gedeelte of *zenuwachtig Centrum*, gelyk het van den Ouden genoemd wierdt, uitmaaken; doch de onderste is

Ner-  
vous.

(\*) Schoon HOFMAN het *diaphragma* in twee spieren verdeelt, gelyk ook WINSLOW, *Traité des musc.* § 654. echter toont de reden wegens haare vereenigde werking en saamenhechting ons, dat het niet anders dan een enkele spier is.

is kleinder en dikker, en legt tegen den rug *Dorsum* aan, en bestaat uit twee *procesfus* met derzelver *tendines*, welkers regter langer is, en aan de eerste, tweede en derde *vertebra lumborum* vastzit; de linker echter als korter zynde, eindigt in de eerste *vertebra lumborum* (\*).

§. DLXXV. DE voorste spier van het *Diaphragma* is vereenigd met het *sternum* en *cartilago Ensiformis*, desgelyk met de *costæ spuriaë*; doch de achterste strekt zichzelfs tot de *vertebrae lumborum* uit, en wordt met dezelve vereenigd, gelyk reets gemeld is; deszelfs uiterste einde loopt, gelyk VESALIUS en MORGAGNE wel opgemerkt hebben, samen met de *obliquus adscendens*, en nog veelmeer met de *musculus transversus abdominis*.

§. DLXXVI. HET *diaphragma* is ook vast vereenigd in de *thorax* aan het *pericardium*, en door bemiddeling van 't zelve aan het hart omtrent het *cartilago ensiformis*, opdat de uitgestrekte en zwaare lever het *diaphragma* niet naar binnen zoude trekken, en wordt dus eenigermate in evenwigt gehouden en naar boven getrokken door het *pericardium*.

§. DLXXVII. DIT *septum* is ook vast vereenigd door middel van een sterk vlies met de

(\*) Die het Latyn magtig zyn, kunnen een veel nauwkeuriger begrip van deeze spier krygen, wanneer zy hier over nazien het beroemde werk van den Hr. Profs. ALBINUS over de Spieren *Lib. 3, cap. 81, pag. 296, &c.*



de *hepar*, en deszelfs vaten, namentlyk de *vena cava hepatis*, en de opklimmende ftam van deeze *vena*, van welke deeze vaten ook voorzichtig afgefcheiden moeten worden, en eerst met een fterken draad toegebonden, opdat de zwaare bloedftorting de ontleedkundige behandeling niet zoude beletten: doch het is aan het *tendineufe* gedeelte van het *diaphragma* met een genoegzaam fterk en zeer breed vlies vastgehegt, waarom ook door de beweging van het *diaphragma*, wanneer het of naar beneden in den buik in de inademing, of naar boven in de borst opklimt in de uitademing, te gelyk de *lever* naar boven en beneden bewoogen wordt, welke beweeging de afſcheiding der gal, en doorgang van 't bloed door de *vena portæ* en *vena cava* naar het *hart* ten hoogſten bevordert.

*Hepar.*

§. DLXXVIII. HET *diaphragma* wordt met twee vliezen bekleed; in dat gedeelte, 't welk naar de *Thorax* legt, met het *Pleura*, en naar de kant van het *abdomen*, met het *peritonæum*, van welk het zyn eerſte bekleedſel ontfangt, en daardoor geſchiedt het, dat wanneer het zelve *ſpaſmodice* ſaamgetrokken wordt, het *peritonæum* wegens haare overeenſtemming ook terug getrokken wordt, en met het zelve alle de *viſcera* van den onderbuik, en deeze ſamentrekking geeft in ziekten een kwaade *Prognofis*.

§. DLXXIX. ONDER en als tegen het *diaphragma*

*phragma* leggen de *Nieren* en *Milt*, waarom het *Renes.*  
*diaphragma* van de *costæ spuria* afgescheiden *Lien.*  
 zynde, de nieren, die tegen het zelve aan-  
 leggen, te gelyk van plaats veranderen; hier  
 door geschiedt het, dat in de inademing ook de  
 omloop van het bloed door de nieren en de daar-  
 van afhangende afscheiding der pis te gelyk be-  
 vorderd wordt: op gelyke wyze wordt ook de  
*Lien* door een grootere beweeging van het *dia-*  
*phragma* geschokt, 't welk ook niet weinig  
 toebrenge tot de vaardiger doorloop van het  
 bloed door dit uit enkel vaten bestaande in-  
 gewand.

§. DLXXX. VERVOLGENS legt de maag  
 onder het *diaphragma*, welkers linker opening  
 vast aan deszelfs onderste spier gehegt zit,  
 waardoor het geschiedt, dat, wanneer de  
 maag sterk door winden uitgezet is, de vrye  
 beweging van 't *diaphragma* belet wordt, de  
 ademhaling zeer benaauwd en moeylyk is, dik-  
 wyls in gevaar van te verstikken, 't welk ge-  
 woonlyk een zeer gemeenzaam *symptoma* in  
*Hypochondriaci* en *foeminæ hysterica* is.

§. DLXXXI. Door de spieren van het  
*diaphragma* loopt vooreerst de *vena cava*, uit  
 de *hepar* voortkomende, in de regter zyde (\*);  
 door deszelfs *tendineuse* en zenuuwachtig ge-  
 deelte; 'er loopt ook de *Oesophagus*, maar  
 niet

(\*) Byna in de midden, niet verre van de *spina*.



niet gelyk dezelve afgetekend is door VESLINGIUS en BARTHOLINUS, door deszelfs *tendineuse* gedeelte, maar door het spierachtig, en wel naar boven door de *processus* van de benedenste spier (\*): met de *Oesophagus* loopen ook te gelyk zenuuwen uit het *par vagum* en *intercostale* naar de maag: vervolgens de *ductus Thoracicus*, de *arteria aorta*, *vena Azygos* en het *par vagum* met de *ramus intercostalis*, wel eigentlyk niet door het *diaphragma*, maar loopen tusschen de twee *capita processus musculi inferioris* door.

§. DLXXXII. HET *diaphragma* is met bloedvaten en ook zenuuwen voorzien; de zenuuwen zyn tweederlye, of 'er gaan ook twee aanmerkelyke naar het *diaphragma*, en zy koomen uit het derde, vierde, en vyfde *Vertebrae* *werwelbeen van den hals*, uit welke drie takjes *calli.* loopen; daarna komen zy tot malkander en loopen door den hals en *pericardium* naar het *diaphragma* en verspreiden verscheide takjes door deszelfs *tendineuse* en *musculeuse* zelfstandigheid (\*\*): vervolgens ontfangt het *diaphragma* kleinder zenuuwen uit het *par vagum* en *intercostale*; welke grootere zenuuwen aan deeze spier een groote kragt en beweeging geeven, die tot de ademhaling noodzaaklyk is, en de proefneming, om dit stuk te bevestigen door BELLINUS gedaan, is bekend, welke

(\*) De opening, daarde *oesophagus* doorgaat, legt eenigzins aan de linker zyde by de *spina vertebrarum*.

(\*\*) Deeze zenuuwen worden *Pbrenici* genoemd.

welke in een hond na deszelfs *Thorax* geopend en het *sternum* afgesneedentehabben, ontdekt heeft, dat, wanneer men deeze grootere zenuuwen toebondt, of met de vingeren drukte, de geheele beweging van het *diaphragma* gelijk en in eens ophoudt, doch dat na het weder wegneemen der vingeren, of de loslating van den band, 'er wederom een vrye toevloed van het *fluidum nerveum* geschiedt, en het *diaphragma* aanstonds bewoogen en opgetrokken begint te worden: en nadien deeze *nervi phrenici* uit de *vertebræ colli* haaren oorsprong hebben, zo blykt thans klaar, waarom men in een *Asthma flatulentum* of ook *spasmodicum* pyn en moeilijke beweging in de armen gewaar wordt, en ook een beletting in de beweging van den hals; want deeze halszenuuw-takken gaan ook naar de armen, waarom 'er een benaauwde en moeilijke ademhaling volgt, wanneer 'er een gezwel, onsteking, of hevige pyn in de armen voorvalt.

§. DLXXXIII. HET *diaphragma* wordt ook met slag-aderen en aderen voorzien van tweederlye soort uit de *arteria aërta* en *vena cava*, uit welke een tak naar het *diaphragma* loopt, die zich door de geheele zelfstandigheid van 'tzelve verspreid: doch van boven komen 'er uit de *mammariæ* omtrent het *Cartilago ensiformis*, takken van slagaderen en aderen, welke VERHEIJEN het eerst ontdekt heeft in zyne *Anatomia*.

§. DLXXXIV. DAARENBOVEN moet



*Convexa.* men aanmerken, dat het *bolle* gedeelte van het  
*Concava.* *diaphragma* naar de *Thorax*, maar het *bolle* naar het  
*abdomen* ziet, en het is een dwaaling, dat het  
*diaphragma* in de inademing aan de zyde der *vis-*  
*cera* bol, en naar het *abdomen* hol wordt: want  
 de ondervinding door ontleedingen van lee-  
 vendige dieren leert ons, dat derzelver bol-  
 heid in de inademing effen wordt, waardoor  
*Latera.* derzelver zyden, gelyk met de daaraan vastzit-  
 tende ribben naar buiten en voorwaarts be-  
 woogen worden, en bygevolg moet het ook  
 noodzakelyk geschieden, dat de spieren van  
 het *abdomen* en alle de *viscera*, die aan het *dia-*  
*phragma* vastzitten, naar buiten en beneden  
 daalen, doch in de uitademing wordt dit bol,  
 dewyl de ribben opklimmen, en dus het *abdo-*  
*men* naar boven gedrongen wordt, 't welk dus  
 wyder, maar de *Thorax* naauwer wordt.

§. DLXXXV. DOCH de voornaamste wer-  
 king van het *diaphragma* is, dat het met behulp  
*Musculi* van de *tusfenribben-spiieren*, en opgeligte *costæ*  
*intercos-* de *Thorax* ophaalt, en dezelve gelyk saamen-  
*tales.* drukt en vernaauwt; doch deeze spier is in-  
*Active.* de uitademing meer *werkende*, maar in de in-  
*Passive.* ademing *lydende*: onder deeze werking van in-  
 en uitademing, of neerdrukking en opligting  
 van het *Diaphragma*, *Thorax* en *Abdomen* wor-  
 den de bewegingen van 't bloed, *chyl* en wa-  
*Lympha.* ter door de *ductus Thoracicus*, *arteria aërta* en  
*vena cava* wonderlyk bevorderd; daardoor  
 wordt ook de vrye en ongestoorde loop des  
 bloeds

bloeds door de *hepar* en *lien* bevorderd, en dus wordt ook de afscheiding van de pis door de nieren gemaklyker gemaakt en de voortdryving der voedzelen uit de maag en darmen te gelyk door de werking van het *diaphragma* geholpen; de saamentrekking van het *diaphragma* brengt ook veel tot de braakloozing toe: eindelyk kan noch de drek en waterloozing, noch de verlossing van een kind of uitwerping der nageboorte uit de lyfmoeder, gemaklyk zonder de inademing en de werking van het *diaphragma* geschieden.

### Ziektekundige Beschouwing.

§. DLXXXVI. ONDER de gevaarlyke Ziek-*Morbi*  
*tens*, daar het *diaphragma* mede aangedaan *acuti.*  
 wordt, munt 1.) deszelfs *ontsteeking* uit, wel-*Inflam-*  
 ke men kent uit de *febris continua*, *hik*, be-*matio.*  
 naauwde ademhaling, en pyn in het ademha-*Singul-*  
 len; nochtans valt deeze kwaal zelden voor, *tus.*  
 en wordt in 't Grieks *Paraphrenitis* genaamd;  
 deeze *inflammatie* kan ook volgen op kwet-  
 zuuren in het *diaphragma*.

§. DLXXXVII. 2.) DE *spasmus diaphragma-*  
*tis*, welke met een zeer moeiljelyke pyn ron-  
 tom de *praecordia* en *costæ spuriae* geschiedt, en  
 met een ten hoogsten moeiljelyke ademhaling  
 verzeld, en zeer gemeenzaam is in menschen,  
 die aan het zogenaamde *malum hypochondriacum*  
 onderhevig zyn: zeer dikwyls gaat 'er een



*Cardialgia* meede gepaart; desgelyks is het byna een gewoonlyk *symptoma* van ingenoomen *corrosif* vergift en deszelfs werking, door welke *spasmus* het *diaphragma* na boven gehouden en deszelfs neerdaaling na beneden en effenwording belet wordt. Hierom kunnen door de dus belette verwyding van 't *Thorax* de longen met derzelver vaten niet behoorlyk uitgespannen worden, en het bloed niet vry doorloopen: daardoor ontstaat 'er zeer groote benaauwdheid en onrustigheid: het is ook een zeer gemeenzaam *symptoma* in vrouwen, die met opstygingen gekweld zyn. Dusdanige *spasmus* wordt zeer dikwyls door een kwetzuur in het *diaphragma* zeer zwaar, ja zelfs doodelyk; namentlyk wanneer deszelfs *tendineuse* zenuwachtige zelfstandigheid doorboort wordt, of ook wanneer de zelfstandigheid zelfs van het *diaphragma* in de lengte en effenheid door een *instrument* gekwetst en als *gecontundeerd* wordt; of ook wanneer 'er een groote *contusie* in het zelve geschiedt door een zwaare stoot omtrent het *carti'ago Ensiformis*.

§. DLXXXVIII. 3.) DE kwaal, welke *Asthma flatulentum* genoemd wordt, is ook een ziekte van het *diaphragma*, wanneer deszelfs neerdaaling door de met winden opgezette maag *Thorax* belet wordt, waaruit volgt, dat de *borst* niet verwyd kan worden, en het bloed door de vaten der Longen vry omloopt, waarop de grootste engte, en benaauwdheid met de moeiljk-

jelykste ademhaling volgt, en is een gemeenzaame kwaal in *hypochondriaci* en *hysterica*, welke vermindert door het loozen van oprispingen en winden.

§. DLXXXIX. 4.) HIER by moet men ook de *singultus* of *bik* brengen; en alhoewel deszelfs oorzaak meestentyds in de holte of ook in de zelfstandigheid van de maag zit, welkers linker opening omvat wordt door de *procesfus* van de onderste spier van het *diaphragma*, zo blykt gemaklyk, dat wanneer de maag aangedaan, of door *spasmus* aangevallen wordt, dat dan het *diaphragma* wegens haare vereeniging ook aangedaan wordt, dus echter, dat 'er een *convulsio* in deeze spier geschiedt, welke in een geweldige, en tegenwil en danksaamentrekking en verwyding deszelfs, en daar opvolgende zwaare in- en uitademing bestaat.

§. DXC. 5.) ONSTAAT 'er ook een hevige pyn in het *diaphragma*, wanneer of door het uitgestorte bloed of wey, of openbarsten van een *Empyema*, of door het stilstaan van den etter in de holte van de borst, de *procesfus* van het middenrif, 't welk aan de *vertebrae lumborum* vastzit, door zwaarte of ook scherpte geweldig uitgespannen, saamgedrukt en geprikkelt wordt, waardoor een hevige pyn omtrent de lendenen met moeilijke ademhaling en benaauwdheid volgt:  
dee-



deeze pyn is zeer hevig, en kan onervarene in de Ontleedkunde doen verbeelden dat 'er een steen in de nieren zit.

§. DXCI. WAT aangaat de kwetzuuren van het *diaphragma*, 1.) deszelfs zwaardere *kneuzing*, welke omtrent het *cartilago Ensiformis* voorvalt met welke het vereenigd wordt, en daar het hart ook dicht by legt, heeft meestentys een doodelyke uitkomst: dit bevestigen de *Auteurs* door veele voorbeelden en Ontleedkundige Waarneemingen, waarover men BOHN kan nazien in *libro de renunciatione vuln. um.*

§. DXCII. 2.) WANNEER 'er ook een *contusie* geschiedt met een *instrument*, dat niet zeer scherp is, 't welke de spier-zenuwachtige zelfstandigheid van het *diaphragma* zelfs aandoet, by voorbeeld wanneer deszelfs zelfstandigheid tusfen de ribben door een steek van een degen zonder doorgeboort te zyn gekwetst wordt, dan is deeze kwetzuur niet zelden doodelyk.

§. DXCIII. 3.) DE kwetzuuren van het *diaphragma*, die hetzelfde in zyn *tendineus* zenuwachtig gedeelte doorbooren, 't welk voornamentlyk het middel-punt uitmaakt, zyn dikwyls doodelyk bevonden, niet alleen wegens de zeer geweldige *spasmus* van dit *pars vitalis*, maar ook wyl 'er geen geneezing of heeling daar ter plaats kan uitgevonden worden, en 'er gemaklyk *inflammatio* en *phacelatio* in deeze deelen opvolgt; doch wanneer 'er

kwet-

kwetzuuren zyn in het dikker spier-en vleesachtig gedeelte, 't welk aan het *sternum* en de *costæ* vastzit, zyn zy, schoon niet zonder gevaar, nochtans uit zichzelfs niet doodelyk, maar verzuimd wordende kunnen zy gemakkelijk den Lyder omhals brengen door de daarop volgende *inflammatie*.

§. DXCIV. HET *diaphragma*, en voornamentlyk deszelfs onderste gedeelte, 't welk aan de wervelbeenderen van den rug vastgehegt is, legt aan de uitstorting van water in de borst, of ook de etter door het openbersten van een *empyema* in de longen, bloot, en niet alleenlyk door deeze drukking, en wordt door die uitzetting, barsting niet alleen met een groote hevige en vaste pyn, maar ook met de daar- *Fixus* door ontstaane geweldige *spasmi* aangedaan, zodat dikwyls hieruit de dood volgt.

## II. H O O F D S T U K.

### V A N D E L O N G.

§. DXCV. ONDER alle de wyduitgebreide ingewanden onzes lichaams is de *long* byna de voornaamste, zodat *Pulmo.* zy in de inademing uitgezet wordende de geheele plaats van de *borst* vervult: zy wordt in *Thorax.* een regter en linker *lobus* verdeeld, welke beide



beide wederom in twee (\*) *lobi* verdeeld worden; het bovenste gedeelte van de longen is meer bol, doch het onderste, 't welk tegen de rug legt, meer hol. Deeze rechter en linker lob scheidt het *mediastinum* van een (\*\*), welk vlies zeer vast aan het *sternum* zit, en met veel vet bezet is.

*Aspera  
arteria.  
œsopha-  
gus.  
vertebrae  
colli.*

§. DXCVI. M E N moet ook de vereeniging der long in opmerking neemen: vooreerst is zy vereenigd met de *lucht-ader*, en door bemiddeling van deeze met de *slokdarm* zelfs, en de *welvelbeenderen van den hals*; zy is ook vereenigd met het *hart* door middel van de *longslag-*

(\*) Doch meest worden zy in de regter zyde in drie, en in de linker in twee *lobi* verdeeld. HALLER meldt dat het niet ongewoon is, drie *lobben* in de linker long te vinden; zie *Icon. Anat. Fasc. 3. pag. 32.* men kan verder over 't gevoelen van oude en latere Schryvers nazien, de in dit werk vertaald wordende, *disfèrtatie* van den Hr. VERRYST over de *adembaling*.

(\*\*) Wyl onze *Auteur* geene beschryving van het *pleura* of *mediastinum* alsterloops geeft, zeggen wy met korte woorden dat het *pleura* een vleezige zak is, waarin beide de longen ieder byzonder door behulp van het *mediastinum* leggen: het komt voort van de *corpora vertebrarum dorsi*, en de borst bekleedende komt het van beide de zyden onder het *os pectoris* tot een; waaronder zy met een *celluleus* vlies met elkander vereenigd zynde het *mediastinum* uitmaaken: veel *Auteurs* ontkennen een holte in dit *mediastinum*, doch de ontleding toont ons het zelve niet alleen duidelyk, maar somtyds wordt 'er ook *pus* vergaderd, 't geen men door het doorbooren van 't *os pectoris* moet loozen.

slagader en ader; met het *diaphragma* door be- *Arteria*  
hulp van het harte zakje en het middenshot, met *et vena*  
het *sternum* zelfs, de waare ribben voorna- *pulmona-*  
mentlyk tweede, derde en vierde, in de ee- *lis,*  
ne of beide de zyde door middel van het  
*borstvlies*, en door behulp van een bundeltje  
zenuwen en vezelen.

§. DXCVII. DE zelfstandigheid der long  
bestaat enkel uit vaten en vliezige blaasjes,  
welke vaten en blaasjes met elkanderen door  
een zeker aanhoudend vlies vereenigd zyn,  
en waarmede als zeer solide zynde, de long  
ook omringd wordt, en is niet open, gelyk  
het gemeen gevoelen is, dewyl de ingeblaze-  
ne wind in de long niet door dit buitenste  
vlies, maar door de bloedvaten gaat.

§. DXCVIII. DE vatachtige zelfstandigheid  
der long heeft haaren oorsprong uit de *aspera*  
*arteria*, en ook de *arteria* en *vena pulmonalis*:  
de *Aspera arteria* verspreidt zich door de gehee-  
le long, en zelfs tot 't kleinste gedeelte;  
want aanstonds in 't begin verdeelt zy zich  
in twee grootere takken, in de regter en lin-  
ker; daarna gaan die wederom in eenige klein-  
der, en deeze verdeelen zich wederom in on-  
noemelyke takjes, doch eindelyk eindigen  
zy in veele vleezige *lamellae*, welke in 't  
rond door spierachtige vezelen te saamge-  
hegt, de *luchtbuisjes* of blaasjes uitmaken, wel- *Tubuli*  
ker vereeniging dusdanig is, dat de door- *aërei vel*  
gang uit de *aspera arteria* in dezelve, en we- *vesiculae.*  
derom



derom uit elk blaasje in een ander open is: zo lang de *aspera arteria* zelfs in ontallyke takjes verdeeld wordende, nog in geen vliezige blaasjes veraard, zo lang behoudt zy den naam van *Bronchia*.

§. DXCIX. DEEZE lugtblaasjes uit vleesch en zenuw-vezelen faamgesteld worden met een *Retiformis plexus*. *netachtige vlegting*, en derzelver ledige plaatsen ook met bloedvaten en vleesch en zenuw-vezelen vervuld.

§. DC. DE takken van de *aspera arteria*, welke *Bronchia* genaamd worden, en uit kraakbeenige *lamellen*, die in 't rond (\*) leggen, bestaan, worden van binnen met een ruig of liever klierachtig vlies bekleed, waarin op fom-

(\*) De *Aspera arteria* beneffens de *Bronchia* bestaan uit kraakbeenige ringen, waar tusfchen spiervezelen leggen; de reden waarom zy niet ten eenemaal vliesachtig zyn, is omdat zy dan niet zouden vallen, en van de *æfophagus* en verscheide oorzaaken faamgedrukt kunnen worden; echter zyn deeze ringen niet ten eenemaal rond, en ontbreken van achteren, alwaar een vlies is, beslaande omtrent een vierde van de *aspera arteria*. Men zoude hier kunnen vraagen, waarom de natuur dit zo gemaakt heeft, wyl de *pharynx*, welke het begin van de *æfophagus* is, wel van de *larynx* gedrukt wordt, die geheel kraakbeinig is, en dat echter daardoor geen nadeel toegebracht wordt, en dat de *Bronchia*, in welke deeze ringen van achteren ontbreken, niet tegen de *æfophagus* aanlegt, 'er bygevolg een andere reden moet zyn: de reden dan hiervan is eigentlyk, opdat deeze ringen dus vernauwd en verwyd zouden kunnen worden.

sommige plaatzen zeer kleine kliertjes als *milium* of giers leggen, welke klieren en klieragtig vlies geduurig vocht uitzweeten, 't welk belet, dat dit vliesachtig *viscus* zo gemaklyk niet door de drooge en *elastike* lucht zoude uitdroogen, en wegens dit vocht zyn de *Bronchia* altyd bezet met een zeker lymig vocht, en dit vocht wordt door de lucht, welke zy in haare *pori* ontfangt, in de uitademing onder de gedaante van damp naar buiten gevoerd, weshalven de long ook het werk van een afscheidend en uitloozend werktuig volvoert.

§. DCI. SOMMIGE zyn van gedachten, dat 'er in een gezond mensch in den tusschentyd van een dag en nacht wel een half pond van dit vocht door de uitademing uitwaasemt. De vaten, welke de blaasachtige zelfstandigheid der Longen omringen, zyn tweederlye, het een slagaderlyk en het ander aderlyk; het eerste soort wordt *longs slagader*, en het *Arteria* tweede *longs-ader* genoemd: de *Arteria* brengt *pulmonalis* het bloed uit de *rechterbuik* van 't hart aan, doch de *vena* van de Long naar den linker *Ventri- culus* *boezem* van 't hart, en voert zelfs het bloed *dexter* terug naar zyn Oor: maar deeze vaten gee- *corais* *Sinus* ven en verspreiden onnoemlyke takjes van *Auricu- la* zich naar de vliezige blaasjes, alwaar zy zeer gedraaid en geflingerd voortgaan, en in mal- kander gedraait en gevouwen zyn, waarom het nodig is, dat zy in de inademing uitge- spannen worden, opdat het bloed zoveel te- vryer zoude kunnen doorloopen, alzo zyn

ONTLEEDK. *Verz. I. Ferv. XXII.* H voort-



voortgang door de omgeboogen en in een gekronkelde takverdeelingen zeer moeijelyk is.

§. DCII. ECHTER is het maakfel der *vena* en *arteria pulmonalis* zodanig, dat de *vena* het onderste gedeelte van de *aspera arteria*, doch de *arteria pulmonalis* deszelfs bovenste gedeelte omringt, en dus loopende takverdeelingen van de *aspera arteria* byna tusfchen beide de takjes van de *arteria* en *vena pulmonalis*.

§. DCIII. NOCHTANS heeft de Long behalven de groote nog sommige andere eigene en byzondere vaten, welke tot deszelfs voeding dienftig zyn, en die *Bronchialia* genoemd worden, zynde een *arteria* en een *vena*. De *arteria* is al ten tyde van GALENUS bekend geweest, en door MARSCHETTIS ook waargenoomen; doch naderhand in 't vergeetboek geraakt zynde, is als 't ware door RUYSCH wederom in 't licht gebragt. Zy komt voort uit de ftam van de *aorta descendens* boven de uitspruiting van de onderste tusfenribbige flagaderen: zy wordt in drie takken verdeeld, waarvan 'er een buiten de *aspera arteria* loopt, de overige twee loopden met de kleine takverdeelingen van de *aspera arteria* door de geheele zelfftandigheid der longen en deszelfs vliezen.

§. DCIV. 'ER zyn ook *venæ Bronchiales*, welke men fchoon RUYSCH dezelve niet gevonden heeft, kan toonen, en 't geen voornamentlyk

lyk PAULI gedaan heeft, welke een *Commentarius* over de Ontleedkunde van VAN HORNE geschreeven heeft; want dewyl de *venæ* altoos de *arteria* verzellen, hebben zy ook met de *arteriæ* de zelve verdeeling: deeze vaten brengen het voedend zap aan, om de zelfstandigheid der vaten zo *Bronchialia* als bloedvoerende, en voornamentlyk der vliezen te voeden, op gelykerwyze als de *arteria hepatica* de deelen van dit *parenchyma* voedt, en gelykerwys het bloed in de lever, dat door de *vena portæ* en *cava* loopt, niet tot de voeding deszelfs strekt, zo geschiedt het ook in de longen met het bloed, dat namentlyk uit de *arteria* in de *vena pulmonalis* gevoerd wordt, (wyl dit alleen door de *vena* naar de linker boezem van 't hart gebragt wordt.)

§. DCV. ECHTER is de long niet alleen van bloedvaten voorzien, maar 'er gaan ook zeer veele zenuwen, en daaruit veele takken, naar toe, welke van de vlegting in de borst, *Plexus*, van het *par vagum* en *intercostale* naar de Longen loopende, te gelyk met de bloedvaten door de longen verdeeld worden, en niet alleen de takken van de *bronchia*, maar ook van de *arteriæ* en *venæ* volgen, en naar aan alle kanten takjes gegeven te hebben, gaan zy boven deeze vaten heen, en omringen en binden eenigermaten dezelve aan een. Daarenboven geeven de *nervi stomachici* tusfchen de verdubbeling van het *mediastinum* tien takjes aan de



longen, waaruit ook de overeenstemming van de longen met de maag, of liever van de *aspera arteria* met de maag, voortvloeit.

*Vasa*

*Lymphatica.*

§. DCVI. T E N laatsten zyn ook de longen met veel *watervaten* voorzien, welke van buiten door derzelver vlies loopen, gelykerwys Nuck in zyne *Adenographia* zeer wel aftekent.

§. DCVII. W A T aanbelangt het nut en gebruik der longen, dit is zeker zeer uitftekend en tot de bewaaring van het leven het voornaamfte en ten hoogfte noodzakelyk: men zegt te regt, dat de ademhaling en het leven op een gelyken voet zyn; alzo de ademhaling wegzynde, welke in de uitfpanning en vernauwing van de borst en longen beftaat, door welkers middel de lucht in- en weder uitgelaaten wordt, het noodzakelyk volgen moet, dat het met het leven ook fchielyk gedaan zy: de longen immers zyn dat ingewand, door welkers be-

*Motus*

*progressivus.*

hulp de omloop, of voortgaande beweging van het bloed en de vochten in 't rond gaande volvoert wordt: Echter kan het bloed uit den eenen *ventriculus* in den anderen, en uit het groote aderlyke, in het groot flagaderlyke vat niet gefort worden, tenzy het eerst door de longen gaat, 't welk voornamentlyk in menfchen buiten de lyfmoeder levende gefchiedt; want zo lang als het *foetus* in de lyfmoeder is, zyn de longen van geen gebruik en werking, en het bloed loopt uit de regter boezem van het hart door een regten en zeer korten weg door byzondere kanaalen, namentlyk de

de *Canalis arteriosus* en 't *foramen ovale* naar het linker; maar in een gebooren mensch, dewyl het lichaam der longen door de zwaare drukkende en aangevoerde lucht uitgezet wordt, neemt het bloed zelfs terstond een anderen weg en loop, terwyl de voorige kanalen van langzaammerhand vernauwen en toegeslooten worden.

§. DCVIII. WESHALVEN men te regt den omloop des bloeds in een grooter en kleinere moet onderscheiden; de grootere, welke door de holle ader, en groote slagader (*aërta*) geschiedt, kan niet ongeschonden blijven zonder den kleinderen omloop, welke uit de *arteria pulmonalis* in de *vena pulmonalis* geschiedt door de zelfstandigheid der longen: deeze dan belet zynde, is het noodzakelyk dat het leven weg gaat, als welkers oorzaak deeze omloop is, die door het geheele lichaam geschiedt.

§. DCIX. WANNEER derhalven het bloed door onnoemlyke takjes der longen, welke in de ademhaling opgeligt worden, loopt, dan wordt 1.) bloed tegen één *gewreeven*, *Atteri.* en door deeze overeenkomstige vryving verdeeld, verdund, fyner en vloeibaarder gemaakt, dewyl dus de vaste olie, water en aardachtige deelen door deeze *doordrukkende* *Motus* *beweging* door de takjes van de kleinste kanaal- *trans-* *presfo-* *rius.* len in zeer kleine *bolletjes* van één gescheiden worden, waarom het ook een vaste en be- *Globuli.* stendige waarneeming is, dat het bloed dun.



der en vloeibaarder uit de longen naar de *ventriculus sinister* gaat, als het naar de longen uit de regter *ventriculus* gegaan was.

*Serum.*  
*Lympha.*

§. DCX. 2.) DE beweeging van het bloed door de longen, welke een enkel vatachtig lichaam zyn, helpt ook tot de innerlyke vereeniging en vermenging, niet alleen van de *wey* en het *water*, maar ook van de chyl met het bloed: weshalven 'er geen twyfel is, of de longen zyn de voornaamste werktuigen van het werk der bloedmaaking; want door deeze vryvende beweging, welke 'er in de vloeistoffen en vaste deelen geschiedt, en door derzelver omschudding in de vaten, wordt ook de chyl op het innerlykste met het bloed vermengd, welke vermenging ten hoogste noodzakelyk is om de chyl de natuur en aard van het bloed te doen aanneemen.

*Solida.*

§. DCXI. 3.) OF ten laatsten brengt dit ingewand zeer veel tot de bewaaring van het leven toe, wyl de lucht zich meer vereenigt met het bloed en de vloeistoffen, dan met de *vaste* deelen, welke vereeniging van die *elastieke* fyndere vloeistof noodzakelyk en ten hoogsten nuttig voor het leven is; de in- en uitgang immers van de lucht heeft niet alleen dit gebruik, dat zy het samenweeffel der in- en malkander gevlogten vaten der longen uitspant, en uitbreidt, opdat door dezelve het bloed gemaklyker zoude kunnen vloeijen, en dat de uitgaande zeer veel vogtigheden uit de

*Bron-*

*Bronchia* van de longen, en de *aspera arteria* medeneemt: maar daarenboven heeft zy nog een edelder gebruik, dewyl zy haare zuiver, elastik en fynder gedeelte der lucht aan hetzelfde mededeelt, welke de oorzaak van de inwendige beweging en warmte is. Æthereus.

§. DCXII. DE ingeademde lucht, die zich op verscheidene manieren met de vloeistoffen en vaste deelen vermengt en vereenigt, strekt ook tot groot nut voor het lichaam; want deze *aetherische* stof als zeer beweeglyk zynde, welke de uitwerkende oorzaak der warmte is, wordt aan het bloed door middel van de inademing medegedeeld, wyl zy in de lucht in de vaten der long achtergehouden wordt, dewyl het door Natuurkundige en voornamentlyk *thermometrische* proefnemingen blykt, dat vochten in glaaze buizen beslooten door de warmte van de buitenlucht een grooter plaats beslaan, en uitgezet worden; terwyl in tuschen de fyndere *aetherische* stof door de pori van het vast glas doordringt, waarom zoude het zelve ook niet door de vliezen der longsvaten doordringen, welke door haare *uitzetting* en *inwendige beweging* in de deelen van het bloed een aanmerkeelyke verandering in het *samenstelzel des vochts*, en derzelve beweging veroorzaakt; waneer de ingeademde lucht al te vochtig of met te veel waterige dampen vervult is, dan dringt zy wel niet *stoffelyk* door de *pori* der vaten in de vochten, maar zy

*Rarefactio*  
*Motus intestinus.*

*Materia-liter.*



*Tusfes  
humidæ.  
Pbleg-  
ma.*

*Transpi-  
ratio.*

maakt de zenuw-vliesachtige vezelen van de long blaasjes, benevens ook der longvaten al te slap, en vermindert derzelve toon, sterkte en bewegende kragt; hierdoor geschiedt het, dat, wanneer iemand lang in vogtige lucht is, gelyk in den herft, en wanneer 'er lang achter één westelyke winden waaijen, 'er vogtige hoesten ontstaan en veel dik slym door den hoest uit de longen geloost wordt, en dat het geheele lichaam en deszelfs werkingen, en de ziel ook zyn vlugheid verliest en de uitwaazeming moeilijker geschiedt: doch een heldere, zuivere en koude lucht brengt door haare uitspannende en veerachtige kragt, daar zy meede voorzien is, te weeg, dat, dewyl zy de sterkte en toon der vliesachtige vezelen der long, en derzelve vaten herstelt, niet alleen het bloed vryer en rasfer door de longen omloopt, maar maakt ook de werkingen van het geheele lichaam vlugger.

§. DCXIII. DAT niet alleen de ingeademde lucht op de vaste deelen der longen werkt, maar ook stoffelyk in dezelve indringt, of zekere fyndere stoffe aan het bloed in de vaten der longen mededeelt, hebben wy veele bewysredenen, die ons dit bevestigen: 1.) want wy ondervinden, dat de besmetting van pest of kinder-pokken, of aan andere besmette ziekten gestorvene menschen, door inademing van dergelyke besmette lucht aan de sappen van het lichaam medegedeeld worden, alwaar

men

men nochtans niet ontkennen moet, dat door middel van het spog iets van deeze besmetting in de maag komt.

§. DCXIV. 2.) HET is bekend, dat lucht, die met damp van gemeene zwavel, of gedoofde koolen zeer vervuld is, alle beesten en ook menschen omhals brengt, niet omdat zy den omloop van het bloed door de longen belet, en dus doet verstikken, maar omdat zy een schielyke *doofheid* en vermindering en be-<sup>Stupor</sup> derving van byna alle zo wel in- als uitwendige zintuigen, en *diepe slaap* veroorzaakt: 3.) <sup>Sensus.</sup> 't Is aanmerklyk, dat de lucht, schoon zy <sup>Narcosis.</sup> zeer samengedrukt of ook met waterdampen of fynder zoutachtige uitwaasfemingen bezet en opgevuld is, aan menschen en beesten den dood niet veroorzaakt, doch wanneer zy met damp of rook van gemeene zwavel of brandende doove koolen, of andere zwavelachtige uitwaasfemingen, voornamentlyk die uit het gesten van most of vers bier ontstaan, vervuld is, kan zy gemaklyk alle *levendige schep-* <sup>Animan-</sup> *zelen* een gewisse dood veroorzaaken, in wel-<sup>tia.</sup> kers lichaam te ontleeden men de longen, 't welke opmerking verdient, zeer opgeblaazen en gespannen vindt. Men kan hier van geen andere reden geeven, als dat de zeer door- dringende damp, welke in aangestooke of gesmolte zwavel is, door middel van de ingeademde lucht door de *pori* der vaten en blaasjes van de longen aan het bloed medegedeeld



wordt, en niet alleen aan het bloed, maar ook aan die edelste vloeistof, welke in de vliezen en zenuwachtige deelen beslooten zit, welke wanneer zy besmet is, worden daardoor het gevoel en beweging van alle de deelen onzes lichaams weggenoomen, en dus de dood veroorzaakt. 4.) Dat ook door middel van de inademing eenige fyndere deelen van het bloed met de lucht kunnen vermengd worden, kan men hieruit genoegzaam bewyzen, omdat men in het grootste verval van kragten of flauwte door sterke reukmiddelen de menschen wonderlyk weder by hun zinnen kan doen komen, en hunne kragten vermeerderen, en dikwyls de flauwte ten eenenmaale wegneemen.

§. DCXV. DOCH hoe noodzaaklyk de lucht tot het leven en de gezondheid is, blykt daaruit klaar, dat wanneer men een dier onder een glaaze klok sluit, en daar dan door middel van een *luchtpomp* de lucht uithaalt, het dier aanstonds sterft, en in tegendeel aanstonds wederom by 't leven komt, zo men het maar tydig genoeg wederom lucht geeft. De reden van deezen dood is tweederly: 1.) omdat door het uithaalen van de lucht zich de blaasjes en vaten der longen niet kunnen uitspannen, waaruit volgt, dat de omloop van het bloed door de longte niet gaat: 2.) omdat door het weghaalen van de buitenste zwaare lucht, welke het lichaam van het dier omringt,

de

de inwendige *veerkragt* van het bloed en vog-*Elater.*  
ten vermeerderd, en de vaten, voornament-  
lyk het regter *oor*, op een wonderbaare wyze *Auricu-*  
uitspannende, derzelver *famentrekking* of *la.*  
*systole* belet, zonder welkers middel het  
bloed in de vaten niet voortgedreeven kan  
worden, en daaruit volgt noodzaaklyk, dat  
het dier moet sterven, omdat de voortgaan-  
de en omloopende beweging van het bloed  
door het ophouden van de *famentrekking*, voor-*Systole.*  
naamentlyk alleen van het regter *oor* van 't hart,  
vervalt.

§. DCXVI. DAARENBOVEN moet men  
voornamentlyk dit in acht neemen in de adem-  
haaling, dat de inademing van de lucht niet  
zo zeer van de longen zelfs als wel van de  
over en weergaande uitspannende en  
saamenttrekkende beweeging van de borst af-  
hangt: want wanneer de geheele famen-  
stel der ribben door middel van de tusfchen-  
ribbige spieren, die de ribben ophigten, naar  
boven opgeligt en naar beneden bewoogen  
wordt, dan wordt de holte van het *diaphrag-*  
*ma* plat, en de holte van de borst wordt wy-  
der, en dus wordt het evenwigt tusfchen de  
buiten en binnen lucht in de borst en longen  
weggenoomen, en 'er komt een zekere holle  
plaats in de holte van de borst, welke de bui-  
ten lucht, dewyl zy door haare zwaarte wil  
indringen, noodzakelyk moet uitspannen, op-  
dat zy zelfs de plaats van de door de uitspan-  
ning



ning open gelaatene plaats vervulle : hieruit  
*Pure* blykt dat de longen in de ademing *enkel lyden-*  
*passive.* *de* zyn: doch wanneer de ribben wederom in  
*Dia-* één zakken, en het *middenrif* naar boven in  
*phragma.* de holte van de borst opgetrokken wordt,  
 dan wordt de holte kleinder, en dus wordt  
*Fistula* de lucht door de *lucht* of *gorgelpyp* eveneens  
*aërea.* als door het saamentrekken van de bladen  
*Trachea.* van een blaasbalg uitgedreeven.

### Ziektekundige Beschouwing.

§. DCXVII. 1.) ONDER de ziekten, die  
 uit een ongemak in de longen ontstaan, heeft  
 derzelver *ontsteking* byna de eerste plaats, wel-  
 ke voortkomt uit het stilstaan van het bloed  
 in de vaten der longen, welke deszelfs om-  
 loop belette : zy is of ligter of zwaarder :  
*Pleuritis* geene wordt een ware *zyde weede*, doch dee-  
*vera.* ze *longsontsteeking* genoemd; 't is een zeer ge-  
*Perip-* meenzaame ziekte, en die dikwyls voorvalt,  
*neumo-* welkers tekenen en *symptomata* zyn hoest,  
*nia.* moeiljelyke ademhaling, steekende pyn in de  
 zyde, koorts met een harde polsflag, en uit-  
 loozing van een bloedachtige stoffe.

§. DCXVIII. 2.) DE *opberfing* der longs-  
*Disrup-* vaten, en opening door al te veel bloed of  
*tio.* drang, en deszelfs uitloozing door middel van  
 hoest, welke ziekte men gewoon is *haemoptysis*  
 te noemen, welke ook of zwaarder of ligter  
 is: geene wordt dus genoemd, wanneer 'er  
 zeer

zeer veel bloed, op eenmaal tot een half of geheel pond fomtyds door den mond geloost wordt, welke niet zonder gevaar is wegens de breuk van grootere vaten; want de kwaal komt gemaklyk weerom, of gaat in een *phthis* over; dezelve is ligter, wanneer 'er een minder kwantiteit bloed gespoogen wordt, en deeze ontstaat dikwyls uit *opstopte uitloozingen* *Excreti-*  
van bloed, die haar uitgang op andere plaat-*ones sup-*  
sen zoeken. *pressa.*

§. DCXIX. 3.) EEN gemeenzaam ongemak aan de longen, is nwanneer de ademhaaling benauwd en moeiljelyk is, en wordt *orthopnoea* of *adumbaling*, die alleen regt-op zittende geschieden kan, genoemd, welke na de verschillendheid der oorzaaken meer of min gevaarlyk is, en daarom ook verscheidene naamen krygt: de *orthopnoea* geschiedt .1) door de al te groote kwantiteit en samenpakking van bloed in *plethorici* en voornamentlyk *Hypochondriaci*; zeer dikwyls ook komt zy voort uit een opgestopte bloedlozing of verzuim van aderlating, voornamentlyk ontstaat zy op die tyd, als dag en nacht even lang zyn, en wordt gewoonlyk *asthma sanguineum* genoemd: 2.) of zy *Aequi-*  
ontstaat door *opgestoptheid* der longen met zeer *noctia.*  
taaije en slymige met bloed vermengde vog-*Infarc-*  
ten, hierom hebben de meeste *plethorici*, *cachymnici* en *cachectici* in het opklimmen op hooge plaatzen een moeiljelyke ademhaling, en dit ongemak is meer *chronisch*, en wordt *asthma*  
ca-



*cachecticum* genoemd; zeer dikwyls gaat hier meede zwelling in de beenen verzeld, en 'er volgt *hydrops* op: 3.) de *orthopnoea* ontstaat door dat de longen al te groot, en buiten de maat uitgezet zyn, waarvan ons hier en daar voorbeelden voorkomen in lyken van menschen, die aan een *orthopnoea* gestorven en ontleed zyn: deeze kwaal ontstaat door een achtervolgende en al te groote uitspanning der longvaten door den traageren omloop van 't bloed; want gelykerwys de *Lien*, welke ook enkel uit bloedvaten bestaat, door de belette voortvloeiing van het bloed al te groot opzwelt, en zeer groot wordt, dus geschiedt ook dit ongemak in de long; doch hoe de vaten meer opgepropt en uitgezet zyn door bloed, zo veel te traager geschiedt de doorloop wegens de zwakte, en zo veel te eerder en gemaklyker worden de kleindere vaten geheel geobstrueerd: of 4.) de *orthopnoea* ontstaat door een *spastica stricture* van de zenuw- en vliesachtige blaasjes, en dusdanige *asthma* wordt *spasmodicum* of *convulsivum* genoemd, en is zeer gemeen in *hypochondriaci*, *hystericae* en *arthritici*: of 5.) ontstaat een *orthopnoea* door het *Extravasatio.* uitstorten van wey in een *hydrops pectoris*, welke zo zy toeneemt, belet de uitspanning der longen, en wordt eindelyk oorzaak van de dood: 'er volgt meestentyds een dikwyls en langduuriger *asthma convulsivum*, wanneer men geopende lyken van menschen, die aan *asthma*



*ma convulsivum* gestorven zyn, dikwyls eenige ponden wey buiten de vaten in de holte van de borst vindt leggen: of 6.) geschiedt 'er een moeijelyke ademhaling door een *polypus*, die of in de *ventriculi* van 't hart of in de groote vaten van de longen zit, welke door het beletten vanden vryen doorloop van het bloed, voornamentlyk wanneer het bloed door beweging van het lichaam, 't drinken van heete dranken, of door toornigheid met een zeker geweld naar de longen gevoerd wordt, de grootste engte en benauwdheid in de ademhaling veroorzaakt; deeze kwaal is zeer gemeen in sponsachtige lichaamen, en die een zittend leven lyden, en die weinig drank nuttigen; of ook 7.) ontstaat 'er een *orthopnoea* door verdrooging, en als uitteering der long-blaasjes, 't welke meest uit een uitwendige oorzaak voortkomt, by voorbeeld door damp van *steenkoolen*, dampen van *lood*, *zwavel*, *vitriool*, en deeze *asthma* wordt *metallurgicum* genoemd, omdat zy gemeenzaam in diegeenen is, welke voornamentlyk de *loodklompen* smelten: maar in Engeland is de uitteering der longen wegens de dampkring zeer gemeen; alzoo daar de zwavelige uitwaasfemingen van de aangestookene *steenkoolen* zeer meenigvuldig zyn: en de meeste menschen gaan met tering en vermindering van kragten weg: deeze wordt *Consumptio* of uitteering genoemd.

§. DCXX. HIERTOEF behoort ook de *smoorrende*

*Corbones  
fosfiles.*

*vapor sa-  
turninus.*

*Mineræ  
plumbeæ.*



*Catar- rende zinking*, wanneer het leven wegens de  
*rhus suf-* ten eenemaal belette ademhaling, en omloop  
*focati-* des bloeds door de longen, zeer veel gevaar  
*vus.* loopt: deeze heeft meest zyn oorsprong en  
 oorzaak in een *paralyfis* der zenuwen van de  
 longen, en die tot opligting en beweging van  
 de borst strekken, om welke reden het een  
 gemeenzaamer kwaal aan oude en flappe luiden  
 is; doch behoort niet vermengd te worden  
 met een *syncope* en een schielyke dood voort-  
 komende van een *Polypus*, die in 't hart of in  
 de vaten der longen zit, noch ook met  
*Suffoca-* een boven 't hooft hangende *smoothing* uit het  
*tio.* nederstorten of nederzakken van een groote  
*Fauces.* kwantiteit vocht uit de *keel* of van andere uit-  
 wendige en ruuwe dingen in de *aspera arteria*,  
 op welke oorzaaken, gelyk meestentyds ge-  
*Commo-* beurt, aanstonds een *beweging* of *onsteltenis*  
*tio.* der borst met hoest volgt.

*Phtbifis.* §. DCXXI. DE *Teering*, welke van een  
 byuitspek groote verzweering der longen met  
 hoest, koorts, magerheid, en moeiljykheid  
 in 't ademhaalen ontstaat, en dan *phtbifis pul-*  
*monalis* gewoonlyk genoemd wordt, omdat zy de  
 voornaamste plaats van deeze ziekte in de  
*pulmo* of long is; want 'er is nog een andere  
*phtbifis symptomatica*, alwaar ook desgelyks  
 een *febris hectica* met hoest, meenigvuldige uit-  
 loozing van vocht, en gebrekkige ademhaaling  
 mede gepaard gaat; desgelyks een *uitteering*  
*Conta-* van het lichaam, maar dit ongemak zit in an-  
*bescen-*  
*tia.* dere

dere ingewanden, voornamentlyk van den onderſte buik, verborgen, waarom het gewoonlyk *phthiſis hypochondriaca*, of ook wel *cachectica* genoemd wordt.

§. DCXXII. DE eigentlyke teering onſtaat *Phthiſis* meermaalen van een kwaalyk genezene bloed-<sup>*vera.*</sup> ſpurwing, deſgelyks van een obſtruſtio, ſcirrhus-<sup>*Hæmoptiſis.*</sup> centia, harde knoopen, of ook, wanneer 'er op ſommige plaatzen van de long longzweren<sup>*Duri nodi.*</sup> zyn, als wanneer 'er meestentyd een ſterke<sup>*Vomicæ.*</sup> drooge hoest mede gepaart gaat: of 'er onſtaat ook een meer vogtige *phthiſis* met zeer<sup>*Humida.*</sup> veel en zeer dikwyls etterachtig *sputum*, door een ettergezwel of *abſces*, 't welk niets anders<sup>*Apotse-*</sup> is, dan een groote invreëting van de zelfſtan-<sup>*ma.*</sup> digheid der Long door een *ſtaſis inflammatoria*<sup>*Exeſis,*</sup> van het bloed en *lympba* voortgebragt, welke dikwyls zo groot is, dat zy de geheele helft van de long verteert, alleenlyk eenige voetſtappen van vaten overlaatende.

§. DCXXIII. HET wordt een etterborst ge-<sup>*Empyema Thoracis.*</sup> noemd, wanneer een ettergezwel van de long van binnen openberst, en de etter in de holte der borst zakt, en niet uitgelooſt wordt door het ſpog.

§. DCXXIV. DE Langduurige verzwearing van *Exulceratio* de longen verſchilt van de *phthiſis apoſtematica* en<sup>*ratio chronica.*</sup> ook van een obſtruſtio in de vaten, *vomicæ*, *tuberculi*; want zy is niet zo vol gevaar, en gaat met geen *febris hectica* of *tabes* gepaard, maar blyft dikwyls den lyderen in den hoogen ouderdom



en zelfs tot den dood toe by: 'er wordt alleen een kleine stinkende etterachtige stof uitgerochelt; zy onstaat uit een klein ettergezwel, 't welk eindelyk in een *pypzweer* overgaat, deszelfs zyde *calleus* geworden zynde.

*Ulcus  
fistulo-  
sum.*

*Tussis.*

§. DCXXV. DE *hoest* is ook een ongemak van de borst, en voornamentlyk van de longen, omdat in dezelve meestentyds de oorzaak schuilt; de *Tussis* is wel een *convulsio* van den geheelen borst en zyn spieren, alzoo tegen wil en dank de geheele borst op een wonderlyke wys geschud wordt, om dat geen uit de te loozen, 't welk moeijelykheid veroorzaakt; want 'er is een groote overeenstemming tusfchen de deelen, die de borst en het *diaphragma* uitmaaken, en de longen, en voornamentlyk de *aspera Arteria*; zo derhalven in deeze deelen eenige fcherpe stof verborgen ligt, die de zenuwachtige deelen *stimuleert* en *erodeert*, wordt deeze geheele borst ook medelydzaam.

*Tussis hu-  
mida.*

*Atonia.*

*Sicca.*

*Tussis  
ferina  
convul-  
siva.*

§. DCXXVI. DE *vogtige hoest* ontstaat meest al van de groote afscheiding van het *serum* door het klierachtig vlies van de *aspera arteria* wegens de *slapheid* deezer deelen, en de moeijelyker doorloping van het bloed door de longen: doch de *drooge* onstaat meest uit een *stimulus* van een weinig daar zynde stof, die de zenuwachtige deelen prikkelt, en wordt ook gemeenlyk een *harde convulsive hoest* genaamd.

§. DCXXVII.

§. DCXXVII. HIER toe behoort ook de *Tussis* stikkende hoest, welk als een soort van *Epilepsia* <sup>*suffocativa.*</sup> *Thoracis* is, en welke met groote hevigheid en schudding deszelfs geschiedt, terwyl het aangezicht paers en blaauw wordt, en de lyder geen adem kan haalen, en deeze ziekte tast meest tedere en jonge kinderen aan; zy ontstaat gemeenlyk uit de belette *transpiratie* en ook *critique* en *exanthematicque excretie* van het zeer scherpe *serum*, dat in de zenuwachtige deelen der longen zit.

### III. H O O F D S T U K.

#### VAN 'T HART EN HARTE ZAKJE.

DCXXVIII. **H**ET *hart* is het voornaamste deel onzes lichaams, van 't welke het leven allernaast afhangt, dewyl het den omloop van het bloed eeniglyk be- *Cor.* stiert, welke tegenwoordig zynde zo is het leven daar, doch weggenoomen zynde volgt 'er de dood op. Om welke redenen de Ontleed- en Natuurkundige niet 't onregt het hart het eerst bewegend en 't laatst stervende gedeelte onzes lichaams genoemd hebben.

§. DCXXIX. HET legt in het middendeelte van het lichaam, namentlyk in de holte van de borst en longen, en legt in derzelver midden, en wordt van dezelve omringt, zodat deeze met het hart alleenlyk de geheele holte van de *borst* vervullen.

§. DCXXX. HET hart wordt met de lon-

*Thorax.*



gen door middel van de groote vaten, namentlyk de zogenaamde *Longs-flagader* en *ader* *Arteriaet vena* vereenigd, en wordt ook met het *diaphragma*, *pneumonica.* en wel door behulp van het *harte zakje* *Pericardium.* vereenigd, 't welk echter maar alleen in den mensch geschiedt.

§. DCXXXI. TEN opzichten van deszelfs maakzel en saamenstelzel is het hart alleen een spier, 't welk HIPPOCRATES in zyn tyd al aangemerkt heeft. Echter bestaat het niet uit eene, maar uit vier verscheidene spieren, namentlyk twee grootere en twee kleindere: geene zy die, welke de twee *buiken* van het hart saamenstellen: doch deeze maaken de twee *Ooren* uit: *Ventri- culi.* deeze spieren zyn ook met verschillende bewegingen begaafd; want wanneer het regter oor zich saamentrekt of in *systole* is, dan ontspant zich de regter buik van 't hart, of is in *Diastole*: en in tegendeel wanneer het linker oor in *systole* is, dan is de holte van de linker buik in *Diastole*: om deeze redenen geschiedt de *polsflag.* *Auriculae.*

§. DCXXXII. DOCH men moet aanmerken, dat de rechter buik grooter dan de linker, en dat zy geheel anders saamgesteld is; want zy is veel grooter en wyder, en derzelver vezelen en kolommen, welke een saamvergadering en ophooping van deeze vezelen zyn, zyn zo sterker niet, dan het linker, 't welk wel enger, maar veel dikker is, en daarom is deszelfs *kragt*, *beweging*, *elater* en *impulsus* veel sterker: deeze is ook eenigzins *Nisus.* hol.

holachtig en halfmaansgewys, 't welk de regter holte van 't hart eenigermate omvat; ten anderen is het regter oor ook veel grooter als het linker, en verschilt daarom ook in maakzel: want het vertoont eenigerwys de gedaante van een *banekam*, gelyk Ruysch wel *Crista* aanmerkt, *Epist. Anat. X.* Het zit vast aan *galli.* den vliesachtigen zak, in welke uit beide de zyden der longen twee, en dus vier eindigen: en dus wordt het bloed uit de longen niet aanstonds in het linker oor gestort, maar loopt eigentlyk in deezen rok; doch het regter oor is met dergelyken zak niet voorzien, en het bestaat geheel uit vleesch-*bundeltjes* en kolommen. *Fascicu-*

§. DCXXXIII. HET gebruik deezer ooren, *li.* welke spieren van 't hart zyn, is, dat zy de beweging van het bloed, dat langzamer uit de *venæ* terug keert, helpen, opdat derzelve omloop egaal blyve.

§. DCXXXIV. DE reden, waarom het regter oor sterker dan het linker is, is deeze, opdat het aangebragte bloed uit de *vena Cava* gevoerd, 't geen traager blyft voortloopen, zo veel te schielyker naar de regter holte van het hart voortgedreeven zoude worden; maar alzo het bloed, dat uit de long na de linker *boezem* gebragt is, niet alleen vloeibaar is, maar ook door zyne zwaarte als van zelfs in *Sinus.* het zelve neerzakt, daarom was het noodig, dat het linker oor met zulke sterke vezelen voorzien was.



§. DCXXXV. Vervolgens is het aanmerkelyk, dat de beweging van de *auriculæ* en het hart beurtelings geschiedt, zodat, wanneer het hart in *Systole* is, dan zyn de *auriculæ* in *Diastole*, dat is, wanneer het bloed met een stoot uit het hart in de slagaderlyke vaten uitgedreeven wordt, dan krygen zy op dien zelven tyd weder ander bloed uit de aderen: gelyk integendeel, wanneer de *auriculæ* in *systole* zyn, dat is, als zy door toetrekking het uit de aderen ontfangen bloed in de boezems van 't hart storten, dan zyn de *ventriculi* van het hart in *diastole*, dat is, ontfangen het bloed uit de *auriculæ*. Deeze beurtwyze of over en weergaande werking van de *auriculæ* en het *cor* brengt te weeg, dat het bloed als het water van de kruin van een berg geduurig voortgaat, en zynen omloop volvoert: doch zo haast deeze beweging in eene plaats hindering krygt, dan wordt de omloop van het bloed ten eenemaal niet zonder verlies van gezondheid of levensgevaar verontrust en gestoord.

§. DCXXXVI. Te regt is het hart van de Ouden de bron des levens, 't eerste begin van leven en 't laatste van alle stervende genoemd: niet buiten reden wordt het ook het begin van alle slagaderen en aderen genoemd, en uit het zelve gaan twee bloedvaten, 't een aderlyk, namentlyk de *bolle ader*, en 't ander slagaderlyk, namentlyk de *longs-slagader*, van welke vaten de een groot, namentlyk de *vena Cava*; doch

*Vena  
cava.*

*Arteria  
pulmo-  
nalis.*

de

de ander klein is, namentlyk de *arteria pulmona*'is: maar de *vena cava* gaat in het hart, en brengt het bloed uit het geheele lichaam weder terug in de *rechter buik*, en de groote slag-<sup>Ventri-</sup>  
ader voert het bloed door het gantsche lichaam; <sup>culus</sup> *dexter*.  
doch de kleindere vaten volvoeren alleenlyk <sup>Aërta</sup>  
den omloop van het bloed uit den eenen na de <sup>sive arte-</sup>  
andere *Ventriculus* door het midden inleggende <sup>ria mag-</sup>  
lichaam der long. <sup>na.</sup>

§. DCXXXVII. MAAR het samenstelzel en maakzel der slagaderen is aanmerkelyk, welke, zo men de zaak naauwkeurig overweegt, niets anders zyn, dan spierachtige buizen en kanaalen, of spieren die in kanaalen uitgerekt zyn; want derzelver voornaamste werking is, dat zy zich kunnen uitzetten en saamentrekken, zodat zy eveneens als de *ventriculus cordis* door het ontfangene bloed uitgezet worden en daarna wederom samengetrokken zynde, het bloed in de *vena* voortdryven: derhalven zyn zy niets anders, dan een verlenging van de linker *ventriculus* van 't hart.

§. DCXXXVIII. DEEZE zyn zelfs met verscheide vezel- en spierachtige *rokken* voorzien; *Tunicae*.  
en 't is aanmerkelyk, dat zy ten deele uit *langwerpige*, en ten deele uit *dwarfe* en *ron-* <sup>Longi-</sup>  
*de* vezelen zyn saamengefelt: zy hebben ook <sup>tudinalis;</sup>  
haare vaten en takjes van zenuwen: hierom <sup>transver-</sup>  
hebben sommige een vatachtig en byzonder *Spiralis*.  
zenuwachtig vlies vastgestelt, en dat zy niet



*Motus.* alleen met een *lydende* maar ook *werkende bewe-*  
*passivus* *ging*, welke de spieren eigen is, namentlyk  
*& acti-* *samentrekkende en ontspannende*, voorzien zyn, door  
*pus.* welkers behulp het bloed door het aderlyk *syste-*  
*Systal-* *ma* omgevoert wordt. Breng hier mede overeen  
*ticus.* het werk van LOWER over de Anatomie en  
*Diastai-* zelfstandigheid van 't hart; BORELLUS *de motu*  
*tigus.* *animalium* HOFFMAN *de pulsuum Theoria.*

*Pulsus* §. DCXXXIX. AANGAANDE de *klopping*  
*arteria-* der slagaderen moet men ook dit aanmerken,  
*rum.* dat dezelve niets anders zy, dan een verwy-  
ding der slagaderen, die tegen den vinger van  
den taster aanstoot, welke ontstaat door de  
voortdryving van het bloed uit de regter *ven-*  
*triculus* van 't hart in de *arteriæ*, waardoor het  
geschiedt, dat door de in grootere kwantiteit  
invloeiend bloed derzelve zyden buiten-  
waars uitgezet worden: derhalven is de pols  
een aankondiger van de beweging van 't hart,  
en gevolgelyk van den omloop van het bloed,  
en deszelfs nette kennis, zo wel in den  
natuurlyken staat, is den Geneesheer ten hoog-  
sten noodig om het *temperament* te kunnen  
weeten, als in den tegennatuurlyken, voorna-  
mentlyk koortzigen staat.

§. DCXL. DERHALVEN maakt het oor  
niet alleen, maar ook de *arteriæ*, de werktuigen  
van den omloop des bloeds, welke wanneer  
zy saamengetrokken worden, het bloed in de  
*venæ* zelfs storten, die uit verscheide spier-  
achtige vezelen en lamellen bestaan; echter  
heb-

hebben zy geen saamenttrekkende kragt, na-  
dien het met derzelver maakzel en samenstel-  
zel niet eveneens, als met de *arteriæ* ge-  
legen is; derhalven zyn zy meer voorzien  
met *tonus* als beweging, door welkers behulp  
zy weerstand kunnen bieden tegen het bloed,  
dat van *achteren* aankomt. *a tergo.*

§. DCXLI. EINDELYK is het een zeer  
keurlyke waarneeming, dat 'er in een *foetus*,  
zolang het in de lyfmoeder zit, geen om-  
loop uit den eenen *ventriculus* door de longen in  
den anderen geschiedt, gelykerwys in die gee-  
nen, welke het licht aanschouwd hebben;  
maar daar is een ander en korter weg uit  
de regter *ventriculus* naar de linker, alzoo 'er  
ommidlyk uit de *vena Cava* een zeker *slagader-*  
*lyk kanaal* na de linker holte loopt: daarna ont-  
dekt men nog een ander kanaal tusfchen de *Canalis arterie-*  
*sius.*  
*arteria aërta* en *pulmonalis*, 't welk *slagaderlyk*  
genoemd wordt, doch dit brengt het bloed  
zelfs het allernaast uit de regter *boezem* van  
het hart in de *groote slagaderen* over; maar by-*Sinus.*  
vervolg van tyd gaan deeze twee kanaalen toe: *Aërta.*  
in het *foetus* echter zyn zy doorgaande en open;  
de reden hiervan is, dat een *ongeboore kind* in de  
lyfmoeder geen ademhaalt; en het blaasachtig *Embryo.*  
gestel der longen door de zwaare lucht der  
dampkring niet uitgespannen en uitgezet  
wordt.

§. DCXLII. DAARENBOVEN is het hart  
met eigene *arteriæ* en *venæ* voorzien, welke



*Coronaria.*

in deszelfs zelfftandigheid indringen om het te voeden ; deeze worden *kroon-waten* genoemd, omdat zy het hart als een kroon omringen ; de *arteria* heeft haaren oorsprong uit de *arteria magna*, namentlyk in dat gedeelte van dezelve , alwaar zy uit de *ventriculus* gaat , digte boven de *halvemaansche klapvliezen*: maar de kroonader komt uit de *vena cava* voort, ter plaatze daar zy in 't hart gaat, en boven de *driepuntige klapvliezen*: en behalven deeze heeft het hart ook zenuwen , welke haaren oorsprong hebben uit het *par vagum* en *intercostale*; derzelver takken loopen meest naar de *arteria pulmonalis*, en het onderfte gedeelte van 't hart, alwaar zy tusfchen de *arteria bronchialis* en *arteria magna* ingeplant worden.

*Valvula semilunares.*

*Tricuspidales*

*Valvulae*

§. DCXLIII. EINDELYK zyn de *klapvliezen* onze opmerking waardig: deeze zyn tweederly, wyl zy wegens haare gedaante, welke zy hebben , *semilunares* of *tricuspidales* zyn; de eerfte zyn geplaatst in de *vasa arteriosa*, namentlyk de *arteria pulmonalis* en *arteria magna*; maar de *tricuspidales* in de *venae*, namentlyk de *vena cava* en *pulmonalis*. Deeze klapvliezen zyn van een uitfteekend gebruik en helpen veel tot den geduurigen en onverhinderden omloop des bloeds, nademaal de *Valvulae tricuspidales*, die in de *venae* geplaatst zynde, wanneer het faamgetrokken hart het bloed in de *arteriae* ftort, beletten, dat het zelve zynen loop naar hetzelfde hervatten. Met de *semilunares* in de  
*vasa*

*vasa arteriosa* is het op dezelfde wyze geleege, welke onder het verwyden van het hart, en instorting van het bloed uit de *venæ* in 't hart, beletten, dat het bloed naar de *venæ* niet weder om terug zoude gaan: weshalve de nuttigheid deezer klapvliezen zeer groot is tot den omloop van het bloed, waarom men ook in geen één dier een hart vindt, 't welk niet met ooren en deeze klapvliezen voorzien is.

*Ziektekundige Verhandeling.*

§. DCXLIV. 1.) MEN vindt in sommige voorwerpen een verbaast groot hart, en gelijk het spreekwoord zegt, is het een teken van laf- of bloohertigheid. Dergelyke hart heeft men waargenoomen in die, welke aan een *hartklapping* onderhevig waren, en waar *Palpitatio cordis*, ook een *polypus* in 't hart zat.

§. DCXLV. 2.) SOMTYDS vindt men een al te klein uitgeteerd en verdroogt hart in sommige voorwerpen: Zie BARTHOLYNS *Anatom. Lib. 2 cap. 6.* KERKRING. *observ.*

§. DCXLVI. DOCH dit is wel opmerkings waardig, dat de wydte der vaten van het geheele lichaam gemeenlyk overeenkomt met de wydte van het hart; hierom hebben meestentyds diegeene welk kleine vaten hebben, gelijk vette menschen en met een sponsgieus lichaam voorzien zyn, gemeenlyk ook een klein hart, en integendeel welkers vaten wyd en groot zyn, die hebben ook een groot hart.

§. DCXLVII.



§. DCXLVII. 3.) DE omkeering of *inversio Cordis*. Zie het *schediasma* van myn vader *Fred. Hoffman* de *Cardianastrophe*.

§. DCXLVIII. 4.) DE *palpitatio cordis*, 't welk een *convulsio* in het zelve is, wanneer het hart van zyne legging en plaats bewoogen wordt wegens de groote en vermeerderde invloeiing *Fluidum*. van het *zenuwvagt*, of ook stilstaande bloed, en *nervuum*. heeft veele oorzaken: want het ontstaat uit een grooté gemoedsbeweging, by voorbeeld schrik enz.: of al te groote *ophooping* van 't bloed in 't hart in *Hystericæ* en *Hypochondriaci*; of zo zy oud en langdurende is, dan ontstaat zy meestentyds door een *polypeuse* saamenrunning van bloed.

§. DCXLIX. 5.) ALLERLYE soort van koortzen zyn ziekzens van 't hart en slagaderlyk gestel, voortkomende uit een vermeerderde bloeds omloop, welke ontstaat uit een raser en geweldigere beweging van het hart en slagaderen; want een *rasfer slagader pols*, welke *Pulsus* men kent uit de schielyk op elkanderen volgende polsslagen, is een *essentieel*, *pathognomonisch* en altoos duurend teken van de koortzen.

§. DCL. 6.) DE *Lypothymia*, zwymeling of slaauwte, ontstaat doordat het bloed eenigen tyd stilstaat, waardoor de omloop belet wordt, de uiterste deelen koud zyn, 't gevoel en beweging benevens de warmte weggaan. Doch hiervan zyn verscheidene oorzaken; want of de zenuwen van het hart worden

den door een sterke *spasmus* saamengetrokken, en dus gaat de beweging van het hart weg, wyl de invloeiing van de geesten belet wordt; gelykerwys ook geschiedt door zwaardere en hevigere gemoedsbewegingen, of ook door stuip of kramptrekkingen, *hyponchondrische* en *hysterische* samentrekkingen der zenuwachtige deelen: of ook ontstaat dezelve doordat de *ventriculi* van 't hart, doch meest van de *auricula sinistra*, al te sterk uitgezet worden; wanneer namentlyk door het aldaar stilstaand en *rarefierend* bloed derzelver vezelen buitengewoon te uitgerekt, niet in staat zyn om de groote kwantiteit van bloed uitteftorten, en de omloop des bloed te agtervolgen, gelykerwys men meest in *plethorici* ondervindt, wanneer zy na het gebruik van al te veel geestryke spys en drank zichzelve aan zeer heete lugt bloot geeven, of ook in warme baden gaan.

§. DCLI. 7.) DE doodelyke *smoorling*, *Suffocatio lethalis*, welke ontstaat door *polypi*, welke of in 't begin van de *vena cava* zitten, of de *arteria pulmonalis* verstoppen, en in dezelve vastzitten, en dus wordt 'er een beletzel in den geheelen omloop van het bloed veroorzaakt, waaraan de menschen gemaklyk smooren, en daarna op hun bed dood gevonden worden.

§. DCLII. 8.) DE benaauwtheid voor 't hart, welke zeer gemeenzaam aan koortzigen *Præcordiorum anxietas* is, of welk door kramptrekkingen veroorzaakt wordt: zy ontstaat door de al te groo-



*Thalami.* groote oppakking van het bloed omtrent de leggingen van 't hart, en gaat meest gepaart met koude in de uiterste deelen.

*Cordis tremor.* §. DCLIII. 9.) DE beeving van 't hart; welke zeer gemcen in *Hypochondriaci* en *hystericae* is; dezelve ontstaat, omdat de *plexus præcordiales* met ligte kramp of stuiptrekkingen aangedaan worden; dat 'er beenen en steenen, ja zelfs wormen in de *ventriculi* van 't hart gevonden zyn; wordt door veele bevestigd. Zie *Miscell. Nat. Curios. Dec. I. Ann. I. obs. 50. Ann. IX. en X. obs. 13. Dec. III. Ann. I. Append. 103. Dec. I. Ann. III. obs. 182.*

§. DCLIV. 10.) WAT de kwetziuren van het hart betreffen, dezelve moeten wegens de al te groote en doodelyke uitstorting van bloed noodzakelyk den dood veroorzaaken, uitgezonderd in sommige gevallen, wanneer zy niet in de holte van 't hart gaan.

#### IV. H O O F D S T U K.

##### VAN HET BORTSVLIES, MIDDEN- SCHOTEN HARTE ZAKJE.

*Pleura.* §. DCLV. HET *borstvlies* bekleedt de geheele holte van de borst, en dit vlies zit zeer

*Musculi intercostales.* vast aan de *tuschen-ribbige spieren*, en de ribben zelfs, en is dubbeld, welkers buitenste gedeelte harder en dikker is, het binnenste, dat dunder is, legt naast aan de ribben, doch  
door

door de verdubbeling van dit vlies loopen slagaderlyke en aderlyke vaten, ook tusfenribbige zenuwen, de *vena azygos*, en zelfs de *ductus Thoracicus*, en tusfchen deeze verdubbeling van het borstvlies, en de *musculi intercostales*, wordt fomtyds zelfs een etterachtige stof verga- dert.

§. DCLVI. HET *middenscbot* heeft ook zyn *Medias-* oorsprong van het *Pleura*, 't welke uit het *tinum*. midden van de borst naar de rug gaande dit vlies met twee lamellen maakt; doch het verdeelt de holte van de borst in de lengte in twee deelen of zyden, en fcheidt de regter van de linker long af.

§. DLVII. WAT het *harte zakje* aanbelangt, *Pericar-* dit bestaat ook uit een tweevoudig vlies, ge- *dium*. lyk men in een *hydrops pericardii* zeer wel kan zien; doch dewyl dit teregt de moeder of voortbrengster van alle de vliezen, welke de *arteriæ* en *venæ* van buiten famenhegten (ge- lyk wy te voren gemeld hebben) genoemd wordt, zo zien wy, dat de *hypothesis* van die geenen, welke zeggen, dat het *pericardium* een *tunica* krygt van het *pleura*, valsch is. Want gelykerwys de *dura mater* aan het *Cerebrum*, en de *Nervi* zelfs het buitenste bekleedzel geeft, zo geeft ook het *pericardium* het eerste be- *Lamella*. kleedzel aan de *arteriæ* en *venæ*: doch door het *pericardium* worden niet alleen takken van bloed- en watervaten verspreid, maar ook zenuw- takken, alzo de aanmerkelyke groote longs-  
zenu-



zenuwen langs de lengte van de *aspera arteria* naar het *diaphragma* loopen, en door het vlies van het hart doorgaan: het *pericardium* is in een mensch zeer sterk vastgehegt aan het *diaphragma*, 't welk in dieren anders is. MALPIGHIIUS is van gedagten, dat deszelfs binnenste vlies enkel klierachtig is, 't welk het water afscheidt, dat het hart bevoogtigt, omdat men gewoonlyk een gedeelte van vocht tusfchen het *cor* en *pericardium* vindt: doch deeze zwaarigheid kan be-  
wezen worden; andere ftellen, dat dit vocht zyn oorfprong heeft uit de klieren, welke rondom de *auriculæ* leggen, en welke zy *exiles* noemen: andere willen liever ftellen, dat dit vocht zyn oorfprong ontleent uit de dampen van het in de boezem van 't hart warmgemaakte bloed, en dat in het *pericardium* geconcentreerd wordt; doch het fchynt eer waarfchynelyk te zyn, dat dit vocht uit de uitgezette en geopende *pori* en openingen van de *auriculæ*, en voornamentlyk van het rechter oor, door het al te sterk vastgepakte bloed druppelt en doorzygt, omdat, wanneer 'er een *polypus* of hartklopping plaats heeft, het daar in de *sinus* van 't hart opgehoopt bloed minder fchielyk doorloopt, en men een groote kwantiteit van vocht in het *pericardium* vindt, zodat het ook in een zeer groote kwantiteit vergaderd zynde een byzonder foort van een *hydrops* krygt.

*Ziektekundige Verhandeling.*

§. DCLVIII. 1.) EEN zeer groote *steekende* *Acutus*  
*pyn* in de tusfchen-ribbige vliezen, welke on- *dolor.*  
 der den naam van *Pleuritis spuria* voorkomt,  
 ontstaande uit de aldaar ftilstaande fcherpe  
 wey: zy verfchilt van een *Pleuritis vera* niet  
 alleen in gevaar maar ook door derzelver  
 grooter koortsachtige beweging en hette, en  
 teffens ook veel in de manier van derzelver  
 geneezing.

§. DCLIX. 2.) EEN *Empyema*, welke ont-  
 staat, door dat 'er *pus* tusfchen het *pleura* en  
*musculi intercostales* vergaderd wordt, wegens  
*inflammatie* in deeze deelen, voornament-  
 lyk wanneer dezelve met vette geneesmidde-  
 len behandelt is.

§. DCLX. 3.) DE *inflammatie* en *abscessus*  
*mediastini*, welke zeldzaame kwaal echter van  
*Riolanus in Enchiridion Anatom.* pag. 290 befchre-  
 ven wordt; en dit ongemak wordt geneezen  
 door het *perforeeren* van het *sternum*.

§. DCLXI. 4.) DE *vaſte pyn* in het *sternum* *Dolor fi.*  
 ontstaat, door dat het aldaar tusfchen des- *cus.*  
 zelfs vliezen gebragte *serum* ftil ſtaat en fcherp  
 wordt.

§. DCLXII. 5.) HET wordt een *Hydrops pe-*  
*ricardii* genoemd, wanneer 'er een groote  
 kwantiteit *serum*, 't geen zomtyds wel op twee  
 ponden beloopt, tusfchen het hart en harte-  
 zakje gevonden wordt. De reden hiervan is



meestentyds de al te traage voortgang van het bloed door het hart, wegens een daar zittende *polypus*, of wanneer de longen door een *asthma convulsivum* saamen getrokken worden, 'er een *hydrops thoracis* ontstaat, welke een onafscheidelyk medgezel is in de geenen, welke aan een *asthma convulsivum* onderhevig zyn, en waardoor meestentyds de dood veroorzaakt wordt. Zie myne *Disfertatie* over de *asthma convulsivum* met een *hydrops thoracis*. In dit geval is de *paracenthesis* noodig. Buiten twyfel komt dezelve voort uit de opgeberste water-vaten tusfchen het *pleura* of *pericardium*.

---

## DERDE VERDEELING.

### VAN DE BOOVENSTE HOLLIGHEID, NAMENTLYK HET HOOFD.

#### I. HOOFDSTUK.

*Van het Bekkeneel, en deszelfs buitenste deelen.*

*Cranium.* §. DCLXIII. **H**ET Bekkeneel of de hersen-  
*Integumenta.* *Pili.* *Cuticula.* *Cutis.* *pan* wordt met verscheide  
 bekleedzelen bedekt, welke zyn 1.) de *bairen*,  
 2., de *opperhuid* met de *huid*, 3.) het daaronder  
 zittende vet, 4.) het spierachtig vlies voor-  
 naa-

naamentlyk op de *slaapen van 't hoofd*; 5.) het *Tempora-*  
*panvlies*, 't welk namentlyk uit verscheide la- *Pericra-*  
 mellen saamgesteld is: deszelfs verdubbeling *nium.*  
 ziet men duidelyk in de *slaapspieren*, welke *Musculi*  
 eenigzins midden in het zelve leggen; het *Tempora-*  
 heeft een uitstekend gevoel, alzoo 'er een tak *les.*  
 uit het vierde paar zenuwen na het *pericrani-*  
*um* loopt. Door het zelve verspreiden zich  
 ook aanmerkelyke bloedvoerende vaten, slag-  
 aderen, en aderen, en door dit vlies loopen  
 zy na het *Merg* van 't bekkeneel, 't welk door *Medulla:*  
 de Ontleedkundige met den naam van *Hersentaf-*  
*fel* of *Diploë* genaamt wordt: in dit vlies bren-  
 gen de vaten hun bloed: dit *pericranium* is zeer  
 vastgehegt aan het been, zodat men het zel-  
 ve niet dan met moeite daar van kan affchei-  
 den.

§. DCLXIV. HET *pericranium* is met een vlee- *Pannicu-*  
*schig* of liever vettig vlies bekleed, door het *lus car-*  
 welke groote slagaderlyke en aderlyke vaten *nosus.*  
 loopen, welke hunnen oorsprong uit de *Caro-*  
*tis* en *vena cava* hebben, alwaar een grooter  
 tak boven het oor voortkomt, en met verschei-  
 dene takjes en spruitjes het geheele hoofd om-  
 loopt, 't welke, wanneer het in deeze vaten  
 stilstaande vogt de vaten drukt en uitzet, py-  
 nen veroorzaakt; de zitplaats van de hoof-  
 pyn is zelden in de vliezen, by voorbeeld in het  
*harde* of *zachte vlies*, maar zit het meesten en *Dura aut*  
 byna altyd in het *pericranium.* *pia mater*

§. DCLXV. HET *Cranium* geopend zynde,



*Meninges.* komen ook de zogenaamde *harsfen-vliezen* voor; het eerste wordt het *harde*, en 't andere het dunne of *zagte* harsfenvlies genoemd. *Dura et pia mater.* Het harde vlies bestaat ook uit twee lamellen, welkers bovenste harder en ruwer, doch het onderste zagter, en als glad en gepolyst is.

*Processus.* De *dura mater* heeft twee voortbrengzels of uitsteekzels; het een loopt langs de lengte aan de *Cerebrum.* hersenen, en heeft de gedaante van een zeisfe, *Falci formis.* en scheidt de twee halve ronde gedeeltens der hersenen van een, en het loopt tot het *Hemisphaeria.* weeragtig been, en is aan de baane kam vast gehegt; het zelve belet, dat de eene *hemisphaeer* de andere niet kan drukken: de tweede *processus,* die dieper in de hersenen legt, scheidt de *Cerebellum.* groote *hersen* en kleine van elkander, en belet insgelyks, dat zy elkander over en weder drukken kunnen.

§. DCLXVI. DE *Dura mater* heeft ook byzondere vaten, die door het zesde gat van het *Foramen.* *cranium* ingaan, en na het zelve loopen; zy worden in twee takken verdeelt, in een *Occiput.* grooter, die na het *achterhoofd*, en in een kleinder, *Sinciput.* die naar het *voorste gedeelte* van 't *hoofd* loopt.

§. DCLXVII. DAAR gaan ook door dit zelfde ronde gat zenuw-takken na de *dura mater*, die te weeg brengen, dat dit vlies zeer scherp van gevoel is: doch dit vlies heeft ook veele *plooijen* of *boezemen*, welke niets anders zyn, dan grootere wydere *aderlyke buizen*; want zy werken als *venæ*, en brengen het bloed

bloed uit de zelfstandigheid en slagaderlyke vaten te rug; deeze *ductus* loopen tusfchen de verdubbeling van dit vlies: de eerfte wordt de langwerpige of *zeisfegewyze boezem* genoemd, *Longitudinalis.* welke nochtans in geene deelen, gelyk het *Sinus fal-* gemeen gevoelen is, tot aan de *crista galliciformis.* loopt, maar derzelver holligheid vindt men maar alleenlyk tot deszelfs midden toe: zy is van een driehoekige gedaante, en men ftelt ten on- *Triquetra.* regte, dat de opening dezer boezem een oorzaak van de geweldige neusbloeding is. Behalven deeze grootere *sinus longitudinalis* is 'er daarenboven nog een kleinder *falciformis*, onder deszelfs *uitsteekfel*, welke de *Sinus Wil-Processus* *lisianus* genoemd wordt, en deeze legt boven op het weeragtig lichaam, doch beide deeze *sinus falciformes* worden in de zydelingfche boe- *Corpus calosum.* zemen ingeplant, dikwils in de rechter, dik- *Sinus la-* wils in de linker. *terales.*

§. DCLXVIII. DAARENBOVEN moet men omtrent de *sinus longitudinalis* opmerken, 1.) dat men verfcheidene vliesagtige *processus* van de eene zyde van de *sinus-dwars* na de andere *Tranver-* dwarfche zyde loopende vind, welke *valvulae* *sum latus.* genoemd worden, 2.) dat 'er *venæ* uit de *pia mater* na deeze *sinus* gaan, welke men ook door af snyding en fcheiding van het *Cerebrum* moet afscheiden.

§. DCLXIX. WAT meer is, men vindt in het achterhoofd nog twee aanmerkelyke boezemen, de zydelingze genoemd, rechter en *Sinus la-* *terales.*



*Fosfa transver-* linker, en deeze loopen door het *fchuinsche gat*  
*salis.* van het *achterhoofds been*, en krygen midden in  
*Os occi-* de *fosfa* van het slaapbeen een kromte, waar-  
*pitis.* om zy ook booge of *kromme* genoemd wordt.  
*Flexuosi.* §. DCLXX. DE vyfde legt diep binnen in,  
 nochtans is dezelve klein, zyn oorsprong om-  
*Glandula* trent de *pyn appelklier* hebbende, en loopt  
*pinealis.* fchuins na boven; doch opent zich in de *si-*  
*mus laterales*, en de plaats, daar dit voorvalt,  
*Torcular.* noemt men de *pers*.

§. DCLXXI. DE zesde en zevende worden  
*Laterales* de *kleindere zylingfche* genoemd, derzelve be-  
*minores.* gin is omtrent het midden van het *os occipitis*  
 in het achterfte gedeelte der *dura mater*; zy  
 komen van de grootere zylingfche boezemen  
 voort, en infereeren zich ook met een dwar-  
 fe of fchuinfe buis in de *laterales* digte by der-  
 zelve *curvatuur*.

§. DCLXXII. DE agtste wordt de *regte* van  
*Rectus* *Fallopious* genoemd, welkers oorsprong binnen  
*fallopiz.* midden in het *os occipitis* is.

§. DCLXXIII. DE negende, tiende, elfde,  
*Ephippi-* en twaalfde zyn de vier *paards-zaalboezemen*, wel-  
*ales.* ke omtrent het *paards-zaalbeen* te vinden zyn,  
*Sella* en door VIDUS VIDIUS uitgevonden, doch  
*Turcica.* thans weer door VIEUSSENS op nieuw  
 in aanmerking gekomen en beschreeven zyn.

§. DCLXXIV. DE dertiende ontdekt men  
*Sinus sel-* in het begin van de grooter *paards-zaalboezemen*,  
*la Turci-* en loopt dwars of fchuins over de *basis* van  
*ca majo-* het *occiput*,  
*res.*

§. DCLXXV.

§. DCLXXV. DE veertiende is die krings-*Circularis.*  
 gewyze rontom de *sella turcica* tusfchen de vier  
*uitsteekzels van het wiggebeen*, en *infereerd* zich in *Proces-*  
 de *Ephippiales*, welke eertyds ook door VI-*Sphenoi-*  
 DUS VIDIUS beschreeven zyn. *des.*

§. DCLXXVI. DE vyftiende en zestiende  
 worden *Spænoidales* genoemd, deeze leggen in  
 het *steenbeen*, en *infereeren* zich in de *ephippiales*. *Os petro-*  
*sum.*

§. DCLXXVII. DE zeventiende, de *cir-*  
*cularis Willifii* genoemd, is in het groote gat  
 van het *os occipitis*, en *communiceerd* met de *venæ*  
*vertebrales*.

§. DCLXXVIII. ALLE deeze *sinus* zyn  
 als (\*) *venæ*, omdat zy het uit de flagaderen  
 na het *Cerebrum*, en ook de *dura* en *pia mater*  
 overgebragte bloed terug brengen, en  
 ftorten het in de twee zoogenaamde groo-  
 tere *sinus laterales*, waar door het eindelyk  
 na de *jugulares*, en dus na de *ventriculus dex-*  
*ter cordis* loopt.

§. DCLXXIX. HET tweede harsfen vlies,  
 't geen onder de zogenaamde *dura mater* legt,  
 wordt de *pia meninx* of *mater* genaamd; en dit  
 is zeer dun, en omkleedt het naaste de *scors-* *Cortica-*  
*achtige* zelfftandigheid der hersfenen; door het *lis.*  
 zelve

(\*) Waarin deeze *sinus* met de *venæ* overeenkomen,  
 en integendeel waarin zy van dezelve verschillen, kan  
 men de *physiologie* by den Drukker deezes uitgekomen op  
 pag: 362 nazien, en teffens of zy haar bloed uit de flag-  
 aderen ontfangen of niet, zie het zelfde werk op pag: 366.



zelve loopen zeer veel, doch echter kleine vaten.

§. DCLXXX. HET is zeer aanmerkenwaardig, dat dit vlies geheel en al van het *Cerebrum* kan afgescheiden worden, terwyl intusschen deszelfs vaten geheel blyven, welke met was of rood vogt opgespooten zynde een zeer fraaije vertooning geeven; de *Arteriae* leggen daar haare dikke bekleedzelen af, zo dat zy zich gelykerwys de *venæ* rood vertoonen; doch dit vlies bekleedt ook het onderste gedeelte van het *Cerebrum*, namentlyk het

*Medulla oblongata.* zogenaamde *Verlengde merg*, de *ringswyze uitsteekzels*, de *beddens der gezicht-zenuwen*, de *testes*, *Proces-* nates, *vulva* en *pyn-appelklier*.

*Arachnoidea.* §. DCLXXXI. 'ER is onlangs nog een der *Thalami optici.* de *Tunica* ontdekt, 't welke het *Spinnewebsvlies* genoemd wordt; het legt tusschen de *Glandula pinealis.* *ra* en *pia mater*; vooral ziet men het in 't *rug merg*, en de *basis* van het *Cerebrum*; het is van *Ruysch* beschreven; men kent het in een tegen-natuurlyke staat gemakkelyk, namentlyk wanneer het *serum* tusschen de *dura* en *pia mater* stilstaat.

§. DCLXXXII. VERVOLGENS moet men aanmerken, dat men deeze drie vliezen door het geheele merg in eene *continuatie* vindt, en zy bekleeden zelfs het merg, en maaken het eerste vlies of bekleedzel van alle de zenuwen.

*Ziektekundige Verhandeling.*

§. DCLXXXIII. 1.) EEN *Waterhoofd*, 't *Hydrocephalus*.  
geen in pas geboorene kinderen gemeenzamer  
dan in volwasfene is, ontstaat meestentyds door  
de al te fterke famendrukking van het hoofd  
in een moeilijke verlossing; doch zy is twee-  
voudig: want of het *serum* ftaat tusfchen het  
*cranium* en *cutis* ftit, welk ongemak men door  
fnyding gemakkelyk kan geneezen, of 'er  
wordt tusfchen de *dura* en *pia mater* een al te  
groote kwantiteit *Serum* vergadert, of het  
gefchiedt alle beide; deeze is zeer moeilijk  
te geneezen, en wordt by vervolg van tyd  
doodelyk.

§. DCLXXXIV. 2.) DE *hooftpyn* is een *Cephalalgia*.  
pyn in 't hoofd, zo 'er een plaats heeft, valt  
het de zelve het gemeenzaamfte van alle meer  
in de buitenfte dan binnenfte deelen van 't  
hoofd voor, een meest in het *pericranium*, en  
ontstaat uit verfcheide oorzaaken, nament-  
lyk wanneer de vogten of zelfs eenig gebrek  
onderhevig zyn, of wanneer het bloed in  
hoedanigheid, kwantiteit, en ook beweging  
zondigt.

§. DCLXXXV. 3.) DE fcheele *hoofdpyn* *Hemicephalalgia*.  
is een pyn, die de helft van 't hoofd beftaat,  
langduurig is, en beftendiglyk meestentyds  
haare gezette en vaste ftonden behoudt.

§. DCLXXXVI. 4.) DE *Clavus* is een vas-



te knagende pyn in een zeker gedeelte in den omtrek van het hooft, die het *pericranium* verscheurt, en zeer dikwyls in een *scorbutus* en *Cachexia*, doch het meest van alle een voortbrengzel van *lues venerea* is.

*Tubercula.*

§. DCLXXXVII. 5.) DE uitpuilende *builen* in het vel van het hooft, welke fomtyds de groote van een duiven-ey hebben, uit het ftilstaan van het aldaar neergezette taaie *serum* tusfchen het *panniculus carnosus* en *adiposus* ontstaande, gaan met aanhoudende pynen, zwakheid, en döfheid in het hooft gepaard.

§. DCLXXXVIII. 6.) DE gezwollen aan het hooft die zo hart als hoorn zyn, welke of *pap* of *boning*, of *spekgezwollen* genoemd worden: deeze worden door een opening geneezen.

§. DCLXXXIX. 7.) HET kwaad zeer of drooge *schurft* is een *exulceratie* der *integumenta*, en ontstaat door het invreeten en verscheuren van de uiterfte of buitenfte vaatjes van de huid door het aldaar zynde fcherpe *serum*; dit ongemak is in kinderen en dergelyke gemeen.

§. DCXC. 8.) DE *kneuzing* der bekleedzellen, hoedanig een door een uitwendige stoot of slag geschiedt, en waarop een gezwel, pyn, en roodheid volgt, ontstaat door kwetzing der vaten, en gedeeltelyk ook door verscheuring.

*Caries ossium.*

§. DCXCI. DE *beenvreeting* of opeting der beenderen van het *Cranium*, welke geschiedt door een geweldige kwetzuur van 't zelve door

door kneuzing, of ook *fisfuur*, wanneer het bloed en de vogten in *het mergagtig deel tusfchen beide de tafels van het bekkeneel* ftilltaan, beder- *Diploë.* ven, en gelyk meestentyds gebeurt het buitenfte *vlies of tafel* afknaagen, en (het *crani-* *Lamina.* *um*) desgelyks doen bederven en verrotten. Zie de *disfertatione* van SLEEVOGT *de carie Cranii.*

§. DCXCII. DE *inflammatie* van de *musculi temporales* onstaat ook door een geweldige kneuzing of ftooting, welke ligt doodelyk wordt, zo men dezelve niet fchielyk te hulp komt.

## II. H O O F D S T U K.

### VAN DE GROOTE EN KLEINE HERSSENS EN HET VERLANGDE MERG.

§. DCXCIII. **T**EN opzichte der deelen, die in het *cranium* beslooten zyn, verdienen de groote en kleine *hersse-* *Cere-* *nen* beneffens het *verlangde merg* onze opmer- *brum.* *Cerebel-* *lum.* king.

§. DCXCIV. HET *Cerebrum* is zeer groot *Medulla* en weegt met het *Cerebellum* gezamentlyk drie *oblonga-* *ta,* ponden; het heeft een *bolagtige* gedaante, en *Globosa* wordt in twee *half ronde bollen* verdeelt, het *Hæmis-* *phæria.* regte namentlyk en flinker, door middel van de *sinus falciformis*: in elk *hæmisphærium* ontdekt men twee *lobbens*, 't voorfte namentlyk, *Lobi.* 't welk kleinder, en achterfte, 't welk grooter is; de voorfte zyn geplaatst in de voorfte groo-



*Fossæ.* grootere kuilen van het voorhoofdsbeen, de achterste in de kuilen van het achterhoofdsbeen, en *Os frontis.* deze worden van het *Cerebellum* door de achterste *processus* afgescheiden.

§. DCXCV. HET *cerebrum* wordt in een *schors.* en mergagtige zelfstandigheid verdeeld, het eerste zit in de oppervlakte, en ziet 'er wegens de *Medullaris.* groote meeninge van vaten, die 'er doorloopen, loodverwig uit, en men ontdekt in het *Lividus Anfractus.* zelve veele omwegen en kronkelingen, zo dat *Circumgyratio.* het zich als in rond gevlogtene darmpjes vertoont; in het *os petrosum* legt een dieper *anfractus*. De mergagtige zelfstandigheid onderscheidt men van de schorsagtige door derzelver wit- en zagtheid: wanneer men de *processus falciformis* wegsnydt worden de twee *Hæmisphæria* van elkander afgescheiden, en dan komt ons het weeragtige lichaam in 't gezicht, 't *Corpus callosum.* welk het begin van het hersfen-merg is. Daarna ontdekt men de zogenaamde *welfzels*, welker zelfstandigheid meer vezel-, buis-mergagtig en wit is; zo men deze in een zuure geest, *Spiritus acidus.* by voorb. van zout of *vitriool* werpt, komen de vezelen meer in 't gezicht.

§. DCXCVI. OMTRENT de holligheeden der hersfenen is aan te merken, dat deze zelve geen holligheeden zyn, die in de zelfstandigheid zelve binnen in de hersfenen plaats hebben volgens het gevoelen der Ouden, welke geloofden, dat zy de *receptacula* van de *spiritus Animales* waren, om het naderhand in de *ner-*

zi over te brengen, maar de holtens worden  
 alleen toevallig veroorzaakt, dewyl de onder-  
 ste oppervlakte van de hersenen op verschei-  
 de wyze in malkanderen gevouwen wordt;  
 want de voorste *processus medullae oblongatae*, of  
 bovenste voorste gestreepte lichaaamen, en ook *Corpora*  
 het *corpus callosum*, en doorschynende spiegelvlies *striata.*  
 maaken derzelver holligheeden uit; het bo- *Septum*  
 venste gedeelte van-deeze *ventriculi* wordt van *lucidum.*  
 SYLVIVS *fovea digitalis* genoemd: in het voor-  
 ste gedeelte der *ventriculi* is het *septum lucidum*  
 geplaatst en raakt aan de *cortex* en *fornix*, tus-  
 schen welke het legt; midden in het *septum lu-*  
*cidum* in. het voorste gedeelte vertoont zich  
 een *sleuf*, welke van SYLVIVS een opening of *Rima.*  
*hiatus* genoemd wordt, en in een versch lyk vindt  
 men *lympa* in het zelve; onder het *septum*,  
*lucidum* moet men letten op het *welfzel*, welke *Fornix.*  
 haar begin in de mergagtige zelfstandigheid  
 heeft, en loopt tuschen het *septum lucidum*  
 boven de *beddens der gezicht zenuwen*, en eindigt *Tbalami*  
 in de twee paarden beenen, de *crura hippocampi* ge- *optici.*  
 noemd, welke deeze beddens bedekken, en  
 in het *middelpunt* van het oog eindigen; zie *Centrum.*  
 VIEUSSENS, COWPER, BIDLOO, VERHEIJEN.

§. DCXCVII. DE *foramina* van de *fornix*  
 loopen na de voorste *ventriculis* in het voor-  
 ste gedeelte na de derde *ventriculus*, dat is na  
 de *vulva*. Onder de *fornix* komt de *netwyze ge-* *Plexus*  
*vlogte vlegting*, 't welke een zeer dun vlies *Choroi-*  
 is, uit zeer veele voornamentlyke *verte-* *deus.*  
*brales*



*Milia- res. Glandu- la pinea- is.* *brales* vaatjes bestaande, en dit omcingelt de *ven- triculi* even gelyk een ring, en wordt rondsom de zyden aan de *pia mater* der hersenen vastgehegt, men ziet ook in dit vlies veele kleine klieren als gierst verspreid. Maar de *pyn- appelklier* is in het voorste gedeelte digte by de *testes* sterk aan deeze *plexus* vastgehegt. Deeze klier is in een versch menschlyk lyk vaster in een geweeven, loodverwig van koleur en heeft de gedaante van een erwt, dezelve wordt met een zeer dun vlies, dat van de *pia mater* voortkomt en met zeer kleine bloedvaten voorzien is, bekleed.

*Medulla oblonga- ta. Infundi- bulum.* §. DCXCVIII. DAARENBOVEN ziet men van vooren in de *basis* van het *verlangde merg*, digt by de *samenvoeging* der gezicht-Zenuwen, de *Trechter*, 't welk een vliezig bultje is, van ondere naauwer en van booven wyder, en eindigt in de *glandula pituitaria* of *slymklier*, welke haar plaats in de *sella Turcica* heeft; en deszelfs werk is, om de weiagtige vogten, zo 'er eenige zyn, in de *ventriculi* af te scheiden.

*Medulla oblonga- ta. Eminen- tia len- tiformes. Corpora striata.* §. DCXCIX. HET *verlangde merg* is uit twee *linsgewyze verhevenbeeden* saamgesteld, welkers buitenste zelfstandigheid het *schorsagtige* van de hersenen is, 't welk de *pia mater* omkleedt, het binnenste is het *mergagtige*, en wanneer deeze *schorsagtige zelfstandigheid* weggesneeden wordt, dan komen de *gestreepte lichaamen* in 't gezigt, welke niets anders dan de *vezelagti- ge*

ge buisjes van deeze zelfstandigheid zyn; wanneer deeze *eminentiae* eindigen dan beginnen de zogenaamde *gezicht-zenuw-bedden*, welke daar-*Thalami* om dus genoemd worden, om dat de *nervi*<sup>*nervo-*</sup><sub>*rum opti-*</sub>*optici* daar hunnen oorsprong hebben: na ach-<sup>*corum.*</sup> teren toe digte by het *Cerebrum* zitten de vier *uitsteekzels* als bergjes aan het bovenste gedeel-<sup>*Protuberantiae.*</sup> te van de schors van de mergagtige substantie, welkers voorste *Nates*, en achterste *Testes* genoemd worden. De *Nates* zyn in dieren van een aanmerkelyke grootte en verschillen grootelyks: doch nadien deeze vier bergjes zeer dikwyls in een groeijen, doch van andere nooit, daarom is 'er een holte tusfchen beide, welke onder het *Cerebrum* vervolgt zynde de vierde *boezem* is, welkers opening *Anus* ge-<sup>*Ventriculus.*</sup> noemd wordt.

§. DCC. VOOR 't laatst moet men nog de *kleine hersenen* beschouwen, 't welk als *Cerebellum* 't ware een kleinder *Cerebrum* doch minder groot is: het bestaat ook uit een schors-of klieragtige, en uit een merg-of buisagtige zelfstandigheid; deszelfs oppervlakte is ongelijk en heeft zeer veele ronde kronkelingen, en fchynt uit zeer veele parallellen *circels*, die aan malkanderen raaken, te bestaan, het wordt ook met de *piamater*, welke vol met bloedvaten is, bekleed. Wanneer men het *cerebellum* in de breedte doorsnydt; dan ziet men zeer fraije verdeelingen van takken even als van een boom, welke de tusfchen beide ver-



verspreide schorsagtige substantie veroorzaakt; doch het *Cerebellum* wordt aan de zyde van de *medulla oblongata* vastgehegt, alwaar men verscheide *processus* vindt, namentlyk de *ringwyze*; *eyronde* en *pyramidale* uitsteekzels; welke van de *pia mater* voortkomen, en met meenigvuldige vaten omringt worden.

§. DCCI. De vaten, welke het bloed na het *Cerebrum* voeren, zyn de twee *krop-en-wervel-slagaderen*. De takken der *Carotides* zyn *3<sup>e</sup> vertebrales* uitstekende, en komen omtrent de legplaats van 't hart uit een *stam* van de *groote opklimmende slagader*, en wel de linker uit de kromte van deeze slagader, ten eersten zo als dezelve uit de linker boezem van het hart voortkomt: de regter tak van de *Carotides* heeft zyn oorsprong uit de regter *oksel-slagader*. Deeze takken klimmen langs de zyde van de *aspera arteria* op, alwaar men ze ook genoegzaam sterk voelt slaan, en gaan door de zogenaamde *Sinus van WILLIS*, na dat zy digte by het *os petrosum* eerst een bogt gemaakt hebben, in het *Bekkeneel*, en na de plaats alwaar de *nervi optici* leggen, welke zy in haar voortgaan raaken. Zy loopen voornaamentlyk door het onderste gedeelte van het *Cerebrum*, en gaan na deszelfs bovenste gedeelte en de *dura mater*: doch het is aanmerkenswaardig dat zy haar dikkere bekleedzelen in het *Cerebrum* zelf afleggen, waardoor zy alleenlyk met een zeer dun vlies bekleed zyn.

§. DCCII.

§. DCCII. DAARENBOVEN gaan 'er twee slagaderen na het *Cerebrum* uit de *hals slagaderen* door het groote gat van het achterhoofds been. *Arteria Cervicales.*

Deeze worden door *Anastomosis* met de *Carotides* vereenigd, en maaken het *rete mirabile* of wonderlyk net uit, 't welk de *medulla oblongata* omringt, en veroorzaakt de zogenaamde *nets-gewyze* gevlogte vlegting. Men ziet de *kussingen* tusfchen deeze duidelyk wanneer men met een spuit een gekleurd vogt in de regter *carotis* spuit, want dan komt het door de flinker, of ook door de *rami cervicales* te rug, gelyker wys ook integendeel, wanneer men het in de *cervicales* spuit, dan komt het in de *carotides* te rug; desgelyks geschiedt ook, wanneer men deeze proef door 't op blaazen neemt. *Foramen magnum offis occipitis. Plexus Choroideus. Anastomoses.*

### *Ziektekundige Beschouwing.*

§. DCCIII. DE ziekten, die haar zitplaats in het hoofd hebben, komen het meest van alle uit een kwetsuur die van buiten veroorzaakt wordt, en deeze zyn in het voorgaande hoofdstuk opgenoemt, als by voorb. *Cephalalgia, Tubercula, Hemicrania* enz.; doch de inwendige ziekten van het *Cerebrum* en deszelfs vliezen, zyn de volgende.

1.) DE *inflammatie* van de *dura mater* met koorts en zekere *ylhoofdigheid*, noemt men gewoonlyk *raazende koorts*, en is volgevaar, voor-  
ONTLEEDK. Verz. I, verv. XXVII. *Delirium. Phrenitis.* D na-tis.



*Febris acuta.* namentlyk zo zy op *beete koortzen* als een *symp-toma* volgt, en dan veroorzaakt zy ook meestentyds den dood.

*Abolitio memoria.* §. DCCIV. 2.) DE vernietiging van het gebeugen ontstaat doordat 'er al te veel vogtigheid van 't *Cerebrum*, zich van het bloed afscheidende,

*Relaxatio.* en door al te groote verwydering of verlamming der vliezen; meestentyds volgt zy op *apoplexie*, en *paralysis*, of *Affectus soporosus*.

*Affectus soporosus.* 3.) Slaaperigheid, welke uit geextravaseerd en in de schors van 't *Cerebrum* stilstaande serum voortkomt; wanneer 'er koorts by den

*Letbar-gus.* diepen slaap is, wordt het *slaapkoorts* genoemd, welke nooit zonder gevaar is.

*Coma Somnolentum, seu carus.* 4.) EEN slaapzugt of slaapziekte is een diepe slaap zonder koorts.

*Coma vigil.* 5.) HET wordt een waakende slaapzugt genoemd, wanneer de zieke onder de neiging tot slaap met waakende gelyk zynde, zich ver-

*Phantas-mata.* scheide verbeeldingen maaken, en met toegeslootene oogen veel praaten.

*Somnolentia.* 6.) DE slaaperigheid is een aanhoudende neiging tot slaap met knikking van 't hoofd.

ALLE deeze *affectus* ontstaan uit de al te groote vogtigheid van het *Cerebrum*, en stilstand van het bloed, of worden veroorzaakt dat deeze in het hoofd drukken.

*Apoplexia.* §. DCCV. 7.) HET wordt een *beroerte* genoemd, wanneer 'er een vernietiging van alle vrywillige gevoel en bewegingen plaats heeft, met behoud echter van de ademhaling, en

en klopping in 't hart; zy verschilt daarin van een *hartvang* of *zwymeling*, dat in deeze noch *Syncope*: de slagaderen noch het hart slaan, en 'er tefens geen ademhaaling plaats heeft. Dezelve nu is of *bloedig* of *weiagtig*: geene ontstaat *Sanguinea. Sen-rosa.* uit geëxtravaseerd bloed, dat in de *medulla oblongata* uitgestort is en is zeer gevaarlyk. Deeze komt voort, door dat het *serum* zich van het bloed afscheidt, 't welk het evengemelde *medulla* overstroomt, welke wel altyd niet doodlyk is, maar vernietiging van geheugen, en een aanmerkelyke *kwyning* in 't hoofd en alle dierlyke werkin. *Languor*: gen na zich sleept.

8.) DE vernietiging van gevoel en beweging in ééne zyde, terwyl in tusfchen het oordeel en geheugen gezond blyven, wordt *Lamheid* genoemd; doch wanneer de dierlyke *Paraly-* werkingen tegelyk zeer geschonden zyn, en *sis.* 'er een *spraakeloosheid*, en verlies van geheugen mede gepaart gaat, dan wordt het. *Aphonia*.

9.) Een *lamheid* aan ééne zyde genoemd; in *Hemi-* een *paralysis* is de zitplaats der ziekte in het *plexia.* begin van het *rugge merg*, maar in een *hemi-Medulla* *plexia* in het *medulla oblongata.* *Spinalis.*

10.) DE *Paraplegia*, in welke alle de deelen onder het hoofd lam worden, is ook vol gevaar, omdat niet alleen de eene zyde van het *medulla oblongata*, maar beide te gelyk aangedaan zyn.

11.) DE *Paresis* is een vernietiging van ge-  
D 2
voel



voel of beweging in eenig deel, by voorb. in de hand, arm, spieren: dit ongemak zit niet in de zenuwen, en is gemeen in *Caternen* en *Catarrhi Rbeumatismus* zinkingen.

§. DCCVI. 12.) *Pbrenitis* is een onsteeking in de *vliezen* van de hersenen, met koorts, *Meninges* *dolheid*, en *stoutmoedigheid*; het komt meesten-  
*Furor* *Audacia* tyds by andere ziekten als een *symptoma*.

§. DCCVII. 13.) DE *mania* is een ylhoofheid met groote vermetelheid en woede verzeld, maar zonder koorts: dezelve ontstaat door de geweldige doorlooping van 't bloed door het hoofd, en sterke saamentrekking der hersen-vezelen.

§. 14.) *Melancholia* is een yling met droefheid en vrees zonder eenige waarfchynelyke reden, en ontstaat uit de sterke famentrekking der vezelen van het *Cerebrum*, en door de tragere en moeilijker doorlooping van het bloed door het zelve.

§. 15.) *Hydrophobia* is een ingebeelde afschrik van alle vogten, ontstaande door den beet van een dolle hond of wolf enz.

§. 16.) *Philtromania* is een woede, die uit *Infanus* een onredelyke liefde voortspruit; in vrouwen noemt men dezelve *furor uterinus*.

§. DCCVIII. 17.) DE *vertigo* is een beder-  
 ving in de verbeelding, die omtrent het ge-  
 zicht werkzaam is, wanneer de voorwerpen  
 fchynen rond te draaijen, en de oogen daar  
 op fchemeren, of niet vrywillig beweegen  
 kun.

kunnen; dezelve ontstaat uit de drukking van de *nervus opticus* door het bloed dat de *Carotides* al te sterk uitzet.

§. DCCIX. 18.) HET wordt een *Catalepsis* genoemd, wanneer de zieken als een stok op dezelfde plaats en in dezelve gestalte blijven, in welke zy waren, toen zy met dit ongemak overvallen wierden, terwyl zy in tuschen in 't geheel hunne leden niet kunnen bewegen.

§. DCCX. 19.) DE *Vallende ziekte* is een *Epilepsia* meer geweldige *spasmus* van de *dura mater* met drukking van het *Cerebrum*, en een schielijke onwillige instorting van de *spiritus* in de alle de spieren van het lichaam, omdat alle de zenuwagtige vliezen in de *dura mater* haaren oorsprong hebben.

§. DCCXI. 20.) DE *Stuiptrekkingen* ontstaan *Motus convulsi* door de tegenwillige beweeging der spieren *fluidum* wegens de geweldige instorting van het zenuw- *nerveum* agtig vogt in de vliezen, zenuwen, en spieren, zonder dat de ziel 'er eens gedagten of zin toe heeft: zy komt meestentyds voort uit de sterkere *saamentrekking* van de vliezen die *Strictura* de *medulla spinalis* bekleeden, 't welk een *spasmus* in de *dura mater* is, dat is, zy wordt door eene *stuiptrekking* in *medulla spinalis* veroorzaakt. *Convulsio*.

§. DCCXII. 21.) DE *onmatige slaapeloosheid* *Vigilia* ontstaat uit de snellere beweging van het bloed *immodica* door de hersen-vaten en de daar uit voortvloe-



vloeijende werking of beweging der zenuwen.

*Inquietudo.* §. DCCXIII. 22.) HET woelen met groote benaauwdheid gepaard geschiedt uit de *steking* of aanprikkeling der zenuwagtige deelen, of uit *windæn*, of een af knaagende stof, en ontsteeking; meestentyds is de maag de zitplaats van dit ongemak.

*Tremor.* §. DCCXIV. 23.) DE beving der deelen, *Horror.* waartoe ook de *yfing*, en *styvigheid* behoort, *Rigor.* ontstaan uit een tegennatuurlyke beweging en beroering in de zenuwen en vliezen, die de spieren bekleeden.

### III. H O O F D S T U K.

#### *Van de Zenuw-paaren.*

§. DCCXV. **B**uiten twyfel strekt het gebruik en de werking van het *Cerebrum*, om het fynste vogt van het bloed, dat de *vasa arteriosa* aangebragt hebben, af te scheiden, het welk volgens ons gevoelen niets anders is, dan het allerfynste *aërische ætherische en elastich lymphæ*, 't welke door de klieragtige schors der hersenen gefiltreerd zynde, door de allerkleinste en dunne kanaaltjes van de mergagtige zelfstandigheid ten laastten in de zenuwen gestort wordt, welke door het geheele lichaam verspreid zynde, de over-

overbrengers van deeze *spiritieuse substantie* zyn.

ALLER zenuwen, die na het geheele lichaam loopen, hebben hunnen oorsprong of uit het *medulla oblongata*, of *spinalis*: 'er worden van die geenen, die uit het verlangde merg voortkomen, tien Paaren getelt; zommige rekenen 'er twaalf.

HET eerste Paar noemt men *olfactorium*, die tot de reuk dienen; 2.) *opticum*, de gezicht-zenuwen; 3.) *oculorum motorium*, dat de oogen beweegt; 4.) *patheticum*, of lydende; 5.) *gustatorium*, de *sinaak* zenuwen; 6.) *intercostale*, of tusschen ribbige; 7.) *auditorium*, dat tot het gehoor dient, 8.) *vagum*; 9.) *linguae motorium*, of dat tot de beweging der tong dient; 10.) *Cervicale*, of van de hals. De twee overige paaren behooren tot de spieren van den hals, welke nochtans eer uit de *medulla spinalis*, als *oblongata* voortkomen: thans zullen wy van elk paar in 't byzonder iets zeggen.

HET EERSTE, 't welk tot de reuk behoort, is in den mensch zeer zagt en dun, en gaat uit de hersens na de bolle zelfstandigheid van de neus: zommige meenen dat dit hol is, 't geen men echter niet altyd ziet, schoon men het in zommige voorwerpen dus gevonden heeft; hierom twyfelen ook zeer veele, of het tot de reuk of gevoel dient, 't welk zy liever gewoon zyn toe te schryven aan den



*Conjugatio.* tak van het vyfde paar, die tot binnen in de neus gaaten doordringt.

*Opticum.* HET TWEEDE paar worden de *gezicht-zenuwen* genoemd, en dit zyn de grootste en dikste doch kortste van alle; deeze komen uit de *thalami nervorum opticornum* en vereenigen zich door over en weer te kruizen omtrent het *infundibulum*, en veroorzaaken de gewaar-wording der voorwerpen in de oogen; wy hebben aangemerkt dat rondsom deeze zenuwen zeer kleine vaten loopen.

HET DERDE paar wordt het *oculorum motorium* genoemd; het komt voort uit de *basis* van het *medulla oblongata* dichte by het *infundibulum*, en gaat door de *orbita* naar de spieren van de oogen, wien zy de beweging toebrengen; waarom wy ook in een *gutta serena*, 't welk een ongemak in de gezicht-zenuwen is, gewaar worden dat de beweging der oogen wel en ongekwetst behouden blyft.

*Par paratheticum.* HET VIERDE wordt het *lydende paar* genoemd, en is zeer fyn; het komt voort omtrent het derde *uitsteekzel*, en gaat in de oogbolte na de *katrol-spier* van 't oog, welke het oog naar boven, door het na en by de *boeken* zelfs te trekken, beweegt; in gemoeds bewegingen volvoert dit paar zenuwen haare werking.

*Protuberantia.*  
*Orbita.*  
*Trochlearismus-culus.*  
*Anguli.*

HET VYFDE paar zenuwen of de *conjugatio* van het vyfde paar heeft een uitstekend gebruik

bruik en is niet alleen tot de smaak, maar ook voor alle de buitenste deelen van 't hoofd van nut, om derzelve gevoel en beweging te vermeerderen; want 1.) geeft het takken na de spieren, 2.) na het bovenste en benedenste *kaakbeen*, alwaar de tanden ge-<sup>Mandi-</sup>infereerd worden; 3.) na het *verhemelte* en <sup>bula.</sup> *de keel*; 4.) na de spieren van de neus, en <sup>Palatum.</sup> *de slymklier* der neus; 5.) na de oogleeden, en <sup>Fauces.</sup> *6.) na de oogen*. Van dit paar gaat ook <sup>Glandu-</sup> *een groote tak* na de borst, en loopt <sup>lapitui-</sup> *saamen om de nervus intercostalis* te maaken, <sup>varia.</sup> *het zelve komt uit de zyde van het ringwyze* <sup>Proces-</sup> *uitsteekzel voort*: de verdeelingen van de tak-<sup>sus annu-</sup> *ken van dit paar zyn aanmerkelyk*, en der-<sup>laris.</sup> *zelve kennis is zeer noodzakelyk voor een Geneesheer*. VIEUSSENS in *Neurologia* p. 234 beschryft deeze nauwkeuriglyk.

DE zenuw van het ZESDE paar heeft zyn oorsprong uit de *processus annularis*, en gaat omtrent de *sella equina* of paardzadel uit het bekken: eenige takken vereenigen zich met de zenuwtakken van het vyfde paar, en maaken het begin van den *nervus intercostalis* uit.

DE zogenaamde *gehoorzenuwen*, uitmaaken-<sup>Audito-</sup> *de het ZEVENDE paar*, komen uit het midden <sup>rii.</sup> *gedeelte van het Centrum ovale* naast aan de wortels van het *par vagum* en verspreiden twee takken van zich, een zacht gedeelte, <sup>Mollior.</sup> *'t welk door het os petrosum verspreidt*, na de *Labyrinthus*, *Concha* en *Cochlea* loopt,



en eindigt daar in het vlies, waar door het gehoor geschiedt: het zagter gedeelte van deeze zenuw vereenigt zich met het *par vagum*, om welke reden 'er zo eene groote overéénstemming is tusfchen het oor en de *viscera*, tot welke het *par vagum* behoort, dat na de verfcheidenheid der toonen 'er niet alleen in de kleine of groote herffenen, maar ook in de *præcordia* en het geheele lichaam verfcheidene bewegingen

*Durior.*  
*Os petro-*  
*sum.*

*Membra-*  
*na tympa-*  
*ni.*

*Ductus*  
*Eustac-*  
*hi.*

*Musculi*  
*massa-*  
*teris.*

*Par Va-*  
*gum.*

ontstaan. Het *hardere* gedeelte van deeze zenuw gaat uit het *steenbeen* in het *trommel-vlies*, en loopt verder na de *buizen van Eustachius*, en eindigt ook in de binnenfte spieren der ooren; deeze tak loopt ook na de *kauw-spieren*, en byleggende klieren van het oor, en ook na de vierde spier van het onderfte kaakbeen.

HET AGTSTE is groot en wordthet *zwer-*  
*vend paar* genoemd, omdat het zich door het geheele lichaam verspreidt, en ook zyn werking en nut in het hoofd heeft; deszelfs wortels bestaan uit kleine vezelen en leggen boven de *corpora olivaria*, welke dwars doorgesneeden zynde, sterft een dier, gelyk *VIEUSSENS* aanmerkt, binnen den tyd van twintig uren: zy maaken het *tusfchen ribbige paar* uit.

*Par in-*  
*ter costa-*  
*le.*

Deeze zenuwen gaan uit het bekkeneel door het *foramen magnum*, door welke ook de zylingfche boezemen na de *venæ jugulares* gaan. De naauwkeurige verdeeling dezer zenuwen, en ook derzelver ftruëtuur is zeer noodzakelyk voor een Geneesheer, om de oorzaaken der te-

gen-

gennatuurlyke beweegingen te kennen, en om 'er uit te kunnen begrypen, op welke manier de overeenstemming van het eene deel met het andere geschiedt, en daaruit verscheidene *pathemata* ontstaan. Vooreerst communiceerd deeze zenuw met de spieren van den hals, en zendt deszelfs takken na de *musculus scalenus*, *mastoideus*, en *sternoides*, waaruit men de oorzaak kan opmaaken, waarom in ongewoone vrees of schrik de hals omgedraait wordt, welke ook in zommige dieren uit *verontwaarding* op zwelt, en waarom de *Indignatio* hals in ziekten der borst en 't abdomen, alwaar het agtste paar is, medelydzaam wordt; desgelyks waarom ook het aangezicht in toornige gemoedsbeweegingen bleek of rood wordt, voor zo ver de vaten van den hals, welke op verscheidenerley wyzen door de zenuw vast gebonden worden, of slap of zaamengetrokken worden, en dus grooter of minder kwantiteit bloed na het aanzigt brengen.

DEEZE zenuw daarna de borst ingegaan zynde maakt de *te rug keerende zenuw*: maar *Nervus* de rechter *nervus recurrens* wordt weder te rug *recurrens* geboogen omtrent de rechter *arteria axillaris*, waarom zy na booven gaande takjes aan de *oesophagus*, *aspera arteria*, en de spieren van de *larynx* geeft, om welke reden 'er een groote *sympathie* tusfchen de *oesophagus*, *aspera arteria*, en *larynx* is. De werking van de *nervus recurrens* is, om de ringen van de *lugtader* eveneens *Trachea* als *cbca*.



als de bladeren van een blaasbalk van een te brengen, en te verwyden, om de lucht in te ademen, en het geluid te veroorzaaken.

DOCH de *ramus recurrens* omringt ook de neerklimmende stam van de *aërta* en de rechter *axillaris*, door welke toetrekking de beweging van het bloed dezer vaten naar het hoofd meer na beneden gevoert wordt, 'twelke anderzints door haare eigene beweging elders naartoe zoude gaan.

DAARENBOVEN geeft het *par vagum* een tak, welke wederom kleine takjes geeft aan de bekleedzelen der *Aërta*, de rechter longs lobbe, het hart, en het rechter gedeelte van 't harte zakje, en het *pericardium* doorboort hebbende, ook takjes geeft na de stam van de na beneden gaande *Vena cava*. Wyders maakt de rechter tak van het *par vagum* den *nervus intercostalis* ontfangende, de rechter vlegting der longen, waaruit onnoemlyke kleine vezeltjes na de bekleedzelen van de *oesophagus*, en de daaraan leggende *glandulae*, en ook na de rechter lob der longen, en de *bronchia* gaan.

*Plexus  
dexter  
pulmoni-  
cus.*

VERVOLGENS na dat de rechter zenuw van het *par vagum* het *diaphragma* doorboort heeft, verdeelt hy zich in vier takken, waarvan de drie bovenste tot het voorste en achterste gedeelte van den *stomachus* behooren, en na de *pylorus* voortgaan, op welke plaats zy, zich tegelyk met de rechter *intercostales* vereenigende en samenloopende, de lever-vlechting maaken.

*Plexus  
hepati-  
cus.*

DE vierde tak eindigt gedeeltelyk in de

py-

*pylorus*; gedeeltelyk in de *pancreas* en *ductus biliaris*, want door deeze *plexus* stemt het hoofd met het geheele lichaam overeen.

DE linker tak van het *par vagum*, de borst ingegaan zynde, klimt boven op de neer-Truncus klimmende *stam* van de groote slagader, en verdeelt zich in vyf takken, waarvan de driebo-aërtæ  
venste na boven omgeboogen zynde de lin-Sinister  
ker wederom keerende zenuw maaken, welke even nervus  
als de rechter tot de *trachea*, *larynx*, *oesophagus*, recur-  
en *glandula tracheæ* behoort: de vierde tak ein-rens.  
digt in de bovenste zenuwagtige vlegting van 't Superior  
hart. De vyfde eindigt in de *vena pulmonalis* op nervus  
de wys van een ring, en teffens in het linker plexus  
oor van 't hart. cardiacus.

VERVOLGENS geeft de linker zenuw van het *par vagum* onder de *recurrens* de *nervi intercostales*, welke in de longen tot een komende de bovenste en onderste *plexus pulmonici* uitmaaken. Derhalven dwaalen die geenen ten hoogste, welke stellen dat de longen geen gevoel hebben, want 'er loopen zeer veel zenuwen na derzelver vliezen, om welke reden 'er in de ontsteking der longen ook pyn plaats heeft; daarenboven brengen zy ook in de longen de *tonus*, welke tot de gemaklykere ademhaling en doorlooping van het bloed noodzakelyk is, waaruit de zenuwagtige luchtblaasjes der longen niet alleen bloedvaten, maar ook zenuw-vezeltjes ontfangen.

WAN-



Wanneer de linker het *diaphragma* doorboord heeft, zendt zy ook eenige takjes na de linker *ventriculus cordis*, welke met de saamenloopende zenuwen van de andere zyde zo een groote *sympathie* tusfchen dezelve en de *stomachus* veroorzaaken, dat wanneer deszelfs linker *orificium* al te fterk getergt wordt, 'er zeer gemakkelyk *animi diliquium* opvolgt. Want de *Ventriculus* ontleent ook van deeze zenuwen haare fterkte en *tonus*, welke door zamenftrekking in de *motus peristalticus* gefchiedt. Ten laaftten gebeurt het ook door behulp van deeze zenuwen, dat wanneer het zenuwagtig bekleedzel van den *Ventriculus* geprikkelt wordt, 'er ook in de ziel een trek naa-fpyzen ontftaat.

THANS blyven over nog eenige te dingen melden van de tusfchen ribbige zenuw, welkers kennis en verdeeling ten hoogften nuttig en noodzakelyk voor 'een Geneesheer in de praktyk zyn, om redenen van de *phænomena* te geeven, en de plaats waar de kwaal zit te kunnen onderzoeken. Deeze zenuw neemt zyn oorsprong in het *Cerebrum* van het vyfde en zesde paar: deeze naast de zyde van de *sella equina* in een loopende eindigen in de *stam* van de *nervus intercostalis*, welke tusfchen de bekleedzelen der *caritides* voortkruipende uit het bekkeneel gaat, en wordt om die reden *tusfchenribbige* genoemd, omdat zy tegen de *radices* of wortels der ribben legt; dee-

*Truncus.*

*Intercostal-  
alis.*

deeze zenuw vermengt zich meestentyds buiten het *Cerebrum* met het *par vagum*, om welke reden 'er zoo een groote overeenstemming is van het *Cerebrum* met die deelen, tot welke het *par vagum* behoort, en men kan ook teffens hier uit de reden opmaaken, waarom de oogen en alle deelen van 't aangezicht, na welke het vyfde en zesde paar loopt, verscheide veranderingen ondergaan na maten 'er tegennatuurlyke beweegingen in de *præcordia* geschieden, en desgelyks waarom de deelen van het hoofd door een tegenatuurlyke beweging ontroerd zynde de bewegingen in de *præcordia* teffens in overeenstemming trekken, gelyk in het niezen blykt, wanneer het *diaphragma* door de geprikkelde vliezen der neusgaten zeer sterk na beneden gedrukt en wederom sterk te rug getrokken wordt, waardoor 'er een geweldiger uitademing geschiedt, gelyk ook integendeel zo wanneer het *diaphragma* met *spasmus* aangedaan wordt, dan wordt 'er door deeze zenuwen veroorzaakt, dat 'er een *Cachin-*  
*schaterende lach* ontstaat. *nus.*

DE *nervi intercostales* uit het bekkeneel gaan zynde loopen omtrent den hals tot een, en maken *zenuw-vlegts-knoopen*, en wel ter *Plexus* getale van vier, waarvan de twee boven-*gangli-*ste met de twee *Cervicales* van het agtste paar *formes.* zaamen groeijen, waaruit men klaar en duidelyk de reden kan vinden, waarom het *strotten-hoofst* niet zelden de *spasmodise pathemata* in  
hys-



*hystericæ* en *hypocondriaci* mede aangedaan wordt, en daar ter plaatse als een ronde en harde bol of gezwel veroorzaakt wordt, *Fauces.* waardoor de keel als toegeslooten wordt.

HET is ook aanmerkelyk, dat de zenuwen van het tusfchenribbige paar van elke wervelbeen van den hals en rug een tak krygen van de *nervi spinales*, waardoor het geschiedt, dat deeze zenuwen van langzamer hand altyd grooter, fterker en dikker worden.

*Spina.* HIERUIT kan men ook de reden vinden, waarom 'er, wanneer de invloeiing der *spiritus animales* door de geobftrueerde *medulla spinalis* belet is, gelyk in *paralysis* geschiedt, of wanneer de *rug-streng* gebrooken is, echter de beweging van het hart noch plaats heeft, beneffens het gevoel en beweging in de onderste deelen, alzo namentlyk, omdat de *influxus spirituum*, door het *par cœtævum* nog geschiedt en het *par vagum* niet verftopt is, de *influxus liquidi nervei* behouden blyft.

Dus zien wy ook in *Apoplexie*, wanneer het *Cerebrum* lydt, en 'er geene invloeiing van de zogenaamde *Spiritus animales* in de zenuwen geschiedt, terwyl nochtans de beweging en slag van het *pectus* en *cor* behouden blyft, omdat door de *Medulla spinalis*, welke ongefhonden is, het *fluidum nerveum* nog afgefcheiden wordt, dat het door middel van de *nervi intercostales* deeze deelen ook aandoet.

DE *nervi intercostales* zenden ook rontom de

*aspera arteria* eenige kleine takjes na de spieren, die den hals buigen, weshalven ook de hals, wanneer de deelen van de *borst* en *buik*, <sup>*Pectus.*</sup>  
tot welke dit paar loopt, aangedaan of ge- <sup>*Abdo-*</sup>  
kwetst zyn, tegelyk aangedaan en medelyd- <sup>*men.*</sup>  
zaam worden.

DAARENBOVEN loopt 'er ook boven de bovenste *plexus Cervicalis* een tak na de *arteria axillaris*, welke zy rondsom bindt, waaruit men de reden kan afneemen, waarom de *armen*, <sup>*Brachia.*</sup> als deeze zenuwen met *spasmus* aangedaan zyn, koud worden: ook gaat de *nervus intercostalis* na de vleezige substantie van het *diaphragma*, en ook na deszelfs zenuwagtig middenpunt, waarom een veroorzaakte *kitteling* in de *Titilla* <sup>*zyden*</sup>, in den mensch een geläch verwekt; 'er <sup>*tio.*</sup> loop- <sup>*Hypo-*</sup> ook vezelen uit deeze *nervus* na de <sup>*chondria.*</sup> galblaas, *pylorus*, na de vaten van de *ductus Choledochus*, *duodenum*, en hieruit krygen deeze deelen haaren *tonus* en sterkte.

WYDERS is de *arteria hepatica* rondsom omsingelt en vast gebonden door zenuwagtige vezeltjes van dit paar, omdat deeze het bloed schielyker in de *hepar* zoude storten, en dat het bloed, omdat dit geheele *viscus* uit zenuwagtige vaten bestaat, die geen pols slag hebben, daar niet zoude stilstaan, maar gemakkelyker en schielyker voortloopen.

VERVOLGENS communiceeren ook de vezelen van de zenuwagtige lever-vlegting



omtrent de *pylorus* met de vezelen van het rechter agtste paar, weshalven de gal, wanneer de maag gekneepen, of saamen getrokken wordt, gemakkelyker uit de *cystis fellea* in het *duodenum* loopt, ja zelfs gaat een sterker *spasmus* van de maag ook tot de *ductus biliarii* en *cystis fellea* over, waarom 'er een groote kwantiteit gal uitgebraakt wordt.

DEEZE tusfschenribbige zenuw, voornamentlyk de regter, loopt ook na de regter nier en deszelfs vliezen, vaten, en zelfstandigheid, waarom 'er een groote *consensus* plaats heeft tusfschen de regter nier en de deelen van het *abdomen*.

*Lumbo-* DEEZE Tak loopt ook uit de *Wervel-*  
*rum ver-* *beenderen der lendenen*, en 't *heilig - been*  
*tebræ.* veel vezelen ontfangen hebbende, na het  
*Os sa-* *mesenterium*; doch wordt in twee takken ver-  
*crum.* deelt, in een buitenste en binnenste; de buitenste eindigt in de rechter achterste tak van het *crus*, waarom 'er een groote overeenstemming tusfschen het been, en voornamentlyk het regter, en de darmen plaats heeft.

WAT de linker tusfschenribbige tak aanbelangt, dezelve verspreidt zich byna op de zelfde manier als de regter, behalven dat zy een aanmerkelyke *plexus Cardiacus* maakt, welke door het hart en deszelfs ooren verspreid wordt, en zich rondom de groote vaten van het hart vlegt, opdat door de sterkere of dappere samentrekking der vaten, nadat de ge-  
 moeds

moeds of lichaams beweegingen zyn, ook de loop des bloeds geregeld worde: van wegen die *consensus nervorum* wordt de ziel ook overeenstemming aangedaan.

't Is aanmerkelyk dat de linker tak even als de rechter haare takken inplant in de *nervi dorsales*, waarom in alle *spasmus* der *nervi intercostales* de ademhaling te gelyk gewoonlyk beëindigd wordt, omdat derzelver werking voor het grootste gedeelte door de *dorsales* volvoert wordt.

TEN laatsten loopt deeze linker tak naar de *stomachus* en *liën*, welkers vaten hy vast bindt, en ook na de linker nier, welkers vaten hy ook in één vlegt; en gaat vervolgens naar het *mesenterium*; weshalven 'er een groote overeenkomst tuschen deeze deelen is: daarom behoeft men zich niet te verwonderen, waarom 'er na opgeblaazendheeden van de *lien nier - of colyk - pynen* volgen. Door deeze *Dolores* loop der zenuwen geschiedt het ook, dat de *nephritici, vel colici*, *dolores hypochondriaci* dikwils uit de linker zyde na de rechter, en uit deeze in de linker overgaan, omdat vooreerst 'er *ontroering* veroorzaakt zynde de *præcordia* door de *lien* na beneden getrokken en *geconstringeerd* worden, zodat de *melancholici* door zeer groote engte van borst met moeiljke ademhaling, en hooploosheid *geobruëerd* worden, en van verbeelding zyn, dat hun de dood voor de deur of de oogen staat te wagten.



Motus  
peristal-  
ticus.
Recepta-  
culum  
Chyli.
 WANNEER de nier-zenuwen , welke de *arteriæ emulgentes* omringen , door *spasmus* aangetast werden , dan ontstaat 'er dikwils een meenigvuldige en zelfs pynlyke waterloozing : de bovenste *plexus mesentericus* geeft zeer veele zenuw-vezeltjes aan de *intestina* , welke de nederwaards drukkende beweging volvoeren. Deeze takken loopen boven de *Vasa Meseraïca* heen , en vlegten die vast in een , om de loop van het bloed te bevorderen en te matigen ; zy loopen ook na de klieren van het *mesenterium* , en de *chyl-ontfanger* , opdat namentlyk de beweging der chyl door deeze wegen bevorderd zoude werden.

Umbili-  
cus.
 DE middelste *plexus mesenterii* geeft vezelen aan het *mesenterium* , de *intestina* , en de bekleedzelen van de *äorta descendens* , en *vena cava adscendens*. Doch van onderen loopt hy na het bekleedzel van het *intestinum rectum* , naar de *uterus* , *testes* , en het *femur* , om welke reden byna alle de ingewanden van het *abdomen* in *hystericæ* en het hoofd medelydzaam worden ; namentlyk wanneer 'er een scherpe stekende stof in de *uterus* en *testes* saamgepakt wordt , waarom het ook geschiedt , wanneer alle de *meseraïci* rondsom de *navel* samengetrokken worden , dat zy eveneens als ronde ballen gelyken , en onkundige geneesheeren of de Vrouwtjes van gedagten zyn , dat de *uterus* opklimt.

VERDER loopt de linker tak na de achterste *cruralis*, waarom 'er ook een groote overeenstemming tusfchen het linker been met de in-en uitwendige deelen, en ook het hoofd plaats heeft.

EINDELYK loopen 'er eenige takjes na de *uretheres* en *intestinum rectum*, *Vesiculæ seminales prostatae*, en de naby geleegene deelen. Hieruit kan men de reden opmaaken, waarom de pijn door een steen in de pis-blaas veroorzaakt, het geheele lichaam doet lyden, en trillende of beevende ftuip - trekkende bewegingen kan veroorzaaken: hieruit blykt ook de reden, waarom de *sphincter ani* te gelyk aangedaan wordt, als de *sphincter vesicae* aangedaan is, en ook wanneer het tegen-deel plaats heeft.

TEN laatsten moeten wy noch iets zeggen van het NEGENDE en TIENDE paar zenuwen.

HET NEGENDE paar komt uit de *corpora pyramidalia* en *olivaria* van de *medulla oblongata* voort, en wordt in de wortel van de tong en haare inwendige zelfstandigheid geïnserieerd; waarom niet alleen dit, maar ook de zenuwen van het vyfde paar de smaak en beweging der tong volvoeren.

HET TIENDE paar komt voort uit het onderste gedeelte van de *corpora pyramidalia* en *olivaria*, en loopt tusfchen het *os occipitis* en het tiende wervelbeen van den hals na de spieren, die het hoofd achterwaarts bui-



gen, en ook na de spieren der ooren, en eindigt in de *processus maxillares*.

## IV. HOOFDSTUK.

### Van de Oogen.

Oculi.

DE oogen kunnen in uit- en inwendige deelen verdeelt werden; 'er zyn zeven uitwendige; namentlyk

*Tunica  
adnata.  
Tendines.  
Tendino-  
sa.  
Pericra-  
nium,  
Orbita.*

I.) HET aangewasfche oogvlies, 't welk van de (\*) peezen der oogspieren voortkomt, en daarom het peesagtige genoemd wordt. Zommige stellen, dat dit van het *panvlies* zyn oorsprong heeft (\*\*). Het is vastgehecht aan het been en oogbol, is van een zeer gevoelige aard, ontfangt zenuw-vezeltjes van het vierde paar, en heeft veele bloedvaatjes, zoo wel flagaderlyke als aderlyke, welke men in den gezonden staat naauwlyks

(\*) Dit vlies komt geenzints voort van de peezen der spieren; wel is waar dat zy zich in dit vlies hechten, doch door kunst kan men deeze spieren; gelyk door latere Ontleedkundige ontdekt is, van dit vlies affcheiden.

(\*\*) Dit is ook by latere anders bevonden, en aangetoont, dat het maar alleen een vervolg is van het vel, dat de oogleden bekleed, 't geen dunder en fynder geworden is, en daarom kan men het liever *adnata* of *aangewasfche vlies* noemen, omdat het aan het oog vast en aan gegroeit is, dan peesagtig.

lyks kan zien, doch in de oogontsteeking of *Ophthalmia*.  
 kneuzing zyn zy genoeg met bloed opgezet, *Contusio*.  
 zodát het rood wordt, doch in geelzucht ziet *Icterus*.  
 het geel.

2.) HET *bovenste en onderste ooglid*, 't welk uit *Palpebra*  
 kraakbeen en een dun vliezig vlies bestaat met *superior*  
 zyne spieren; het *kraakbeen* legt in de rand *& inferior*.  
 op de wys van een kring, op dat het niet on-*Cartilago*.  
 gelykelyk zoude opgeligt worden; deszelfs *go*.  
 gebruik is om de kring der oogleeden uitge-  
 spannen te houden.

3.) DE *klieren* der oogleeden, binnen in *Glandula*  
 leggende, leggen voornamentlyk naar het *la*.  
 binnenste gedeelte van dit ooglid, al-  
 waar zy een *water* afscheiden: de vaten dee-*Lympha*.  
 zer klieren zyn door MEIBOM gevonden,  
 en beschreeven in *Traçtatu de vasis palpebrarum*.

4.) DE *bairen*, welke men gewoon is met *pili*.  
 de naam van *wynbraauwen* te benoemen, *Supercil-*  
 zyn, ter bescherming der oogen gemaakt, *ia*.  
 opdat 'er geen stof of vuil van buiten in de-  
 zelve zoude vallen.

5.) DE *Traangooten* zyn twee openingen, *Puncta*  
 die naast de *inwendige hoek* van 't oog leggen, *lachry-*  
 en daar men een paardshair in kan steeken, *malia*.  
 en in een vliezige zak eindigen; uit dit zakje *Angulus*.  
 loopt een kanaal na de binnenste deelen der  
 neus, waar door het vogt uit de oogen in de  
 neus ontlast wordt. En dit kanaal met het  
 zakje is het voorwerp van de *Traanfistel* in de *Fistula*  
 inwendige hoek, of *Traanklier*, waaruit twee *lachry-*  
*malis*.  
*Caruncu-*



water-buizen aan de oppervlakte van de *palpebra* zich openen.

*Pingueda.* 6.) ZEER veel *vet*, 't welk tusfchen de spieren legt, en de inwendige holte der *orbita* beflaat, opdat de oogen eene vrye beweging kunnen hebben.

*Oculi orbita.* 7.) DE *Oogholte*, welke uit zes beenen bestaat. 'ER zyn acht inwendige deelen.

*Glandula lachrymalis.* 1.) DE groote of ongenaamde *Traanklier*: dezelve legt binnen in de oogholligheid, in het bovenfte gedeelte van het oog in den buitenften hoek: 'er gaan zeer veele *oogleedsbuizen* na de onderfte oppervlakte van het ooglid.

*Ductus palpebrales.* 2.) 'ER zyn behalven het *witte oogvlies* vyf vliezen in getal.

*Tunica albuginea.* 1.) HET *hoornvlies*, omdat het als hoorn doorfchynend is, wordt van agteren *sclerotica* genaamd, maar dan is het niet meer hoornagtig, maar zeer pees-en zenuwagtig, en als een *fteunzel* voor de vaten en spieren; dit heeft zyn oorfprong van de *dura mater* (\*), gelyk veele Ontleedkenners denken: dit vlies bekleedt en omvat de geheele *oogbol* met deszelfs *vochten*, want het is een zeer vast en fterk vlies, door het welk zoo wel bloed- als water-vaten loopen, en aan het zelve zitten de peezen der spieren vast.

*Fulcrum.*

*Bulbus oculi.*

*Humores.*

2.) HET

(\*) Doch nauwkeurig dit vlies nagaande, blykt het, een vlies op zig zelve te zyn, alzo men de *dura mater*, die van achteren de bol omvat, kan affcheiden van de *sclerotica*.

2.) HET *druivenvlies* wordt van achte-*Uvea*.  
ren *Choroides* genoemd: men stelt dat  
het zyn oorsprong van de *pia ma-*  
*ter* (\*) heeft; want het is zeer  
teer,

(\*) Het komt niet van de *pia mater*, maar van  
de *sclerotica* zelfs voort, aan deszelfs binnenkant,  
by EUSRACHIUS *Tab: Anat. XL fig. 4.* ziet  
men duidelyk rontom het gat, daar de gezicht-  
zenuw doorloopt, eenige puntjes en stipjes, die den  
oorsprong van de *choroides* van de binnenste zyde van de  
*sclerotica* aftekenen.

Het zal den Lezer niet onaangenaam zyn naar onze  
gedachten het gevoelen van andere Schryvers hier om-  
trent te weten, waartoe wy niet beter kunnen doen,  
dat een vertaling over dit stuk aan onzen Leezer mede  
te deelen, uit de doorwrochte Disfertatie van den Heer  
BONN, wien wy alle heil en voorspoed in zyn praktyk  
toewenschen. Deeze Hr. zegt in zyne *Disferta-*  
*tie de continuatione membranarum* pag. 37. de *nervus op-*  
*ticus* nagaande, dat het ieder een bewust is, dat deeze  
een *vagina* van de *dura mater* ontfangt; stellende zommi-  
ge dat deeze *vagina*, wanneer zy met de *nervus opticus*  
aan den oogbol gekomen is, in deszelfs hoornagtig  
vlies overgaat; andere wederom dat zy daar eindigt, of  
boven dezelve gecontinueerd wordt. Dus deeze gevoe-  
lens over dit stuk aangehaalt hebbende, zegt onze Schry-  
ver, dat de Heeren ALBINUS en ZIN doorkunst dee-  
ze *vagina* in twee *lamina* verdeeld hebben, waarvan de  
buitenste rondsom de *sclerotica* uitgespannen, en de  
binnenste tusfchen de *sclerotica* en *nervus* loopt, byge-  
volg plaatst zy zich tegen de *lamina Cribrosa* van de *scler-*  
*otica*, door welkers gaatjes de laatste zenuwtjes in het  
oog gaan: deeze *lamina* is met kleine gaatjes doorboord,



*Pupilla.* teer, en van binnen zwart. In het zelve vindt men den oogappel, welke niets anders dan een

en hierom ook de binnenste *lamina* van de *dura mater*; doch anderzins is deeze nergens doorboord, maar continueerd zich. Waarom onze Schryver voorstelt, of het niet waarschynelyk is dat ze ook door deeze gaatjes gecontinueerd wordt? De *pia mater* wordt met de *nervus* binnen de *vagina* van de *dura mater* voortgebragt, zommige (zegt onze Schryver) stellen dat deeze in het andere vlies van 't oog, namentlyk de *Choroidea*, overgaat: de Heer ZINN de *oculo* cap. 197 & Tab. 1 p. 1 is van gevoelen, dat de *pia mater* in de binnenste *lamina* van de *sclerotica* overgaat. Het spinnewebs-vlies zegt de Heer BONN ziet men hier niet onderscheiden; de gladde oppervlakte van beide de hersen-vliezen, namentlyk van de *dura* en *pia mater* schynen zig hier te vermengen en saamen te loopen, doch wanneer men deeze *vagina* van de *dura mater*, (uit het *cranium* zelfs afbeginnende) opent, dan blykt het, dat deeze oppervlaktens malkanderen raken, en als op elkander geplakt zyn, en dat de *pia mater* geheel wollig (*tomentosa*) wordt, en los rondsom de *nervus* zit, waarom dezelve binnen zyn *vagina* beweegbaar is: in §. XLIX zegt onze Schryver vervolgens dat men de *dura mater* van de *pia* kan afscheiden, en dat dezelve haar glad- of effenheid in het water blyft behouden. Waaruit de Hr. BONN verder zyne beschouwing latende gaan, voorstelt of men uit de gladheid der oppervlakte geen gevolg zoude kunnen trekken, dat dezelve gecontinueerd wierdt, en of het niet waarschynelyker is dat de *choroidea* van die binnenste *lamina* van de *dura mater*, welke door de gaatjes van de *lamina cribrosa* aan de *sclerotica* gecontinueerd wordt, zyn oorsprong heeft, want (zegt hy) de *sclerotica*, welke geheel uit een vaster saamgepakt cellulous vlies kan gezegt worden saamengesteld te zyn, en hierom in verscheidene *lamellen* verdeelt worden, gaat van buiten en van bin-

een gat is, door 't welk de gezigt-*straalen* van *Radii*  
 het voorwerp na het *crystallyne* vogt en *net-*<sup>*visivi.*</sup>  
*Humor*  
*vlies*<sup>*crystalli-*</sup>  
*mus.*

binnen in een dusdanig losser weefzel over, door welke het vet van buiten met de spieren en de *adnata* vereenigd wordt (Zinn. p. 6), van binnen met het zeer dunne *celluleuse* weefzel van de *choroides* (Zinn. p. 41) aan de *lamina cribrosa*, en integendeel ziet men dat beide de oppervlaktens effen zyn; de buitenste of achterste is een vervolg van de *vagina* zelfs van de *nervus opticus*, welke tusfchen de *sclerotica* en de *nervus* voortgebracht is: de binnenste gladde oppervlakte van de *choroides* wordt gecontinueerd boven de binnenste *facies* met de *lamina cribrosa*, en de Heer BONN verzekert, dat hy dikwils door herhaalde proeven ondervonden heeft, dat wanneer hy de *nervus opticus* zelfs drukte, dat dan de mergagtige zelfftandigheid door de kleine *foramina* uitgedrukt wierdt: het zelfde verschil van oppervlaktens zegt de Heer BONN toont ook aan, dat de *choroidea* niet van de *pia mater* voortgebracht wordt, want de buitenste gladde oppervlakte van de *pia mater* is de *arachnoidea*, welke *celluleus* is, en zyn uitzigt na de *nervus* heeft; het tegendeel geschiedt in de *Choroidea*, welke van binnen glad en vry is, en van buiten *celluleus* met de *sclerotica* vereenigt, 't welk aan alle vliezen volgens het zeggen van den Heer BONN eigen is: 'er blyft dan zegt onze Schryver een queftie over, wat'er van de *pia mater* wordt? ik geloof, zegt hy, dat deeze met de zenuwtjes door de *foramina cribrosa* boort: en dat het zelve rondfom de *arteria centralis*, welke door het middelste gaatje van deszelfs *lamina* loopt, alwaar deeze *arteria* na het glasagtig vocht zelfs (Zinn. p. 126.) en na de *lens crystallina* (ZINN. p. 142 Tab. 7 fig. 2. 3. ALBIN: *Ann: acad. lib. I. 17. tab. 1. fig. 4, 5.*) voortgaat, uitgebreid wordt in het buitenste vlies van het *humor vitreus*, 't welke van natuur een *Celluleus* vlies zynde, zig in het voorfte gedeelte van het *humor vitreus* in twee *lamina* verdeelt, en dus de

kas



*Retina.* vlies gaan: het bestaat uit twee blaaden met bo-  
*Lamina.* venste en buitenste vezelen, welke den re-  
 gen-

kas van 't cryftallyn vogt en de kanaal van PETIT (ZINN p. 124) fchynt te maaken; en met zenuwagtige vezeltjes in de *retina* uitgespannen, welkers mergagtige zelfftandigheid aan de buitenste, en de vaten aan de binnenste zyde leggen: onze Schryver zegt vervolgens, (§ L) de *choroidea* zelfs, welke onder die benaaming in de rondte van de *lamina cribrosa* van de *sclerotica* begint (het zy dat zy een vervolg van de *dura mater* en de binnenste *lamina* van de *vagina* van den *nervus opticus* of het zy zy een *membrana propria* is) spant of zet zig binnen in de *sclerotica* in een rond blaasje uit, en wordt in drie deelen verdeeld; het eerste of achterste wordt de *choroides*, het middenste de *orbiculus Ciliaris*, en het derde en voorste gedeelte wordt de *iris* of *regenboog* genaamd; over het samenstelzel deezer deelen is ZINN wel waardig naagelezen te worden, 't geen tot doelwit van den Heer BONN strekt, gaat hy vervolgens voort aan te haalen. De *Choroidea*, zegt hy, na vooren gaande wordt de *orbiculus ciliaris*, in welkers binnenste oppervlakte onnoemelyke en aanmerkelyke langagtige *eminentie* zyn, en waardoor deeze oppervlakte door onnoemelyke vouwtjes 'er gerimpelt uitziet; deeze worden *processus Ciliares*, *ligamenta Ciliaria* genoemd, welke, nadat zy rondsom de *corona Ciliaris* groefjes in het *humor vitreus* gemaakt hebben, dit vogt in zyn plaats houden. Van de *processus Ciliares* voor het cryftallyne vogt gecontinueerd, en in vlijes verdubbelt zynde, 't welk vry en los in het *humor aqueus* zig beweegt, maakt zy de *iris*, welke in 't midden een gat heeft, dat *pupilla* genoemd wordt: deeze regenboog (vervolgt onze Schryver) bestaat waarlyk uit twee *laminæ*, tusfchen welk door middel van een *celluleus* weefzel vereenigde *laminæ*, de *nervi ciliares* en vaten loopen (ZINN. p. 112 Tab. 4 fig. 2 : de binnenste *lamina* een vervolg van de *Choroides* omtrent het cen-

trum

genboog genoemd worden , en onderste of *Iris*.  
 binnenste , dewelke den oogbair-gelyken band *Liga-*  
 genoemd worden. *mentum*  
*Ciliare.*

*Aanmerking.*

Het is opmerkelyk , dat de *iris* beweegbaar is , wyl zy verwyd en saamgetrokken wordt: door samentrekking wordt het gat nauwer , door verwyding wyder ; dit geschiedt, wanneer het oog na de zon-straaLEN of vier gewend wordt, welke beweegbaarheid of

*trum pupillæ* na de oogappel geëxtenuëerd zynde , en op eenige *distantie* voortlopende , wordt voor- en buitenwaards omgeboogen in de voorste *lamina* van de regenboog , waarom het gat van de oogappel een dubbelde rand heeft. Deeze voorste *lamina* is van buiten effen , en heeft in verscheide menschen verscheide kóleuren , en men is van oordeel , dat zy dezelve rondsom het begin van de *cornea* eindigt , dog de Heer BONN zegt , dat , zo zyne proefnemingen hier iets kunnen gelden , de *iris* hier niet eindigt , maar boven de binnenste oppervlakte van de *cornea* vervolgt wordt , van het welke hy een aanmerkelyk gedeelte afgescheiden heeft , waarom hy van oordeel is , dat het op dezelve wyze met de binnenste zyde van de *cornea* als met de buitenste toegaat , alwaar de *membrana adnata* de natuur van de *cornea* aanneemt. Waaruit ook de glad- en effenheid zo wel van de buitenste als binnenste oppervlakte ontstaat , en dit hoofstuk afgehandeld hebbende (zegt de Heer BONN) om de vervolging van alle de vliezen door het gantsche lichaam te bewyzen , dat volgens het geen gezegt is , klaar blykt , dat ook hier ter plaats geen doorgeboorde vliezen te vinden zyn.



*Gutta serena.*

of famentrekking in den *beldre drop* ophoudt, als wanneer de famentrekkende en verwyderende beweging der *Pupilla* weggenomen en te niet gedaan wordt.

*Tunica Retina.*

*tensiva.*

*Nervus opticus.*

*Humor vitreus.*

*Tunica crystallina.*

*Tunica vitrea.*

3.) HET *Net-vlies* is zeer gespannen en wit, en is niets anders dan een uitbreiding van de gezicht-zenuw; het omringt het geheele glasachtige vocht.

4.) HET *Crystallyn - vlies* omvat het Crystallyne vocht, opdat het niet weg vloeye.

5.) HET *glasachtige vlies* besluit in zig het glasachtige vocht; beide deeze laatste vliezen zyn zeer duñ, en als spinne-webs rag.

3.) DE *vochten* der oogen, welke drie zyn.

*Aqueus.*

1.) HET *waterachtige*, 't welke tusfchen het hoornachtig en druiven-vlies vloeit.

*Crystallinus.*

*Solidior.*

*Pelliculae.*

2.) HET *Crystallyne*, 't welk *vaster* is, van een holle gedaante, zeer doorschynend, en wordt faamgesteld uit zeer veele *schilletjes*, die aan malkanderen vastgehecht zyn en op elkander leggen, 't welke men ontdekt, wanneer het vogt uitgedroogd wordt.

*Vitreus.*

3.) HET *glasachtige*, 't welk ook zeer doorschynend is, doch vloebaarder als het Crystallyne; welke het echter in kwantiteit overtreft: in deszelfs midden legt het crystallyne vocht; wanneer iemand deeze vochten behoorlyk in derzelver legging wil waarneemen en

en nagaan, moet hy eerst het geheele oog laten bevroren, en dan het zelve ontleeden.

4.) 'ER worden zes spieren geteld, die de oogen beweegen; de eerste is de *oplichter*, *Attol-*  
de tweede de *neerdrucker*, de derde de *aan-* *lens.*  
*brenger*, de vierde de *afvoerder*, de twee *Depri-*  
overige worden de *schuinsche* genoemd, waar- *mens.*  
van de bovenste zeer dun en lang is, en *Addu-*  
*katrol-spier* genoemd wordt, en loopt door *cens.*  
het kraakbeen, dat in de inwendige ooghoek *Oblique.*  
legt door behulp van een vliezige band, 't *Trochle-*  
welk om deszelfs gedaante een katrol ge- *aris.*  
naamd wordt; want zy beweegt het oog *Abdu-*  
in de rondte: de onderste schuinsche staat *cens.*  
tegen overde bovenste, en heeft zyn oor- *Ligu-*  
sprong in het onderste gedeelte van de oog- *mentum.*  
holte, niet wyd van de buitenste *boek* en trekt *Cantbus.*  
het oog na de buitenste zyde.

5.) 'ER zyn zeer veel zenuwen, die na het oog loopen: het eerst zyn de *gezicht-zenuwen*, welke zeer dik, doch het korste zyn, zy gaan in het oog zelfs, en in het *net-vlies*: het tweede *Par Op-*  
wordt de *oogbeweger* genoemd, 't welk door *ticum.*  
de groote *sleuf* van de *orbita* na de meeste *Retina.*  
spieren loopt; het derde is het *patheti-* *Oculo-*  
*cum*, 't welke na de katrol-spier loopt, *rum mo-*  
en zeer gevoelig en fyn is; ten laatsten *torium.*  
gaan 'er eenige takken uit het vyfde en *Rima.*  
zesde paar na de *musculus adducens* en *abducens*.

6.) DE



6.) DE *arterien* loopen door de *fissura* uit de *carotides internæ* na de spieren en vliezen van het oog, en de *venæ* voeren het bloed weder terug na de *sinus*; 'er zyn ook zekere *vasa* en *ductus*, door welke een helder en uitgelezen *water* na de *humores* loopt om de *Lympha* zelve te voeden, en te rug voerende vaten, welke het al te waterig gedeelte te rug voeren, zoo dat 'er een byzondere omloop van het *lympba* plaats heeft, welke het *humor* van 't oog herstelt. Deeze vaten zyn beschreeven in de *Acta Erudit Lips.* waaruit men gemakkelyk de reden kan uitleggen van de proef van *Burrhus*, waarom het uitgenoomen *humor aquæus*, met verlies van gezicht, binnen korten tyd hersteld is, met wederkryging van het gezicht.

HET Oog verbeeldt een donkere kamer, omdat het alle die vereischtens bezit. 1.) De *Tunica Choroïdes* en *uvea*, welke beide van binnen zwart zyn, maaken in het oog de donkere kamer. 2.) De *Pupilla* is het gat, waardoor de gezicht-stralen der voorwerpen na het Netvlies gaan, 't welk de plaats van het papier uitmaakt, opdat daar de af beeldingen der zaaken zouden vertoond en afgebeeld worden. 3.) Het *humor Vitreus* vervult de plaats van een bolle glaasje, waardoor de *straal-breking* en *omkeering* derzelver geschiedt. Doch gelykerwys in een dondere kamer, die maar met een glas voor-

*Camera  
obscura.*

*Lens vi-  
treæ con-  
vexa.  
Refrac-  
tio & in-  
versio.*

voorzien is, de voorwerpen altyd omgekeerd vertoond worden, doch *recht* op, als 'er *Erectæ*. twee bolle *lentes* voorgezet worden; dus voert niet alleen het *crystallyne* maar 't wateragtig vocht het gebruik van een *lens*, waardoor het geschiedt, dat de voorwerpen recht op in het gezichts zintuig vallen.

### *Ziektekundige Verbandeling.*

1.) DE verharding of verstyving van het bo- *Obdu-*  
venste ooglid, welke ontstaat uit een stuiptrek- *rescentia*  
kende saamentrekking van de *musculus pyrami-* *palpebræ*  
*dalis* na het begin of oorsprong van deszelfs *superio-*  
vezelen. *ris*.

2.) DE intrekking, of omkeering van 't *Ectro-*  
ooglit na buiten, met saamegroeiing van het *pion, in-*  
*slappe vleesch*; het ontstaat door de saamentrek- *versio.*  
king der spier-vezelen van de *sphincter palpe-* *Caro*  
*brarum.* *laxa.*

3.) DE verlamming van het ooglit, wan- *Paraly-*  
neer namentlyk het ooglit geslooten wordt, *sis.*  
en niet wederom opgeligt kan worden, we-  
gens de al te groote *slapheid*, en omdat het *Atonia.*  
*fluidum nerveum* in de het ooglit oplichtende  
spieren niet kan vloeijen.

4.) DE *inflammatie* van het ooglit met *Tumor*  
een wateragtig gezwel wegens het stilstaan van *aquosus.*  
de wey, of 't bloed in de kleinste vaatjes.

5.) 'ER zit ook somtyds een gezwellet- *Tuber-*  
je in de *tarsus* van het ooglit, 't welk om *culum.*



*Hordeolum.* de gelykenis van gedaante een *garstenkoorn* of *strontje* genaamd wordt; het zelve is een stil-

*Succus nutritius.* stand van *het voedsel* in een vliezig blaasje, 't  
*Suppuratio.* geen van langsaamer hand tot *verettering* overgaat: wanneer het *strontje* harder en onbeweegbaarder, wit en blinkend wordt, dan noemt

*Grando.* men het een *bagelkorreltje*.

*Ægilops.* 6.) DE *traan-* of oog-*fistel* is een *pyp-*  
*Ulcusculum fistulosum.* zweertje, 't geen in den binnen hoek van 't oog verborgen legt, en een *caries* van het neusbeen bedreigt, ja dikwils zulks te weeg brengt; het ontstaat, wanneer de traanbuizen van de

*Lymphalachrymalis.* neus verstopt worden, waarom het *traanvocht* in het vliezig zakje stilstaande en scherp geworden zynde, niet alleen een gezwel, maar

*Caries ossium.* ook bederving ja zelfs *beenvreting* veroorzaakt, waaruit, zoo men deeze buizen geen ontlasting geeft, en de bederving der beenderen wegneemt, 'er een altoosduurende *et-*

*Saniei* *terdruiping* uit voortkomt.

*Stillicidium.* 7.) DE *afknaaging* of *afbyting* der wyn-  
*Erosio.* braauwen met roodheid verzelt, wanneer de oogleden, ter oorzaake van het scherper stilstaande vogt in de klieren afgeknaagt worden, is geen ongewoon *symptoma* in kinderen

*Variolæ.* na de pokjes en mazelen: het zelve valt ook  
*Morbilli.* in *scorbutici* voor.

*Conglutinatio.* 8.) DE *saamenkleving* der oogleden ontstaat uit een taaije en slymige stof, welke de al te zeer *verslapte* klieren uitloozen, voornamentlyk in kinderen.

*Relaxatio.*

9.) 'ER ontstaat zeer dikwils een groote zwelling der oogleden uit een zwaardere *con-*  
*tusie*, nadat 'er een uitwendige oorzaak voor-  
afgegaan is, wegens het stilstaan van het  
*serum*.

10.) DE *ontsteeking der oogen*, of van de *Ophtbal-*  
*tunica adnata*, ontstaat uit het stilstaan van het *ma.*  
bloed, en deszelfs belette omloop in de bloed-  
voerende vaten, zowel uit een in- als uit-  
wendige oorzaak voortvloeiende. Men kent  
ze aan een gezwel, pyn, en roodheid in de  
*adnata*.

11.) HET wordt een *blaauwheid der ad-* *Sugilla,*  
*nata* genoemd, wanneer men een' breede *tio.*  
bloedige vlak met etter op de *adnata* ziet,  
wegens het uitgestorte bloed, dat tusfchen  
de verdubbeling van dit vlies zit, zo wel  
door een in- als uitwendige oorzaak.

12.) HET *Etteroog*, *puistje* of *zweertje* van *Hypo-*  
de *adnata* komt uit het aldaar stilstaande en *pion.*  
afknaagend water. *Pustula.*  
*Ulcuscu-*

13.) DE *Epiphora*, of geduurige traanvloe- *lum.*  
jing uit de oogen, den eenen tyd meer of  
min, verzelt met jeuking, roodheid, pyn,  
en moeiljelyke opening der oogen tegen het  
licht; het is een langduurend ongemak, en  
soms tyds ook *epidemisq*, zeer gemeenzaam in  
*Scorbutici* en *Rheumatici*: het toont aan dat de  
*tonus* der traan-klieren te niet is, en daar ter  
plaatse een wateragtig *serum* zit.

14.) DE vogtige opgezetheid van de *tunica Inflatio*  
*aa. humida.*



*adnata* en tegelyk van de *cornea* wordt een *Oedema*. koudgezwel in het oog genoemd: 't zelve ontstaat uit een al te rykele aanvoering van het *serum*, en deszelfs stilstand tusfchen de lamellen van de *Cornea* en *adnata*.

*Pannus oculi.* 15.) DE ooglap is een *tunica albuginea*, of witagtig vlies, welke aan de *adnata* vast groeit, en fomtyds het *hoorn-vlies* bekleedt, en dus het zien belet: het wordt ook een uitwendige *Cataracta*. *staar* genoemd; het ontstaat door dat de vliezen der oogen al te rykelyk met het *succus nutritius* besproeid worden, en het vogt daar ftil blyft ftaan; dit ongemak volgt zeer dikwils in kinderen op de *kinderziekte*.

*Variolatum morbus.* 16.) HET wolkje der oogen is een dun vlies, dat op de *cornea* groeit en haare helderheid beneemt, en bygevolg het zien belet; 't komt voort van het ftilftaande, en *Nubecula.* melk- of wit-wordend *waterig vocht* der oogen: het valt zeer dikwils in kinderlyke jaaren voornamentlyk door *kinderpokjes* voor.

*Laëtes cens succus Lymphaticus.* 17.) 'ER gefchiedt een *uitzakking* van het *druiven vlies*, wanneer het *hoorn-vlies* door een in- of uitwendige oorzaak, namentlyk *exulceratie*, breekt; men kent het zelve aan een *gezwel*, 't welk omtrent de grootte van een *druiven-kern* heeft.

*Acinus uvæ.* 18.) MEN noemt een *valsche staar*, wanneer men muggen of vliegen voor 't oog ziet vliegen, en als door een *spinnewebsweefzel* ziet, en deeze *Cataracta spuria* gaat dik-

dikwils een aanstaande waare staar voor; *Cataracta vera*.  
 dezelve ontstaat uit troebel water, wanneer  
 'er zeer veele slymige aardagtige heterogeni-  
 sche deeltjes, door de al te opene vaten der  
 oogen in het wateragtig vocht uit het *sanguis*  
 en *lympha* overgebracht worden, en deszelfs  
 helderheid beletten.

19.) HET is een *Cataracta vera*, wanneer *Diaphanitas*.  
 'er in de oppervlakte van het *humor Aqueus* uit  
 deszelfs slymige en aardachtige deelen een ze-  
 ker vlies saamgeweeven wordt, dikwils onder  
 de *pupilla*, en somtyds ook boven het zelve  
 uitgespannen, 't welk na deszelfs verschei-  
 dene kleur en grootte verscheide naamen *Tenuitas*  
 heeft (\*).

20.) DE al te groote verwyding of ver-*Dilatatio*.  
 nauwing van de *pupilla* zyn beide een foort *Constrictio*.  
 van verlamming, en valt ook in *paralytici* voor: *Paraly-*  
 doch met al te groote *dilatatie* gaat meesten-*sis*.  
 tyds blindheid gepaart, of de heldere drop, *Gutta se-*  
 want de al te groote saamentrekking van de *rena*.  
*pupilla* is eer een foort van *spasmus*.

21.) DE graauwoogigheid, of zwakheid of *Glau-*  
 vermindering van gezicht, komt uit een gebrek *coma*.  
 in het *crystallyne vogt*, wanneer het zelve al  
 te

(\*) Thans stemt men byna algemeen overeen, dat  
 een waare *Cataract* niets anders dan eene verduistering  
 en verloorene doorschynenheid van het cristallyne vocht  
 of van deszelfs vliezig kasje is. Zie BOERHAVE, over  
 de Ziektens der oogen, in dit Kweekschool vertaald.



te troebel wordt; 't is moeilijyk of in 't geheel niet te genezen, men ontdekt dezelve als de kleur in de *pupilla* eenigzins hooger

*Glaucus.* graauw of groenagtig is.

*Visus depravatio.* 22.) HET is een bederving in 't gezicht, wanneer men de voorwerpen dubbel ziet, of wanneer dezelve niet in een rechte maar schuinsche lyn in 't oog komen; deeze gebreken ontstaan uit een groote veranderde legging van het Crystallyne vocht; somtyds geschiedt zulks ook in *deliria*, desgelyks in *spasmi* of *convulsiones*, en ook in *Hysterica* of *Hypochondriaci*.

*Myopia.* 23.) Stik- of byzienendheid is een ongemak, wanneer men dicht-by staande voorwerpen duidelyk, maar verder af zynde in 't geheel niet of naauwelyks zien kan; het heeft zyn oorsprong uit een al te grooten afstand van het netvlies van het brandpunt des crystallyne vochts, of ook uit de al te groote bolheid van het crystallyn vocht; en is meestentyds een aangeboore erfelyke kwaal.

*Gutta serena.* 24.). DE heldere drop is eene blindheid daar niets tegennatuurlyks in 't oog ontdekt wordt, behalven een al te groote verwyding van den oogappel, en de lyder kan echter niets zien; 't ontstaat door dat de gezicht-zenuw verstopt of saamgedrukt, of al te sterk geresolveerd is; deeze kwaal is zeer moeilijyk

lyk te geneezen, voornaamenlyk zo het lang geduurd heeft.

25.) HET *Scheelzien* ontstaat door dat de *Strabis-*  
spieren van de oogen door *spasmus* verdraaid<sup>mus.</sup>  
zyn, waarom het zeer dikwils met de *vallende*  
*ziekte* gepaart gaat; doch zoo dit een aange-*Epilep-*  
boore, of door gewoonte aangewende kwaal<sup>sia.</sup>  
is, dan zyn aan eene kant de spieren, die het  
oog beweegen, al te kort.

26.) DE *stuiptrekking* der oogen, wan-*Convul-*  
neer de oogen tegen wil en dank in 't rond<sup>sio.</sup>  
draaijen, of na boven en beneden getrokken  
worden, ontstaat daaruit, dat de spieren van  
't oog en de *beweegzenuwen* saamgetrokken en *Nervi*  
*convulsif* zyn; dit ongemak gaat gepaart met *metorii.*  
hevige stuiptrekkende beweegingen.

27.) TER oorzaake van het stilstaan van  
al te veel vochtigheid tusfchen de vliezen  
en haare drukking tegen de vezelen, ontstaat  
'er een *bezwaarende drukkende pyn* in het oog; *Dolor*  
waarom gewoonlyk in deeze kwaal het oog *gravati-*  
opzwelt. <sup>*vus pres-*</sup>  
<sup>*sorius.*</sup>

28.) EENE *verzweering* van het oog *Exulce-*  
komt uit een zwaardere en diepere ontftee-<sup>*ratio.*</sup>  
king, welke zo zy niet verdreeven wordt,  
tot verzweering overgaat, en door zich  
zelfs verder te verspreiden, niet alleen zig  
tot de vliezen der oogen bepaalt, maar ook  
tot in de vochten overgaat, en ten eenemaal  
het gezicht beneemt.

29.) HET *kreeft-gezwel* van 't oog is ee-*Carci-*  
ne <sup>*noma.*</sup>



ne rottige opeeting en verteering van het geheele oog; het begint meestentyds in het hoornvlies, alwaar de pijn als vast zit, wegens het daar stilstaande *corrosive* vocht, welke zig daarna met vermeerderde kragten wyder verspreidt, en door zyne *corrosive* rotting niet alleen het oog zelfs, maar ook de oogholte en bovenste kaakbeen aanvat en afknaagt.

## V. H O O F D S T U K.

### *Van de Ooren en het Gehoor.*

*Auris externa,* **M**EN is gewoon het oor in tweeën te ver-  
*interna.* deelen, in 't uitwendige en inwendige:  
*Membrana Tympani.* het inwendige heeft zyn einde in het Trommelvlies, het welk het uitwendige van het inwendige oor afscheidt: het heeft een halfron-  
*Lobus.* dachtige en bolle gedaante, en wordt uit kraakbeen en dun vel saamgesteld: men onderscheidt het in een bovenste en onderste gedeelte, 't welk het oortje of de *lel* van het oor genaamd wordt, en van een zeer zachte substantie is: het buitenste rondachtige gedeelte is men gewoon de *oorrand* te noemen;  
*Helix.* het inwendig de *rand* die tegen over de eerste  
*Anti-belix.* oörrand staat, de tusfschenplaats tusfschen deezen omtrek noemt men het schuitje of *scapha*. Deeze oörranden of *belices* met haare hol-

holligheeden dienen om de lucht op te famen-  
len, en te rug te kaatsen. De binnenste hol-  
ligheid van het *uitwendige oor* noemt men de  
*concha* of schulp, welke de opgevangen lucht  
tusfchen de oorranden wederom ontfangt :  
het voorfte haairige en *uitpuilende* gedeelte van *Eminens*,  
de *concha* wordt *Tragus* of de *Bok* genaamd, en  
dat 'er tegen over staat *Antitragus*.

DE oorweg is een vervolg van de *Con-Meatus*  
*cha*, alwaar het *oorsmeer* opgezamelt wordt: *audito-*  
het is van een beenachtige Natuur, en wordt *rius.*  
van binnen met kraakbeen en vel bedekt;  
tusfchen dit kraakbeen en vel zyn veele geel-  
achtige klieren als geerts geplaatst, welke het  
oorsmeer afscheiden; uit elke klier loopt een  
*ontlast-buis* door het *cutis* of vel naar den oorweg, *Ductus*  
en brengt daar het vetachtige geele vocht, 't *excreta-*  
welk het zelve bevochtigt en befmeert, opdat *rius.*  
het vlies van den *meatus Auditorius* niet uitdroo-  
gen zoude. Het krygt slagaderlyke vaten van  
den buitenften tak van de *arteria Carotis*, welke  
in het diepe gedeelte van 't oor legt, alwaar  
de *concha* is, en ontfangt ook zenuwen eens-  
deels van het vyfde, anderdeels van het twee-  
de paar van den hals.

HET *Trommel-vlies*, 't welke het *uitwendi-Tympan-*  
ge oor van het *inwendige* afscheidt, is een zeer *num.*  
dun, nochtans doorschynend, over de been-  
agtige kring gespannen vlies; gelykerwys  
alle de vliezen dubbeld zyn, zo is 't ook des-  
gelyks met dit vlies gelegen; de figuur van



het *tympanum* is aan de buitenzyde hol, doch aan de binnenzyde bol: RUYSCH heeft 'er bloetvaten en klieren in ontdekt.

*Cochlea.* HET inwendige Oor wordt in het *slakkenhuis*  
*Labyrinthus.* en *Doolhof* verdeeld: 't eerste is de holligheid tusfchen het *Trommel-vlies* en het *Doolhof*. In de holligheid van 't oor ontdekt men vier beentjes, namentlyk het *hamertje*, *aambeeld*, *stygbeugeltje*, en het *rondachtige beentje* (\*), en men moet aanmerken dat 'er drie spieren zyn, de *flap-maakende* of *laxator*, de spier die het *hamertje* beweegt of *malleator*, en die het *stygbeugeltje* opligt of *stapedis allevator*; vervolgens moet men twee *wegen* of *meatus* in opmerking neemen, de eerste loopt in de holligheid van het *mamachtig-wyze uitsteekzel* na het *tympanum*, het andere uit de holligheeden van 't *Tympanum* na de *neus*, welkers eene gedeelte beenachtig en het andere kraakbeenig is: het wordt gewoonlyk de *buis van EUSTACHIUS* of *ductus Eustachianus* genoemd. Ten laatsten ziet men nog twee *openingen* of *vensters*, namentlyk het *ovaalachtige* en *ronde*; in 't zelve, namentlyk *ovaalachtige*, rust en is de spier van het *stygbeugeltje* ingehecht. Het *doolhof* of *Labyrinthus* bestaat uit drie deelen, uit het *portaal*, de *ronde kanaalen*, en het *slakkenhuis*; het *portaal* is

*Processus mastoideus.* *vestibulum.* *Canalis circularis.* *Cochlea.* (\*) Dit wordt het *os orbiculare* van SYLVIVS genoemd, doch is eigentlyk geen onderscheide beentje, maar een *epipbyfis* van het *aambeeld*.

is het middelste gedeelte tusfchen de *halfronde kanaalen*; daar zyn 'er drie. De bovenfte en onderfte worden by uitneemendheid het *doolhof* genoemd: zy zyn hol, en van binnen met een zachter vlies bekleed; in het *flakkenbuis* ontdekt men drie *draijen* of kringen, den *bo-dem* noemt men het *gedraaide plaatje*; zy zyn omkleed met de *zachtere nervus* van het zeven-de paar: want men moet opmerken, dat de *gehoorzenuw* na het vlies loopt, 't welke het *geheele doolhof*, namentlyk deszelfs *portaal* en *halfronde kanaalen*, bekleedt, alwaar men de klank verneemt.

DIT geheele werktuig en konftig famenftel van 't oor, 't welk uit *omwegen* en *draaijen* bestaat, te gelyk met het *ductus* van 't *meatus auditorius*, dient om de lucht te ontfangen, te rug te kaatsen, en te vermeerderen, welke terugkaatsing der lucht zeer noodzaakelyk is om het geluid te veroorzaaken.

### *Ziektekundige Verbandeling.*

'ER ontftaat eene *ten eenenmaale vernietiging* van gehoor, of door het fcheuren van het *Trommelvlies*, of door deszelfs bederving, tegelyk met die der fpiereu en beenderen van 't gehoor door verzwearing, of uit een gebrek in de *gehoorzenuw*, wanneer dezelve of al te fterk uitdroogt, of ten eenenmaal verftopt



stopt en bedorven wordt, waarvan wy voorbeelden hebben dat dezelve ontstaan is uit een al te groote verzameling van hier na toegevoerd *serum*, voornamentlyk in de *morbis Hungaricus* of andere *passiones acutæ*; desgelyks door een *mercuriacle salivatie*, voornamentlyk in *Cachectici*, waarom men na de dood in deszelfs ontleedigde lichaamen een gedeelte van de *medulla oblongata*, uit 't welk de gehoorzenuwen haaren oorsprong hebben, door het stilstaande *serum* bedorven gevonden heeft.

*Gravitas auditus.*

2.) DE *hardhoorendheid* heeft ock veele oorzaken, en ontstaat vooreerst uit een ge-

*Defectus.* brek in het inwendige oor, of verstopping van de *mus auditorius*, wanneer het oor meer een kalk- of steenachtige natuur verkrygt, of als dezelve *meatus* door een weelig ge-

*Tumor fungosus.*

zwel of opgezwolle klieren der ooren verstoppt wordt; of het ontstaat ook uit een ongemak van het *tympanum*, wanneer dit vlies al te zeer verflapt wordt, of door dat zig daar eenige vochtigheid vergaderd, of door het onvoorzigtig opleggen van uitwendige medicamenten, of een al te vochtige dampkring, waarom wy gewaar worden dat gewoonlyk by *betrokke lucht* het gehoor moeilijker geschiedt, daar het zelve by helder weêr sterker en gemakkelijker gebeurt.

*Coelum nubilum.*

DE inwendige vergadering in de ooren van het *serum*, dat het vlies van het gehoortuig bevochtigt, ontstaat, of wanneer de klie-

klieren, welke het oorsmeer uitstorten, al te zeer verflapt zynde, een aanmerkelyke kwantiteit vochts van het bloed afscheiden, of het ontstaat door dat de *tunica* van de *processus mastoideus* al te zeer verflapt is, welke aanmerkelyk veel vogt afscheidende, het zelve in de holligheid van 't *tympanum* storten.

VERVOLGENS ontstaat ook de hardhoorendheid wanneer het trommelvlies te styf gespannen is, want dan zyn de zachte klanken onverdraaglyk. Dit geschiedt, wanneer het vlies zelfs door *spasmus* van de oorspier al te sterk gespannen wordt. Met dergelyk *symptoma* worden somtyds zelfs *Hypochondriaci* en *Hystericae* aangedaan, wanneer zy met *Cephalalgia* of *phrenitis* geplaagd worden. *Auditus difficultas.*

OF de hardhoorendheid ontstaat ook door de al te sterke uitdrooging van het *tympanum* of deszelfs hard- of dikheid, by voorbeeld in oude lieden, of wanneer op een onvoorzichtige manier *medicamenta spirituosaf* of geestryke geneesmiddelen druppelsgewys in de ooren gegooten worden.

TEN laatsten ontstaat de hardhoorendheid uit een al te groote verflapping van de hoorzenuw, of verlamde *resolutie*, waarom die geene, welke aan een *paralysis* na een *insultus apoplecticus* onderhevig zyn, en desgelyks de vrouwen, na de opgestopte stonden, hardhoorend zyn. *Paralytica.*

IN de *febres continuæ* of aanhoudende koortsen,



fen, en voornamentlyk in de *morbus Hungaricus* zyn de lyders gewoonlyk hardhoorend wegens het daar geplaatste *serum*, wanneer de natuur door een gewoone en gebrekkige beweging de *schadelyke materia excrementitia* na de uitwendige deelen verplaatst, waardoor zy doof worden.

3.) ZOMTYDS wordt het gehoor door de *suis-Tinnitus*. *sing* der ooren zelve verbasterd; dit ontstaat of door de al te enge spanning van het trommelvlies; zo de in de holligheid van 't *tympanum* vergaderde vochtigheeden in *gerommel* of *Flatus*. winden ontbonden worden, welke door het saamentrekken van het gespannen vlies een geruisch veroorzaaken. Het is een gemeenzaam gebrek in die, in welke gewoonlyke ophooping van bloed en vochten na boven geschieden, of welke aan eene gebrekkige *digestie* onderhevig zyn.

4.) DE oorpyn is een *inflammatie* van den *Otalgia*. gehoorweg, verzelt van een zeer hevige pyn, welke somtyds *Apoplexie* en *Convulsie* bedreigt: deeze ontstaat van het verzamelde en stilstaande bloed in de *tunica nervea*, welke deeze *meatus* bekleedt, somtyds ontstaat daaruit *absces*.

5.) DE inwendige *verzweering* van het oor en den gehoorweg volgt op de *inflammatie*, meestentyds wanneer dezelve niet verdreeven wordt, welke verzweering zo zy zwaarder en dieper is, zelfs het *tympanum* en de

de gehoorbeenderen aantast, en somwylen *carieerd* zy zelfs het *os petrosum*, welk ongemak byna ongeneeslyk is, en men kent het aan de stinkende *pus*, 't welk uit de holte van 't oor loopt.

6.) DE langduurende en meenigvuldige uitvloeijing van wey en rotagtige *ichor* uit de ooren, 't welk zeer dikwils in de kinderlyke jaaren voorvalt, ontstaat uit de al te groote slapheid der oorsmeer-klieren; doch wanneer de *Glandulae Parotides* te gelyk verzworen zyn, dan dringt zelfs de *purulente materie* door de *pori* of *ductus* of kleinste *meatus* tot in den gehoorweg door. Dusdanige *fluxus* der ooren beschryft BALLONIUS *Lib. II. de morbis epidemicis pag. 270.* Desgelyks HILDANUS in *Cent. III. obs. 3.* SCHENCK *obs. 351. Lib. I.* HAGENDORN *Cent. I. Hist. 65.*

TEN laatsten verdient ook aangemerkt te worden 7.) de uitstorting van het bloed uit de ooren na een zwaare kneuzing, slag of val; dit bloed wordt niet, gelyk sommige verkeerdelyk denken, hier na toegevoert uit het *Cerebrum*, maar uit gebrookene beenderen en naast aangeleegene vaten, en loopt in het hol of *hiatus* van het *tympanum*, 't welk zyn uitzicht naar den gehoorweg heeft; door deezen zelve weg of *meatus* gaat de wind met een geruisch en ook den rook van tabak met volle kaaken uit.



## VI. HOOFDSTUK.

*Van de Tong.*

Lingua.  
Fauces.  
Larynx-  
Os hyoi-  
des.  
Basis.  
Apex.

Corpora  
papilla-  
ria.  
Cribosa.  
Retifor-  
mis.

Papilla-  
ris ner-  
vosa.

DE tong zit aan de keel en 't strottenhoofd en tongbeen vast, en wordt door behulp van de spieren en vliezigen band aan dezelve gehecht: zy wordt verdeelt in de wortel en punt: het eerste gedeelte is breeder, en het laatste loopt spitser toe: deszelfs zelfstandigheid wordt met een drievoudig spierachtig vlies bekleed. Het 1.) buitenste, dat *poreus* is, in 't welke de *tepelachtige lichaamen* leggen, welke de eigentlyke werktuigen van de smaak zyn. 2.) Het *zeef en netachtige* (\*), 't welk een doorgang verschaft voor de tepeltjes. 3.) Is het *tepel of zenuwachtige*: 'er zyn drie-derlei (\*\*) soort van *tepels*: dezelve zyn van

bo-

(\*) Dit gevoelen over het netsgewyze bekleedsel der tong heeft onze AUCTEUR van MALPIGHIIUS overgenomen; dog by latere ontdekkingen blykt het, dat dit vlies wel met gaatjes in osen-tongen doorboord is, maar niet in den mensch: die lust heeft dit verder na te gaan, kan hier over de *physiologie of natuurkundige ontleding des menschelyken lichaams*, by den Drukker deezes in 't licht gekomen, 't vyfender-tigste Hoofdstuk naleezen, alwaar men de vliezen en ook de tepeltjes der tong zeer naauwkeurig beschreeven vinden zal.

(\*\*) Dit is ook uit de dieren overgenomen, doch in een menschen-tong vind men hier vierderlei soort. Zie 't boven aangehaalde werk bladz. 438.

boven of breeder of *kegels-gewys*; of hebben de gedaante van eene *wild zwyne* tand: de *Papillæ capitatae* *Conicæ* *Aper.* *pitatae* zyn het minste in getal, nochtans meer der in den mensch dan in dieren; zy gelyken naar speldekoppen; de kegelachtige of *Conicæ* hebben een zachter saamenweefzel; de *aprinæ* zyn op de *basis* van de tong het grootste, dog deeze *papillæ*, welke de tong bekleeden, zyn niets anders dan de uiteindens der zenuwen en peezen (§). Daarenboven zyn 'er verscheide klieren tusfchen de *tunicæ* geplaatst, welke meenigvuldiger en grooter zyn in de *basis*, en openingen veroorzaaken, welkemen gewoonlyk *Cellæ* noemt. voor 't overige komt het saamenstelzel van de tong met de huid overeen, welke ook eensdeels tepelachtig, anderdeels netachtig is.

'ER zyn vyf paar spieren. het eerste paar worden de *kins-tong-spieren* genoemd, en komen onder de *kin* van het binnenste gedeelte van het *onderkaak-been* voort, en strekken zig over de geheele lengte der tong heen, en eindigen in de *basis* van 't *os hyoidis* of tongbeen; deeze spieren trekken de tong na achteren. Het tweede paar zyn de spieren, die de *tong nederdrukken*, en na vooren en achteren bewegen; zy komen van de top des tongs voort, en eindigen in de *basis* van het

os

(§) Dog daar loopen ook slagaderen en aderen na de *papillæ*. Zie de *phisiologie* pag. 439.

ONTLEEDK. *Verz. I. verv. XXX.*

G



*Cerato-*  
*glossi.* *os hyoides* : deeze twee paar spieren zyn de  
 grootste. Het derde paar worden de *tongs-*  
*beens-boorn-spiere*n genoemd, welke de tong  
 zydwaarts buigen ; deeze spieren leggen in  
 den omtrek van de tong, en strekken zig tot  
 de uiterste deelen van het tongbeen uit. Het  
*Sty'o-*  
*glossi.* vierde paar zyn de *priemswyze-tongs-spiere*n, en  
*Appen-*  
*dix sty-* hebben haaren oorsprong rondsom het *priem-*  
*liformis.* *wyze uitsteekzel* van het *os temporum* of slaap-  
*Gracile.* been; aan 't begin is het zeer *tenger*, maar na  
 de tong gaande wordt het dikker, en loopt  
 ook na deszelfs zyden, want het beweegt de  
 tong zydwaards. Het vyfde paar is het kort-  
*Mylo-*  
*glossi.* ste, en worden de *kauw-tandens-tongs-spiere*n  
 genoemd; het komt voort van de binnenste  
*Maxilla* zyde van het *onderste kaakbeen*, omtrent de wor-  
*inferior.* tels der *baktanden*, met een breed begin en  
*Dentes* dwarse vezelen; onder de *basis* van de tong  
*molares.* *infereerd* het zig in de *band*, door welkers be-  
*Liga-* hulp het aan de keel vastgebonden wordt, en  
*mentum.* beweegt de tong na boven en beneden. On-  
*Glandulae* der de tong leggen de *kaakbeenige klieren* ver-  
*maxilla-* borgen, aan alle beide de zyden twee uit- en  
*res.* inwendige : de buitenste zyn klein, en leggen  
 in het midden van de *maxilla inferior* : de bin-  
*Conglo-* nenste zyn grooter en *vatachtig*, en leggen  
*meratae.* naast de *kins-tongs-been spier* : zy hebben een  
*Genio* *ontlastbuis*, die door WARTHON uitgevonden  
*hyoideus.* is, welkers opening men onder de tong ziet,  
*Saliva.* en waar door het *spog* uitvliet.

*Vasa ar-* DE *slagaderlyke vaten*, welke na de tong  
*teriosa.* loo-

loopen, komen uit de buitenste tak van de *Carotis*, en hebben haaren uitgang in de neus en *Prostare*. keel; dog de aderen eindigen in de buitenste *Venæ*. *vena jugularis*; zommige takjes leggen 'er ook naast de tongriem, en worden *Venæ raninae* of *Frænum*-kikvorschaderen genoemd. De zenuwen van <sup>lum.</sup> het vyfde en ook van het negende paar *infe-* *reeren* zig in de zyden van de tong; het vyfde strekt tot de *smaak*, en het negende tot *Gustus*. de beweging der tong.

### *Ziektekundige Verhandeling.*

DE Tong is aan verscheide gebreeken onderhevig.

1.) ZOMTYDS wordt ze door een aanmerkelyk gezwel aangetast, of geduurige *Mer-* *Tumor*. *curialische spuwing*, of door *scorbutus*, of *scorbutische Cachexie*, namentlyk wanneer het bloed en de vochten niet alleen na het hoofd, maar voornamentlyk met een groot geweld uit de onderste deelen van de tong gevoerd worden.

2.) EEN goede of kwaadaartige zweer van de *Ulcus be-* tong; deeze gaat byna alle moeite en kunst *nignum* van den Geneesheer te boven, en is niet bui- *vel ma-* *lignum*. *ten gevaar*. Zie *M. N. C. Dec. II. obs. 10.* want dusdanige zweer wordt dikwils *cancreus*: zy komt voort van een *Mercurialische* kwyling in *scorbutici*, byna in het midden van de tong, welke zy opvreet, en gaat somtyds met een aanmerkelyke *hæmorrhagia* verzelt; of 'er



ontstaat een *absces* in de tong. Zie *M. N. C. Dec. II. Ann. III. obs. 136.*

*Ulcus-  
cula ar-  
dentia.  
Palatum.  
Aphthæ.* 3.) D E beete zweertjes van de tong, ver-  
hemelte en de keel, welke door de Grieken de  
sprouw genoemd worden, zitten op de op-  
pervlakte der tong, verhemelte, en keel, en  
er gaat een moeilijckheid en gevoel van het-  
te mede gepaart: zy vallen zeer dikwils in de  
*scorbutici* en *hypochondriaci* voor.

*Crusta  
aphthosa  
candi-  
cans.* 4.) D E sprouwachtige witachtige korst van de  
tong, die somtyds aan het verhemelte sterk  
vast kleeft, voornamentlyk in kinderen. Zie  
*M. N. C. D. III. Ann. III. obs. 200.*

*Tumor.  
Ranula.* 5.) H E T gezwel onder de tong, 't welk  
het *kikvorsche* gezwel genoemd wordt, om dat  
het eenigermate het achterste gedeelte van  
een kikvors verbeeldt; 't zelve is zacht en slap;  
het groeit meestentyds aan de band van de  
tong, en ontstaat door het *tartarische* aardach-  
tige slymige *lympba*, 't geen in de slappere  
*glandula* en vezelen zit, en daar ter neerge-  
stelt is. Zomtyds worden in dit gezwel ook  
*calculi* of steenen voortgebragt, welke uitge-  
sneeden moeten worden. Zie *Misc. Nat. Cur.  
Dec. II. Ann. 5. obs. 142.*

6.) Zomtyds wordt de tong gekwetst door  
*Dentitio.* de tanden, of ter tyd dat de tanden voortkomen  
in een *proroxysmus Epilepticus*; of door een sny-  
dend of brandend instrument; dezelve wor-  
den moeilijck geneezen.

7.) Z E E R dikwils wordt de smaak ver-  
nie-

nietigt in koortfen, wanneer alles na verrot hout fmaakt; het gefchiedt eensdeels door *obftruëtie* in de zenuwachtige tepeltjes door het taaije flymige *mucus*, anderdeels door het zoutachtige bedorven fpog; zeer dikwils valt zulks ook voor in *catbarren*, wanneer de tong en keel ontftooken zyn.

8.) DE vernietiging der fpraak of *fpraak- Aphonia.*  
*keloosheid*, welke of aangebooren is, of door een gebrek in de zenuwen ontftaat; dikwils komt dezelve voort door een uitwendige kwetfuur van het hoofd of *bekkeneel* in een *Cranium.*  
*apoplexie*, *vallende ziekte in kinderen*, zeer dik- *Epilepsi*  
wils door wormen, desgelyks door opgedroog- *infanti-*  
de hoofdzweeren. Zomtyds ontftaat het ook *lis.*  
door een gezwel, 't welk de *nervi recurrentes*  
of terugkeerende zenuwen drukt.

9.) DE vermindering in fpraak, wanneer ten minften eenige letteren niet uitgedrukt worden, of wanneer iemand in zyn fpreken niet wel kan voortgaan, en dikwils dezelfde lettergreep herhaalt, welk ongemak *præcipitantia linguæ* of hakkelen genoemd wordt. In kinderen is hier meestentyds de *zwakheid Imbecil-*  
der fpieren oorzaak van, of een kwaade ge- *litas.*  
*fteltenis* van de tong of haare fpieren. *Confor-*

VERDERS moet men aanmerken, dat de *matio.*  
kleur der tong ons een groot kenteken in het beoordeelen der ziekzens verfchaft, waarom HIPPOCRATES te regt deszelfs befchouwing in ziekzens aanbeveelt; zy geeft immers



een bewys van den staat of de gesteltenis des  
 speekfels, want wanneer zy al te rood ziet,  
 betekent het, dat 'er een al te groote *ebulli-*  
*tie* of opfieding in 't bloed plaats heeft; wan-  
*Livida.* neer zy wit en loodverwig is, ontdekt men  
*Cacochy-* daar door de *kwaade gesteltheit* des lichaams  
*mia.* of bloeds; dog wanneer zy droog en dor  
*Fissuræ.* en vol *spleeten* is, duidt zulks scherpheid en  
 inwendige hette aan; een zwartachtige opge-  
 zwolle tong voorspelt dat eene ontsteeking  
 in de keel in *sphacelus* overgaat; wanneer zy  
 met een taay slym als een korst van kaas over-  
 dekt is, gelyk in *febres ardentes*, dan is het  
 teken van zeer bedorve en stilstaand *serum*. De  
 al te groote vochtigheid van de tong, en me-  
*Affluxus* nigvuldige *kwyling* betekent, dat het bloed  
*lymphæ.* niet ter deeg met het *serum* vermengd en om-  
 gevoerd wordt, gelyk in *bypocondriaci* en *melan-*  
*cholici* geschiedt.

## VII. H O O F D S T U K.

### *Van de Tandén.*

**D**E tanden zyn beenachtige deelen des  
 lichaams, bestaande uit een tweevoudi-  
 ge zelfstandigheid; ten eersten uit een zeer  
 harde steenachtige, namentlyk aardachtige,  
 en ten anderen uit een zachtere en *poreusere*  
 zelfstandigheid: van binnen zyn zy eenigfints  
 hol,

hol, en worden by manier van *invoeging* in *Compbe-*  
*de kassen* der kaakbeenen *ingeledigt*. De uit-<sup>*fis.*</sup>  
 wendige zelfstandigheid ziet als steen, maar <sup>*Alveoli.*</sup>  
 omdat het in sterk water gelyk andere beenen <sup>*Inarticu-*</sup>  
 ontbonden wordt, 't geen niet in steenen ge-  
 schiedt, wordt te regt derzelver zelfstan-  
 digheid een zeer harde beenachtige substan-  
 tie genoemd; de hardheid blykt daar uit,  
 dat men door de tanden sterk met een stuk  
 staal te wryven 'er vuurvonken kan uithaa-  
 len; de binnenste substantie is zachter,  
 daarom verteert en ontbindt zy zig gemakke-  
 lyk wegens haare slappere *pori*, en dit is ook  
 de reden, dat zy voornamentlyk *gecarieerd* en  
 geschonden wordt. De harde steenachtige  
 substantie wordt zelfs nog met een buitenste  
 schil of *cortex* bedekt, opdat de scherpe over-  
 blyfzels der spyzen daar niet in zoude bly-  
 ven zitten, en ze beschadigen. MALPI-  
 GHIUS in *Anat. Plant.* pag. 19 de *Londonfche*  
*druk*, heeft waargenomen, dat de streepen  
 van de steenachtige zelfstandigheid met een  
 schuinse legging in *ronde kringen* eindigen: <sup>*Circelli.*</sup>  
 dog dat de binnenste zyde uit veele platen  
 van vliezen, die in de lengte vast op elkander  
 zitten, saamgesteld is, en de buitenste zelfstan-  
 digheid uit platte kringen.

In de tanden vindt men een holte, welke  
 voornamentlyk in derzelver *basis* grooter is,  
 en men vindt in het zelve een slymige *streng*, <sup>*Funicu-*</sup>  
 hebbende de gedaante van een langwerpige <sup>*lus.*</sup>



blaas , bestaande uit zeer teere bloedvaatjes , zenuwagtige vliesjes , en een zekere *glutineuse substantie* , dewelke zig ook uitstrekt tot aan de uiteindens der tanden ; maar het vertoont zig aldaar harder en rooder , om dat het eenigfints door de vliesjes *geconstringeerd* is. deeze *funiculus* kan men duidelyk zien , wanneer men de tand overlans doorsnydt. In kinderen is deeze holte veel wyder en grooter , en tot het zevende jaar met een dun schubbetje omringt , welke nogtans in volwaschene van langsaamerhand vermindert : dit kan men zeer duidelyk in een kalfstand zien. De slymige zelfstandigheid , die in de holligheid van de tand zit , en tot voedsel van de tanden strekt , wordt , hoe grooter en vaster de tanden worden , zoo veel te meer verteerd. Deeze slymigheid komt voort uit het bloed zelfs , dat door de kleinste slagadertjes van de *carotis externa* aangebragt wordt , om welke reden het zig binnen in de vliezige blaasjes beflooten zittende roodagtig vertoont. Dat 'er bloedvaten na de holtens der tanden loopen , blykt ook daar uit , om dat men uit een *gecarieerde* tand zuiver bloed of *ichor* kan zuigen. Op wat manier de tanden uit de lyfmoeder voortkomen , en twee ordens derzelven in het *embryo* zelfs waargenomen worden , moet EUSTACHIUS , en onze *verhandeling over de natuur en ziektekunde der Tand*en nagelezen worden. Om dat de tanden door de toevoer  
van

van nieuw voedsel grooter en langer worden, is het noodzakelyk, dat zy een grooter plaats beëlaan, en uit de *gingivæ* voortgestooten worden.

DE tanden bezitten ook gevoel, 't welk in andere beenderen geen plaats heeft, niet omdat zy uit een beenachtige zelfstandigheid bestaan, maar voor zo verre 'er zig in elke wortel der tanden zeer dunne zenuwtakjes, die uit het vyfde paar voortkomen, inplanten, en niet alleen met de bloedvaten in de holligheid der tanden ingaan, en in het vliezige blaasje eindigen, maar omdat zy zig ook door de beenachtige zelfstandigheid der tanden verspreiden, 't welk voornamentlyk in de *maal-Molares-tanden* geschiedt: daarom worden ook deeze meer ontstelt dan de anderen.

WAT aangaat het getal der tanden, zo zy compleet zyn, moeten 'er tweeendertig zyn; de vrouwen hebben 'er gemeenlyk achten-twintig. HIPPOCRATES *Lib. VI. Epidem.* stelt het getal der tanden als een teken van lang leven, zo dat, hoe iemand meer tanden heeft, zo veel te vlugger hy is en langer leven zal. Men is gewoon de tanden in *sny- honds- en maal-* *Dentes* tanden te verdeelen; de snytanden zyn vier in *incisores,* getal, breed en scherp, dewelke de spyzen als *canini,* een mes verdeelen; zy worden ook wel *melk-* *Lactei.* tanden genoemd, omdat zy gewoonlyk eerst voor den dag komen.

DE hondstanden, die naast aan de snytan-



Ocula-  
res.

den staan, zyn in beide de kaakbeenen twee in getal; zy zyn lang en spits, haare *basis* is groot, en derzelver wortel ook lang; de twee bovenste worden *oogtanden* genoemd, omdat zy uitgetrokken wordende, gewoonlyk ongemakken aan de oogen veroorzaaken, naardien derzelver zenuwen met de oogzenuwen communiceeren, alzo de zenuw uit de onderste oogrand door het gat van de *maxilla* uitgaande, gedeeltelyk namentlyk naar de evengemelde tanden loopt.

'ER zyn twintig maaltanden; deeze zyn grooter, ruuwer, en breed, en derzelver *basis* is veel ongelyker: hoe witter de tanden zyn, hoe te beter; want dusdanige kleur verschaft een teken van gezondheid, en duidt tevens aan, dat het *lympa* wel gestelt is. De tanden zyn in de kassen of holligheeden der kaakbeenen even als spykers ingehecht, opdat zy niet gemakkelyk bewogen of los zouden raaken, en tevens hebben zy ook alle niet evenveel wortels, alzo de sny- en honds-tanden maar alleenlyk eenen wortel bezitten, de bovenste maaltanden hebben 'er drie, de voorste twee, de achterste drie, en dezelve zitten in het kaakbeen vastgehegt. Alle de onderste maaltanden zyn maar van twee wortels voorzien, omdat het onderste kaakbeen harder, en integendeel het bovenste zachter is: ook hangen de bovenste, en hebben hierom ook meerder schraagen van noden: daarenbo-

boven is het aanmerkelyk , dat alle de wortels der tanden van binnen met vlies- en zenuwachtige banden voorzien zyn , door welke zy aan haare holtens vast zitten , doch van buiten omringt en omvat het *tandvlees* deze *Caro gingivalis*.  
 zelfve wortels. Het tandvlees is hard , en uit vezelachtige naast elkander leggende platen saamgevlochten , waaronder ontallyke haairige bloedvaatjes geweeven zyn , waarom het zelve ook hoog rood ziet. Vervolgens heeft het tandvlees zeer veele vliesjes , klieren , en zenuwtakjes , om welke reden het zo gevoelig is , en geduurig vochtig gehouden wordt. Dit vlies omringt de tanden als een wal , en verstrekt dezelve in de plaats van spieren , waarom de tanden , wanneer het tandvlees bedorven , verteerd of verflapt is , gemakke-lyk uitvallen of los worden. Doch het vlies , 't welk onmiddelyk de wortels der tanden bekleedt , is volgens de aantekening van CLOP-TON HAVERS , klierachtig : maar de tanden hebben geen *periosteum* , nogtans zyn de *kassen* *Alveoli*.  
 hier mede voorzien , 't welk met het zelfde vlies , 't welk de tanden bedekt , saamgroeit , zo dat het als een eenig vlies schynt uit te maaken. Het gebruik der tanden strekt tot de *kauwing* of insnyding der harde en vaste spy- *Masticatio*.  
 zen , derzelver verbreking en vermindering , waarom sommige het geheele *geweezel* en sa- *Concamentum*  
 menstelzel der tanden een *mola microcosmica* noe- *ratio*.  
 men. Het tweede gebruik der tanden strekt  
 tot



tot de verandering der ſtem, wyl zy als wallen voor de tong en de te rug komende lucht verſtrekken, om welke reden de kinderen, die geen tanden hebben, ſchreijen.

### *Ziektekundige Verhandeling.*

ONDER de ziekzens der tanden verdient onze beſchouwing 1.) derzelver *Caries*, waarvan de ſtank een onaffcheidelyke medgezel is; zy vat voornamentlyk de maal-tanden aan, welke op haare oppervlakte een dunder ſchors hebben, en met veele ongelyk- en ruuwigheden voorzien zyn; wanneer eenig overſhot der ſpyzen in dezelve blyven zitten, ſcherp worden, en de zelfſtandigheid der tanden afknaagen. De *caries* begint van buiten met een klein zwartachtig gaatje; fomtyds ontſtaat zy ook uit een inwendige oorzaak, namentlyk ſcherp *ſerum*, en *acidum* in *ſcorbutici*, en begint ook van binnen; de kaakbeenen zyn zelfs niet van *caries* vry, welke ſcherpe *ſcorbutiſche* of ook *veneriſche* vochten fomtyds gewoon zyn aan te brengen, namentlyk in derzelver zachter en diepere zelfſtandigheid. Zeer dikwils ontſtaat het zelve uit *bloedige etter* van een *gecariceerde* tand, welke door middel van de wortel het kaakbeen zelfs aantast, en eerst een *fiſtel* veroorzaakt, welke niet kan geneezen worden, dan wanneer de tand uitgetrokken is; doch by aldien zy niet uit-

uitgetrokken wordt, veroorzaakt de in de bovenste zelfstandigheid van het kaakbeen stilstaande *sanies* aldaar een aanmerkelyke *exulceratie* en bederving, zo dat somtyds het geheele kaakbeen bederft en door een *gecarieerd absces* verteert. Zie *Misc. Nat. Curios. Dec. II. § V. obs. 232.* HILDANUS *Cent. IV. obs. 121.* SCHENCK *Lib. I. de maxilla pag. 213.*

2.) DE *Tartarus dentium*, welke vast aan derzelver wortels groeit, en ook van langzamerhand de zelfstandigheid verteert, komt van het Tartarische speeksel van het tandvlees. Aan dit ongemak zyn *scorbutici*, *arthritici* en kinderen, die veel zuiker en zoetigheeden eeten, zeer onderhevig.

3.) DE *odontalgia*, of zeer zwaare pijn der tanden, welke ontstaat of door een inwendige oorzaak, als *Rheumatismus*, of fcherp zoutachtig *serum*, dat de zenuwachtige banden der tanden aandoet, of ook den vliezigen bundel zelfs die in de holligheid der tanden zit, aantast, voornamentlyk, wanneer de tand van buiten *gecarieerd* is: of het ontstaat alleenlyk door een uitwendige oorzaak in *gecarieerde* en holle tanden, voornamentlyk wanneer 'er by voorbeeld een al te groote koude by komt, of door het al te warm of koud drinken, zuiker en zoetigheeden, welke een *odontalgia* veroorzaaken: doch zulk een, wanneer zy uit deeze laatstopgenoemde oorzaak voortkomt, kan ligt geneezen worden. In bloedryken is een aderla-

ting



ting op de tong goed; wanneer de patient

*Adstricta* hardlyvig is, zachte laxeerende en zweetdryvende  
*alvus.* middelen. Van buiten *discutientia*, gelyk *flores*  
*Lenia* *sambuci*, *chamomillæ* &c. in een zakje.  
*laxantia.*

*Diapho-* 4.) DE *fistula*, of liever de holte in het bo-  
*retica.* venste kaakbeen, 't welk in de *sinus maxillaris*  
 of *antrum Highmori* eindigt. Zie onze *Verbande-*  
*ling over de Tand.*

*Dentitio.* 5.) DE moeilijke *tandkryging*, welke het  
 meest de kinderen in twee tydperken plaagt:  
*Germi-* het eene wanneer de tanden *groeijen*, en het  
*natio.* andere tydſtip, wanneer de tanden uitkomen:  
 doch wanneer dezelve moeilijk is, dan gaat  
 'er ook groote pijn mede verzelt. Of de tanden  
 zyn hier zelfs de oorzaak van, wanneer zy al  
 te hard en ſpits zyn, gelyk de honds- of oog-  
*Gingiva.* tanden; of het *tandvlees* is hier ook oorzaak  
 van, wanneer het te dik of *calleus* is, het wel-  
 ke de tanden niet kunnen doorbooren, en  
 door haare geduurige prikkeling ſterke pynen  
 veroorzaaken, voornamentlyk zo 'er niet een,  
 maar veel te gelyk uitkomen.

6.) DE loswording der tanden wegens de  
 al te groote verſlapping der *ligamenten*, welke  
 of van derzelter *corrosio* of *consumptio*, of door  
 eene aldaar al te veel ſtilſtaande vochtigheid  
 voortkomt. Somtyds ontſtaat uit een ſmeering  
 van kwik om kwyling te veroorzaaken in ſly-  
 mige voorwerpen, zonder een voorgegaane  
*Purga-* *zuivering*, de *vellicatio* der tanden.  
*tio.*

7.) HET uitvallen der tanden wordt door  
 een

een al te groote *sphacelatie* en verteering van het tandvlees veroorzaakt, 't welk niet nieuw in *scorbutici* is.

8.) HET *knarsen* der tanden, en derzelver *Stridor* tegen wil en dank en menigvuldige over en weder tegen elkandere *botsing*, ontstaat mees- *Concus-* *tentyds* door een *convulsio* of *spasmus* der spie-<sup>sio.</sup>ren in de wangen, die tot beurtelingsche aan en afbrenging dienen, en is ook geen onge- woon *symptoma* in *vermes*, *dentitio difficilis* en *Epilepsia*.

9.) DE *stupor dentium* is een zeer lastig gevoel in het kleinste vlies der tanden, veroorzaakt door een straf samentrekkend sap.

## VIII. HOOFDSTUK.

### *Van de Neusgaten en deszelfs maakzel.*

MEN verdeelt de neus in een in- en uitwendige: in het buitenste gedeelte moet men vooreerst de *dorsum* of rug, ten tweede, de voortlopende lengte, en deszelfs spitsche gedeelte de *spina*, en de twee daar aan ter zyde vastzittende *pinnæ* of neusvleugels beschouwen. De neus wordt met het *cuticula* en *cutis*, waar onder de spieren leggen, bekleed; ten tweeden, wordt de neus door middel van een *middenshot* in twee holligheeden of boezemen *Septum* verdeeld, en elke *sinus* wordt wederom in twee <sup>*Sinus.*</sup> deelen verdeeld, welkers eene na boven na het  
zeef-



*Os cribriforme.* zeefbeen loopt , het anderen gaat boven het  
*Palatum.* verhemelte in de keel; waarom het door onder-  
*Fauces.* vinding blijkt , dat het geen door de mond uit-  
 gebraakt wordt dikwils de neus uit komt. Daar-  
 enboven wordt de neus uit beenen en kraak-  
 beenen saamgeftelt. De beenderen maaken de  
 bovenfte deelen van de neus uit , en ftrekken  
 gedeeltelyk zig tot het *os cribriforme* of zeefbeen  
 uit , en gedeeltelyk tot het *opperfte kaakbeen* :  
*Os maxillæ superioris.* maar de *kraakbeenen* maaken het binnenfte ge-  
*Cartilagineae.* deelte van de neus uit , en zyn vyf in getal ,  
 in beide de zyde twee; het middelste en on-  
 derfte maakt het middenshot der neusga-  
 ten uit.

*Dilatatoria.* 'ER zyn vier paar spieren , twee *verwyde-*  
*Constrictoria.* rende , en twee *samendrukkende*; het eerste *par*  
*Sutura.* *dilatorium* komt voort omtrent de *naad*, 't wel-  
 ke het *os frontis* of voorhoofdsbeen met de  
*maxilla superior* saamenhecht , en planten zig in  
 de *neus-vleugels*; het tweede paar komt voort  
 van het *os orbitæ* of ooghol-been , dit eindigt  
 gedeeltelyk in de *dorsum* of rug van de neus ,  
 en gedeeltelyk in het *bovenste gedeelte* van de  
*Pinnae nasi.* neus. Het tweede *par constrictorium* loopt ronds-  
 om het einde van de neus of neusgaten als een  
 sluitspier. Het vierde paar komt van binnen  
 voort van het uiterste gedeelte van het neus-  
 been , en hecht zig in de zyden of vleugels.

WAT het binnenste gedeelte of weefzel  
 der neusgaten betreft , wy vinden vooreerst  
 drierlei beenachtige gekromde draaijen , wel-  
 ke

ke men *scalæ* en ook *ossa tortuosa* noemt.

TEN TWEEDEN ontdekt men aldaar twaalf boezemen of holligheeden der beenderen, namentlyk twee *spboenoïdei*, welke in het been, 't welk *spboenoides* of wiggebeen genoemd wordt, holligheden hebben, en onder het *paardszaal* leggen: uit deeze loopen de *Sella equina* vochten door een gat in twee *meatus*, welke uit de neusgaten na de keel loopen. De *Ethmoïdei* of zeefbeeninge zyn ten getale van zes, welke tusfchen de *frontales* en *spboenoidales* in zyn, in beide de zyde drie, en deeze zyn door dunne dwarfe en eenigzins fchuinfe beenen van elkanderen afgefcheiden, waarvan de voorfte wyder dan de overige zyn, in dewelke men ook twee *foramina* vindt, door welkers middel de voorfte *sinus Ethmoïdeus* met de *maxillaris* communiceerd; in het *os frontis* naast aan de wortel der neus zyn ook twee *bolligbeeden*, *frontales* genaamd, *Sinuofitates* waarvan de eene zeer dikwils wyder dan de andere is, en deeze heeft onderscheidene celletjes: in het achterfte gedeelte deezer *sinus* is een gat, 't welk zyn uitzicht in het achterfte deel of gedeelte der *neusgaten* heeft. Daarenboven zyn 'er in de *maxilla superior* twee zeer wyde holligheden, in welkers bovenfte gedeelte een gat of opening en korte *ductus* is, welke het vocht uit de voorfte *sinus Ethmoïdei* ontfangen; deeze *sinus* noemt men ook gewoonlyk *antra* of hollen van *HIGHMORUS*, om dat zy van hem gevonden zyn. Deeze twaalf *sinus* en ook het *os Vomeris* en alle de beenderen, die tot het famenftelzel der *nares* behooren, zyn met een vlies bekleed, 't welke wegens deszelfs gebruik het *flymvlies Pituita* genoemd wordt: het is fpons en klierachtig, met *ria* zeer veele kleine vaatjes voorzien, *blaauwachtig*, 't welk gedrukt wordende een *mucus* uitstort; wanda neer dit in gematigd warm water gelegd werdt, dan zwelt het als een fpongie op: dit fcheidt het *mucus* even als een zeef af, en voert het zelve door *ductus* in de neusgaten, welke een recht overeenkomstig *emundtorium* van de flym en de flymachtige vochten zyn: dit vlies is overal niet even egaal; want het achterfte gedeelte, 't welke aan het gedeelte van beide de *ossa palati* vast zit, is dikker, en ten eenen-



maalen klierachtig met slym - vaten voorzien; doch dat gedeelte, 't geen aan de *osfa turbinata* of *squammosa* vast zit, is veel dikker en vliesachtiger: het slymvlies der neusgaten en het vlies der *intestina* voornamentlyk het *rectum*, en *colon* fecerneeren het *pituita*.

Concha  
turbina-  
ta.  
Parietes.  
genæ  
sepire.

OVER de *osfa turbinata*, en ook het maakzel der neusgaaten heeft CASSERIUS fraaije dingen aangetekend *Lib. III. cap. 26*, welke dus schryft.  
 „ in de diepte der neusgaten zyn die langwerpige  
 „ sponsachtige beentjes verborgen, welke *scalæ* ge-  
 „ noemd worden, daarom omdat de een trapsgewys  
 „ boven de andere legt; men is ze ook gewoon *osfa*  
 „ *turbinata* te noemen, omdat zy een gedraaid lang  
 „ zee boorentje verbeelden; zy koomen uit de zyden  
 „ van het been der neusgaaten, die van binnen de  
 „ holte der *wangen* afschutten: wanneer zy met een  
 „ dun beginfel voortgekomen zyn, groeijen zy van  
 „ langzamerhand zamen, en neemen de gedaante van  
 „ een *turbo* aan, en vertoonen zich overal los, en  
 „ hangen naar beneden en zyn maar alleen aan haar  
 „ beginfel vast; het is een vermaakelyk gezicht te  
 „ zien, dat deeze beenderen, of liever beenachtige  
 „ *lamellæ*, welke niet kraakbeenig zyn, in verschei-  
 „ de buisachtige *cylindri*, en halve beenachtige *circu-  
 „ li* rondsom gedraait, en als in verscheine *specus* of  
 „ spieren verdeelt worden, alwaar geen een in den  
 „ ander loopt”.

Olfactus.

'ER is gemeld, dat deeze *osfa* en hunne holligheeden met een zenuwachtig vlies bekleed worden, om welke reden zy ook met een uitnemend gevoel voorzien zyn, en 'er is geen twyfel, of deeze beenderen, die met zo een gevoelig vlies voorzien zyn, zyn het rechte en waare werktuig van de *reuk*, welkers structuur in de vermeenigvuldiging van het vlies der neusgaten, wanneer het uit de eene naauwte in de andere overgaat, en in de holligheeden der beentjes, alwaar de reuk-lucht niet alleen in stil blyft hangen, maar ook weerom gehaalt wordt, bestaat.

DOCH het *slymvlies*, 't welk de twaalf *sinus* der beenderen bekleedt, is niet zo zeer tot het gevoel geschikt, als wel tot de afscheiding van het *mucus*:

want

want men moet wel in acht houden, dat al de slym, welke uit de neus geloosd wordt, niet uit het *Cerebrum* of de holligheid van het *Cranium* voortkomt, gelyk ten onregten de Ouden van gevoelen zyn geweest, omdat het *os Cribriforme* of zeef been, schoon het met meenigvuldige gaatjes voorzien is, echter geene schoon zeer vloeibaare stof, uit de holte van het *cranium* of *cerebrum* na de neusgaaten zendt, alzo die openingen door de *dura mater* en zenuw takjes, welke 'er doorloopen, zeer vast toegeslooten zyn: maar veel eer vloeit al het *mucus* uit dit *slymvlies* der neusgaaten, *Membrana pituitaria* alwaar het, zo het hier langer blyft hangen, door koude lucht of voornamentlyk des nachts saamgroeit.

DE vaten, welke na dit vlies loopen, en bloed aanbrengeu, zyn *arteriæ* uit de *ramus Carotidum externarum*, maar de *venæ* hebben haaren oorsprong van de *vena jugularis externa*: de takjes der zeenuwen komen van het vyfde paar voort, dewelke tot de reuk dienen.

### ZIEKTEKUNDIGE VERHANDELING

ONDER de ongemakken en gebreeken, welke de neusgaten onderhevig zyn, kan men tellen

1.) DE al te groote *uitstorting van slym of snot*, *Effusio muci*, welke men dikwils in slymachtige voorwerpen, kinderen, ook somtyds in oude menschen zeer dikwils bespeurt, en wanneer 'er zoute scherpe vochten na het vlies der neusgaaten loopen; dit ongemak heeft gemakkelijk een verlorene reuk ten gevolge.

2.) DE al te groote droogte der neusgaten, welke ontstaat, door dat het kleirachtig vlies, dat de neusgaten bekleedt, gedeeltelyk verstoppt, en gedeeltelyk verhard is: dit ontstaat door het al te veel gebruik van nies-middelen, of ook al te groote spanning van dit vlies in *hypocondriaci* en *spasmodici affectus*, voornamentlyk in *passiones capitis*, *vertigo*, *cephalalgia* en andere.

3.) NEUSBLOEDINGEN, welke ontstaan door het openen der slagaderen, die door de vliezen der neusgaten loopen, wanneer zy door al te veel bloed of geweld al te sterk uitgerekt wordende eindelyk aan stukken bersten; aan deze zyn de jonkheid en bloedryken, zo zy andere gewoone ontlastingen van bloed missen, zeer onderhevig.



Ozana.

4.) *Ulcus narium* of *stinkende neus-zweer*, 't welk zeer dikwils ook *carieus* wordt en de *osfa squamosa* wegvreet, zyn *symptomata* van een geconfirmeerde scheurbuik, of ook van een Venerifche kwaal, wegens de aldaar corrisive fcherpe *lympba*, die in verrotting overgaat.

Vasa

Lymphati-  
ca.

5.) *Narium polypus*, 't welk een vleezige fungeuze faamengroeing is, ontstaan uit al te fterk uitgerekte en verwyde bloed- en *water vaten*, die in de vliezen zyn, wanneer het glutineufe voedend fap uit de verwyde *pori* vloeiende faamengroeit; fomtyds heeft het dieper wortels, die tot in de *sinus* van het *cranium* penetreeren.

6.) DE *Coryza* is een al te groote druiping van *serum* uit de neusgaten, met een meenigvuldige *sternutatio* of niesfing, wegens al te groote verzameling of legging van *serum* in deeze deelen, veroorzaakt wegens belette *transpiratio*, en geconstringeerde klieren van de huid; dit ongemak valt meestentyds in de lente of herfstyd, wanneer de lucht geheel ongelyk is; 't gaat gemeenlyk met hoest en verandering van hette gepaard.

7.) HEVIGE en geduurige niesfing, welke dikwils (*per paroxysmos*) by vlaagen wederom komt, wegens fcherpte van *lympba*, en al te fterke prikkeling der zenuwachtige deelen: zeer dikwils gaat 'er een *Epilepsia* vooraf.

Odoratus  
abolitio.

8.) *Verlies van reuk* ontstaat uit geobstrueerde reuk-zenuwen, of ook wanneer dezelve verhard zyn, of wanneer het vlies der *osfa squamosa* calleus geworden is.

Depre-  
vatio odo-  
ratus.

9.) *Bederving van reuk*; dit ontstaat uit een al te groote vochtigheid, of verflapping van het vlies, 't welk het fubject van de reuk is; en het is aanmerkelyk, dat wanneer de reuk bedorven is, dan ook het andere zintuig, namentlyk de fmaak, aan ongemak onderhevig is.

## IX. HOOFDSTUK.

VAN DE KEEL, SPOGKLIEREN, UVULA OF  
LEL, EN AMANDELEN

DE geheele omtrek van het *Verbemelte* is van binnen met een vlies rondsom bekleed, onder  
het

het welk, gelyk STENO wel aanmerkt, ontallyke klieren leggen, waarvan elk een *ontlast buis*, en een <sup>*Ductus excretorius.*</sup> *mondje* heeft, 't welk gedrukt wordende een <sup>*Osculum.*</sup> waterachtig vocht of *lympba* uitstort. Deeze klieren gelyken ten aanzien van haar gedaante en grootte naar een *linse*, en maaken, dat de holte der *keel* ge- <sup>*Lens.*</sup> duurig nat gehouden wordt. Daarenboven leggen in het <sup>*Fauces.*</sup> bovenste gedeelte van de keel twee grooter klieren, die om haare gedaante en grootte *Amandelen* of an- <sup>*Amygda-*</sup> derzins *tonsillæ* genaamd worden; deeze zyn in de zy- <sup>*la.*</sup> de der keel geplaatst, en tusfchen deezen hangt de *uvula* of lel midden in.

WARTHON fchryft van deeze, dat zy aan beide de kanten een *sinus communis* hebben, tusfchen wel- kers *fibria* 'er twee grooter en meer dergelyke klein- dere zyn, doch daar de amandelen het dikst zyn, opent zich de *sinus communis* met een open <sup>*Guttur.*</sup> mondje in de *gorgel*. VERHEYEN zegt, dat hy 'er meer kleindere gevonden heeft, waarvan de meeste de grootte van een fpelden knop, of van het *semen orobi* hadden; zy ontfangen haare *arteriæ* uit de *Carotides*, en de *Venæ* uit de *jugulares*, doch de zenuwen krygen zy van het vyfde en achtste paar: deeze klieren fchei- den het *mucus* af, 't welk de keel niet alleenlyk glad maakt, maar ook de na de *æfophagus* gaande spyzen bevochtigt, opdat zy des te beter zoude kunnen neer- zakken.

TUSSEN de amandelen is de *uvula* geplaatst, welk na de bovenste *geleding* van een kinder vinger <sup>*Articu-*</sup> gelykt, het is na de kant van het verhemelte dikker, <sup>*lus.*</sup> daarenboven loopt het in een spitse punt uit; het wordt door twee paar spieren, buitenste en binnenste, bewo- gen: het buitenste paar ligt de *uvula* op, en komt van het bovenste kaakbeen onder de *dens molaris* of maal- tand voort, en hegt zich in de zyde van de *uvula*: het binnenste paar komt van het onderste gedeelte van de *vleugel van het wiggebeen*, en eindigt van onderen <sup>*Ala offis*</sup> in het lichaam van de *uvula* of lel, en plaatst de *uvula* <sup>*cunei-*</sup> aan het *palatum*: daarenboven wordt de *uvula* naar <sup>*formis.*</sup> boven gehouden door vier vliefsige banden. Het ge- bruik van de *uvula* strekt niet alleen om de koude lucht, welke de *larynx* omringt, te matigen, maar



brengt ook veel toe om het geluid te maaken, waarom het zelve weggenoomen zynde, de heldere en klinkende stem weg gaat: vervolgens belet het ook, dat het door te slikkene vocht zo gemakkelyk niet door de neusgaten te rug vloeije.

DE klieren, welke in den omtrek van de keel zitten, kan men in grootere en kleindere verdeelen: uit de grootere hangen de *parotides*, welke omtrent de ooren leggen, en wegens haare zwellings, waar mede zy aangedaan worden, aan ieder bekend zyn: zy leggen aan beide de zyden omtrent de wortel van de *auricula*, welke zy geheel omringen. Deeze klier, schryft VERHEYEN, van vooren met een *limbus* of zoom uitgespannen zynde, verbergt met zyne *sinus*

*Glandula* eenen andere langwerpigen en *ronde of morsachtige*  
*congloba-klier*; zy heeft eene aanmerkelyke ontlast-buis, die  
*ta.* naar zyn uitvinder de buis van STENO genoemd wordt, welke boven de *musculus masseter* in dit gedeelte van de mond, 't welk onder de maaltanden van het bovenste kaakbeen legt, met zyne opening gaapt.

DE kleindere hier en daar verspreide klieren, zyn ontallyk in het verhemelte, de lippen, onder de tong, waarvan het gezicht en het gevoel ten getuigen strekken; uit deze komen kleindere kwyl-buizen voort, welke door drukking een vocht uitstorten. Eindelyk leggen 'er ook klieren tusfchen de *kaakspier* en het vel zelfs, waarvan elk een kanaaltje heeft; deeze klieren zyn van niemand tot nog toe beschreeven, doch van ons eenige reizen in de ontleedkunde vertoond: zie onze verhandeling de *necesfaria falivæ infpectione*. Hier toe behooren ook die *ductus* of buizen, die het traanvogt door de neusgaten na de mond voeren, waar over men onze disfertatie over de *saliva ejusque morbi* kan nazien. Het *uitzypende fpoeg*, dat door middel van deeze klieren afgefcheiden wordt, is geen eenvoudig, maar een fyn vocht van een zeer *werkzaam* aard, 't welk met *gistbaare* zoete zappen vermengd zynde terftond *gifting* veroorzaakt.

*Salivalis*  
*latex.*  
*Simplex.*  
*Activa*  
*Fermen-*  
*tescibilis*  
*Genui-*  
*num men-*  
*strum.*

HET fpoeg is ook het *natuurlyke fcheivocht*, van de *ventriculus* of maag, door welkers behulp de voedfelen innerlykst ontbonden worden; daarenboven brengt het veel tot de fmaak toe, omdat het vaardiglyk de  
zout-

zout- en smaakachtige deeltjes uit de voedselen trekt, en in de zenuwachtige tepeltjes der tong doet indringen; eindelyk brengt het spog zeer veel toe tot de betere *doorslikking* der spyzen, dewyl het de holte van de keel en de *œsophagus* bevogtigt. *Deglutito.*

### *Ziektekundige Verbandeling.*

WAT de amandelen aangaat, deeze zyn het meest aan de volgende ongemakken onderhevig.

1.) ZOMTYDS valt 'er in dezelve een vry aanmerkelyke *tumor* voor, voornaamentlyk in kinderen, zo dat zy niet alleen de doorslikking, maar ook de vrye *transpiratie* belet, welk ongemak ook de hulp van den Heelmeester vereischt, zo zy hard worden.

2.) DERZELVER *inflammatie*, welke dikwils voorkomt, gelyk de zwellings, pyn, en roodheid dit bevestigen, in *Catarrale* ziekzens, voornamentlyk by aanhoudend vochtig weer, zo het zelve schielyk door een koude noorde wind vervangen wordt.

3.) DERZELVE *suppuratie*, welk ongemak echter zeldsaamer voorvalt, en een zekere keelachtige *inflammatie* onderstelt.

4.) EEN altoos duurende *druiping* van stinkend dik vocht, hoedanig men meestentyds ziet in scheurbuikige, en zomtyds met eene wegvreting geschiedt.

DE *uvula* heeft ook haare ongemakken, waaronder vooreerst is.

1.) DESZELFS verslapping en verlenging, welk ongemak dikwils voorvalt wegens de slapheid der banden en al te groote verslapping der spieren, in vochtige en natachtige voorwerpen, gewoonlyk brengt het een moeijelykheid in de *deglutitie* voort.

2.) DE *inflammatie* van de *uvula* in scherpe *catarrhale* vloeijing.

DE keel wordt ook met ziekzens aangedaan, dewyl niet alleen

1.) DEZELVE een *tumor* en *inflammatie* aantast, maar het meest van allen.

2.) KLEINE zweetjes, by de Grieken *ισθαί*, sprouw genaamd, welke de tong en den ganschen omtrek der keel



keel beflaan, verzelt met groote moeilykheid, voornamentlyk in volwasfche *scorbutici*.

*Squali-  
da.*

3.) DAARENBOVEN wordt ook de omtrek der keel, en de klieren zelfs zeer dikwils met een *vuile* inflammatie en veel flym gekwelt, 't welk dezelve als haast bedekt, voornamentlyk in *febres arden-tes* en *continuæ*.

DE kwyl of fpog klieren zyn ook niet vry van ongemakken.

1.) BESLAAT dezelve de *tumor* van de *parotis*, welke of tot *inflammatie* of *scirrbeusheid* overgaat; geene gebeurd 't meest in *affectus acuti* door eene *critica* of *symptomatica metastasis* of verplaatfing: doch deeze valt voor in *morbi Chronici* of in *febr s* door het appliceeren van uitwendige repelleerende midde-len, welke in *scirrbus* overgaan, ja zelfs als in afweidende *ulcus cancrosum*.

*Carcino-  
ma paro-  
tidis*

2.) HET kreeftgezwel der oorklieren, 't welk ontstaat in een *scirrbeuse* verharding deezer klier, die in verrotting overgaat.

OMTRENT het fpog moet men aanmerken.

*Defectus.*

*Inopia.*

1.) DESZELFS gebrek, waar uit dorst ontstaat, en de fmaak weggaaft, wegens gebrek aan *serum*, veroorzaakt door tegen natuurlyke warmte, of wanneer het zelve ter oorzaake van verftoppingen in de kwylklieren niet afgefcheiden wordt.

*Adfluxus  
lymphæ.*

2.) DE geduurige *aanvloeijing van water*, 't welk ontstaat of door zout, dat de klieren prikkelt, en dus een grootere toevloed van bloed veroorzaakt, of door een *spasmus*, welke de *venæ* faamendrukt, en de terugvloeijing van het bloed belet.

E I N D E.

T A F E L  
 D E R  
 HOOFDSTUKKEN  
 I N H E T  
 E E R S T E D E E L.  
 D E R  
 ONTLEEDKUNDE.  
 V E R Z A M E L I N G I.  
 E E R S T E A F D E E L I N G.

F. HOFMAN, *Ontleed, Natuur en Heelkundige beschouwing, van het Menschelyke Lichaam.*

I.	<b>H</b>	HOOFDSTUK. Van de Opperhuit.	bladz. I
II.	— — —	Van de Huit.	12
III.	— — —	Van het Hair.	36
IV.	— — —	Van de Nagelen.	41
V.	— — —	Van het Vet.	42
VI.	— — —	Van de Spieren van den Onderbuik.	53
VII.	— — —	Van den Penszak, Na- vel, en het Darmnet.	65
		I	VIII.



VIII.	HOOFDSTUK.	Van de Slokdarm en Maag.	bladz. 78
IX.	— — —	Van het Gedarmte.	99
X.	— — —	Van het Darm-scheil, de Melkvaten en Borst- buis.	130
XI.	— — —	Van de Alvleesch-klier.	149
XII.	— — —	Van de Milt.	159
XIII.	— — —	Van de Lever.	172
XIV.	— — —	Van de Wegen en Bui- zen, die de Gal heeft, en van de Natuur en 't gebruik der Gal.	202
XV.	— — —	Van de Nieren.	223
XVI.	— — —	Van de Pisblaas.	241
XVII.	— — —	Van de Manlyke Teel- Deelen.	253
XVIII.	— — —	Van de Manlyke Roede.	272
XIX.	— — —	Van de Vrouwlyke Teel- deelen.	283

## TWEEDE AFDEELING.

### *Van het middengedeelte des Buiks.*

I.	HOOFDSTUK.	Van het Middenrif.	bladz. 304
II.	— — —	Van de Long.	315
III.	— — —	Van 't Hart en Hartzakje.	337

DERDE AFDEELING.

*Van de bovenste Holligheid, naamlyk  
het Hoofd.*

I.	HOOFDSTUK.	Van het Bekkeneel, en deszelfs buitenste deelen.	352
II.	— — —	Van de groote en kleine Hersens en het verlang- de Merg.	361
III.	— — —	Van de Zenuwen.	372
IV.	— — —	Van de Oogen.	388
V.	— — —	Van de Ooren en het ge- hoor.	406
VI.	— — —	Van de Tong.	414
VII.	— — —	Van de Tandén.	420
VIII.	— — —	Van de Neusgaten en des- zelfs maakfel.	429
IX.	— — —	Van de Keel, Kwijklie- ren, Uvula of Lel, en Amandelen,	434

*Eynde van het Eerste Deel.*



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1891-1892

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY





